

Resumen nacional de sequía para 7 junio, 2022

Resumen

Un frente frío de movimiento lento resultó en tormentas eléctricas con fuertes lluvias (localmente más de 3 pulgadas) desde el centro hasta el sur de las Grandes Llanuras, el bajo valle del Mississippi y la región de Ozarks del 31 de mayo al 2 de junio. A medida que este frente avanzaba hacia el este, localmente fuerte la lluvia también cayó en el valle de Ohio y el noreste. La baja presión de nivel medio, que ha persistido en el noreste del Pacífico durante gran parte de la primavera, continuó aumentando el flujo y la precipitación en tierra desde el noroeste del Pacífico hacia el este hasta el norte de las Montañas Rocosas. Las cantidades de precipitación de 7 días del 31 de mayo al 6 de junio excedieron las 0,5 pulgadas (localmente 2 pulgadas o más) en una amplia área espacial de Oregón, Washington, Idaho, Montana y el norte de Wyoming. Después de que el huracán Agatha tocara tierra en la costa sur de México, su sistema de baja presión remanente siguió al noreste hasta la Península de Yucatán y resurgió sobre el sur del Golfo de México. Este sistema de baja presión, que se convirtió en la tormenta tropical Alex, trajo más de 5 pulgadas de lluvia al sur de Florida y provocó inundaciones en Miami. La sequía estacional prevaleció en el sur de California y el suroeste del desierto. Las temperaturas de 7 días, del 31 de mayo al 6 de junio, promediaron por encima de lo normal en gran parte del este y el sur de los EE. UU., mientras que las temperaturas más frías de lo normal prevalecieron en todo el norte y el centro de las Grandes Llanuras y la parte superior del valle del Mississippi. El clima mayormente seco estuvo acompañado de temperaturas superiores a lo normal en Alaska desde finales de mayo hasta principios de junio. Las lluvias de vientos alisios trajeron humedad beneficiosa a la Isla Grande de Hawái. Los déficits de precipitación a corto plazo continúan aumentando en todo Puerto Rico, luego de otra semana más seca de lo normal.

Noreste

La sequía moderada a largo plazo (D1) en el oeste de Maine se eliminó esta semana debido a las precipitaciones recientes y es consistente con SPI en múltiples escalas de tiempo que se remontan a 9 meses. El D0 a lo largo de la costa de Maine se expandió hacia el oeste en función de un SPI de 30 a 60 días, la humedad del suelo y los caudales promedio de 28 días del USGS. Asimismo, D0 se incrementó hacia el oeste para incluir más Connecticut y el oeste de Massachusetts, donde los déficits de precipitación de 30 a 60 días continúan aumentando después de otra semana mayormente seca. Excluyendo el norte de Maine y el noroeste de Nueva York, la precipitación ha promediado por debajo de lo normal durante los últimos 30 días.

Sureste

Aunque la precipitación más fuerte, asociada con la tormenta tropical Alex, ocurrió al sur del área de sequía moderada a corto plazo (D1), suficiente lluvia (más de 1,5 pulgadas) justificó la eliminación de la mayor parte de la D1. Sin embargo, se mantuvo una pequeña área D1 al noroeste del lago Okeechobee que recibió menos de 2 pulgadas de lluvia la semana pasada y los impactos persistentes de la sequía de la primavera pasada. La sequedad reciente y las tasas más altas de evapotranspiración provocaron una expansión de la sequedad anormal (D0) en todo el Big Bend de Florida. Los indicadores a largo plazo respaldan la continuación de la sequía en curso a lo largo de la costa de Carolina del Sur. Según los SPI de 30 a 60 días y la humedad del suelo, la sequedad anormal se expandió para cubrir una mayor parte de la llanura costera de Carolina del Sur. Otra semana seca para la llanura costera de Carolina del Norte provocó una ligera expansión hacia el oeste de las categorías Dx. Se justificó un ligero aumento en D0 y D1 para el suroeste de Georgia, luego de una semana mayormente seca y temperaturas de 7 días con un promedio ligeramente superior a lo normal. Aunque D0 no se introdujo esta semana en el norte o el centro de Georgia, estas áreas serán monitoreadas de cerca en las próximas semanas, ya que podría desarrollarse rápidamente una sequía a corto plazo.

Sur

Las fuertes lluvias (de 1,5 a 3 pulgadas, localmente más) dieron como resultado una mejora de categoría 1 en el centro-oeste de OK y el noroeste de TX, estableciendo un gradiente estrecho de oeste a este en las categorías Dx. En áreas como el condado de Custer en el oeste de Oklahoma, que localmente recibió hasta 8 pulgadas de lluvia durante la semana pasada, se justificó una mejora de dos categorías. Esta fuerte lluvia se extendió hacia el sur hasta el sureste de Nuevo México y el oeste de Texas, donde partes de la cuenca del Pérmico, las montañas Davis y Big Bend recibieron más de 2 pulgadas a principios de junio. Más al este, a través de partes del centro y este de Texas, junto con el noroeste de Luisiana, el aumento de los déficits de precipitación a corto plazo (de 2 a 4 pulgadas), las temperaturas superiores a lo normal y las tasas de evapotranspiración más altas dieron como resultado una degradación de categoría 1. Esta expansión de sequía anormal (D0) fue respaldada por SPEI de 30 a 60 días y estas áreas se destacan en el producto EDDI para sequía repentina. El este de Texas y el norte de Luisiana deberán ser monitoreados de cerca en las próximas semanas, ya que la sequía a corto plazo podría desarrollarse rápidamente. Las fuertes lluvias locales (más de 1 pulgada) la semana pasada dieron como resultado una ligera disminución en D0 para el noreste de Luisiana. El 6 de junio, fuertes lluvias se extendieron al sur del río Ohio, lo que provocó una disminución general en las pequeñas áreas de D0 en Tennessee.

Medio Oeste

Las fuertes lluvias recientes del 6 de junio dieron como resultado una disminución de la sequedad anormal (D0) en Indiana, Kentucky y el sureste de Illinois. Sin embargo, el centro-este de Illinois se perdió esta lluvia y los SPI de 30 a 60 días junto con la humedad del suelo de NASA SPoRT respaldan la introducción de D0 en esa parte de Illinois. Existen déficits de 30 días de más de 2 pulgadas en partes del centro hasta el sur de Illinois y el sureste de Iowa. La falta de calor anómalo hasta principios de junio ha limitado las tasas de evapotranspiración y el secado significativo de la capa superior del suelo.

Altas Llanuras

Las fuertes lluvias (1.5 a 3 pulgadas, localmente más) la semana pasada resultaron en una mejora de categoría 1 en el sureste y centro de Kansas. Más de 1,5 pulgadas de lluvia la semana pasada, junto con la humedad del suelo y los SPI a largo plazo, respaldaron un cambio de sequía excepcional (D4) a sequía extrema (D3) en partes del suroeste de Kansas y el sureste adyacente de Colorado. Lluvias benéficas generalizadas, superiores a 1 pulgada, la semana pasada provocaron una mejora de 1 clase en gran parte del este de Colorado. Las franjas de fuertes lluvias (más de 1 pulgada) también llevaron a mejoras en varias categorías de Dx en partes de Nebraska y Dakota del Sur. Las precipitaciones muy por encima de lo normal durante los últimos 30 a 90 días y los percentiles de humedad del suelo respaldaron la eliminación de la sequía moderada (D1) en gran parte del centro-oeste de Wyoming.

Oeste

El final húmedo de la primavera continúa apoyando la mejora de las condiciones desde el noroeste del Pacífico hacia el este hasta las Montañas Rocosas del Norte. Con base en múltiples indicadores que incluyen la precipitación primaveral, la humedad del suelo y el flujo de agua, se realizó una mejora amplia de clase 1 en el este de Washington y también se apoyaron mejores condiciones para partes de Oregón. La precipitación reciente fue suficiente para cambiar los SPEI a largo plazo fuera de la sequía excepcional (D4) en gran parte de los condados de Klamath y Lake de Oregón. En el oeste de Idaho, la sequía severa (D2) mejoró a sequía moderada (D1) basándose en parte en la respuesta hidrológica en la cuenca de Weiser. El suroeste de Montana tuvo una mejora de clase 1, luego de la humedad reciente, la recarga de humedad del suelo y el SPI de 60 días. Cantidades de precipitación de 1 a 3 pulgadas junto con temperaturas por debajo del promedio dieron como resultado una mejora de categoría 1 en partes del centro-norte de Montana. A pesar del patrón fresco reciente, los SPI de 90 a 180 días respaldaron la degradación de 1 categoría en partes del norte de Montana. Los impactos en esta área de sequía que empeora incluyen alimentación suplementaria requerida, suelos muy secos y estanques de almacenamiento secos. Con base en SPI de 90 días y consideraciones hidrológicas en la cuenca del río Sevier,

la sequía extrema (D3) a excepcional (D4) se expandió en partes de Utah. La sequía generalizada de severa a excepcional persiste en gran parte del suroeste, la Gran Cuenca y California. Las preocupaciones sobre la producción de energía hidroeléctrica en los embalses de California y Nevada continúan debido a los bajos niveles de agua.

Caribe

El aumento de los déficits de precipitación de 30 a 60 días, junto con el apoyo de caudales de 28 días, resultó en una degradación generalizada de categoría 1 en gran parte de Puerto Rico.

St. John, St. Croix y St. Thomas no informaron precipitaciones mensurables durante la primera semana de junio a medida que la sequía continuaba intensificándose. La clasificación de St. Croix no ha cambiado desde la semana pasada (D3, sequía extrema), mientras que St. John y St. Thomas se deterioraron a D2 (sequía severa). La sequedad ha sido particularmente aguda desde principios de mayo. St. John's recibió solo 0,45 pulgadas para mayo y la primera semana de junio, mientras que St. Thomas informó 0,88 pulgadas (2,63 pulgadas por debajo de lo normal, 25 por ciento) y St. Croix 0,35 pulgadas (3,7 pulgadas por debajo de lo normal, 9 por ciento). St. John y St. Thomas tienen una designación de sequía menos severa principalmente debido a las lluvias de marzo a abril. Durante el período de 2 meses, St. Thomas registró 5,19 pulgadas de lluvia (1,09 pulgadas por encima de lo normal) mientras que St. Croix recibió solo 1,38 pulgadas (2,46 pulgadas por debajo de lo normal). Esto siguió a las precipitaciones casi por encima de lo normal de enero a febrero. Desde marzo hasta la primera semana de junio, St. Croix recibió un total de solo 1.73 pulgadas de lluvia donde normalmente caerían 7.89 pulgadas (22 por ciento)

Pacífico

Debido a las bajas cantidades de precipitación desde el derretimiento de la capa de nieve invernal y los períodos de temperaturas superiores a lo normal desde fines de mayo, es posible que la próxima semana se necesite un gran aumento en la sequía anormal (D0) necesaria para Alaska continental y una expansión sustancial de D1. Los índices meteorológicos de incendios también se consideraron en la gran expansión D0. Del 27 de mayo al 5 de junio, las temperaturas máximas fueron de 70F o más en Anchorage.

Las lluvias de vientos alisios continuaron en gran parte de las islas hawaianas y las lluvias más intensas de la semana pasada se produjeron a lo largo de las laderas hacia el oeste de la Isla Grande. Por lo tanto, se realizó una mejora general de categoría 1 en la mayor parte de la Isla Grande. También se realizaron ligeras mejoras en partes de

Maui debido a las lluvias recientes. La sequía persistente en el este de Oahu provocó la degradación de sequía anormal (D0) a sequía moderada (D1).

Una sequía significativa está afectando la periferia norte, este y sur de las islas afiliadas de los EE. UU. en el hemisferio norte. La sequía se está intensificando nuevamente en Kapingamarangi en el sur de Micronesia, deteriorándose a D2 (sequía severa) después de otra semana seca. La sequía ha afectado con frecuencia a Kapingamarangi desde fines de 2019. Por el contrario, las fuertes lluvias cayeron en el este de las Islas Marshall, lo que provocó una mejora continua de la sequía persistente allí. Wotje mejoró a D0 esta semana (sequedad anormal), por lo que ya no se considera que estén en sequía. Más al norte, la sequía continúa afectando a las Islas Marianas, la intensidad de la sequía (D0) no ha cambiado desde la semana pasada.

En general, las lluvias fueron más intensas en partes del este de Micronesia y las Islas Marshall la semana pasada. Pohnpei, Wotje y Mili estuvieron particularmente húmedos, reportando de 4.0 a 6.2 pulgadas de lluvia. Las lluvias ligeras a moderadas cayeron más al oeste de Palau hacia el este a través del centro de Micronesia. La mayoría de los sitios en Micronesia reportaron cantidades de lluvia subóptimas esta semana, pero cayó suficiente lluvia en las semanas anteriores para contener cualquier sequía anormal (D0) en este momento. Durante las últimas semanas han sido suficientes para mantener a raya la sequedad anormal (D0) por ahora. Se informó poca o ninguna lluvia en las Marianas (donde prevalecen las condiciones D0) y Kapingamarangi (donde la sequía se intensificó a D2 esta semana). Las lluvias también fueron inusualmente escasas en Pago Pago, pero las lluvias recientes han sido suficientes para evitar la sequía anormal (D0) por el momento.

Palau (Koror) no se ha visto afectado por la sequía recientemente, y esa tendencia parece continuar. Aunque Koror informó solo 1,79 pulgadas la semana pasada, 15 de las 17 semanas anteriores fueron más húmedas de lo normal y muy por encima de la cantidad necesaria para que el suministro de agua se mantenga al ritmo de la demanda. Desde fines de abril hasta mayo, Koror promedió 5,73 pulgadas por semana, registrando casi 34,4 pulgadas de lluvia en comparación con un promedio de 16,05 pulgadas. Las estadísticas a más largo plazo no son menos impresionantes, con Koror promediando más de 3,9 pulgadas por semana desde principios de febrero hasta finales de mayo.

En el oeste de Micronesia, Yap estaba en la cúspide de una sequía anormal (D0) antes de que cayeran lluvias sustanciales la semana pasada. Estuvo extremadamente seco durante gran parte de mayo, con un total de 3 semanas de solo 0,66 pulgadas cuando lo normal era más de 5,75 pulgadas. Pero la lluvia aumentó en las últimas dos semanas, cerca del umbral semanal subóptimo de 2 pulgadas a fines de mayo y 2,75 pulgadas la primera semana de junio.

Mientras tanto, Ulithi y Woleai han sido similares durante los últimos meses. Ambos reportaron lluvias inusualmente ligeras esta semana, pero ha caído suficiente lluvia durante las últimas semanas para evitar una sequía anormal (D0). Entre 0,3 y 0,4

pulgadas cayeron la semana pasada, o menos del 15 por ciento de lo normal. Sin embargo, durante las semanas anteriores, las lluvias en general no han sido notables durante varios meses, con períodos cortos alternados de lluvias subóptimas intercalados con períodos cortos de lluvia intensa. Antes de esta semana seca, Woleai registró más de 47 pulgadas de lluvia desde principios de marzo hasta finales de mayo, o un promedio de más de 3,6 pulgadas por semana, lo que es más que suficiente para satisfacer la demanda. Ulithi estuvo anormalmente húmedo desde principios de abril hasta principios de mayo, con un promedio de más de 4,6 pulgadas de lluvia por semana, mientras que lo normal fue menos de 1,1 pulgadas por semana. Se han informado allí semanas secas y húmedas alternas desde principios de mayo.

En Chuuk, las precipitaciones aumentaron considerablemente tras un febrero seco. La laguna experimentó el octavo mes de mayo más húmedo en 71 años registrados, el quinto período de abril a mayo de dos meses más húmedo. Solo 1,57 pulgadas cayeron la primera semana de junio, pero con los 2 meses anteriores con un promedio de más de 4,2 pulgadas por semana, la sequedad anormal no es una preocupación inmediata.

Las precipitaciones han sido desfavorablemente ligeras desde mediados de mayo en Lukinoch. Solo 3,91 pulgadas cayeron durante las últimas 4 semanas, cuando lo normal sería 11,5 pulgadas. Tres de esas semanas, las cantidades fueron menos de la mitad del umbral donde el agua es suficiente para satisfacer la demanda. Pero dada la falta de impactos y algunos meses de lluvia suficiente para un exceso, la sequía anormal (D0) no se ha introducido en este momento, pero puede ser necesaria si las próximas semanas no traen fuertes precipitaciones.

Esta fue la tercera semana consecutiva con precipitaciones por debajo de lo normal en Nukuoro. Esta semana fue la más seca desde mediados de febrero, pero cada una de las 15 semanas anteriores superó la cantidad necesaria para que el suministro de agua se mantuviera al día con la demanda, aunque algunas de esas semanas fueron más secas de lo normal.

De todas las islas del Pacífico afiliadas a los EE. UU., Kapingamarangi está soportando las condiciones de sequía más intensas, como ha sido el caso varias veces en los últimos 3 años. De febrero a mediados de marzo hubo lluvias suficientes de alrededor de 3,3 pulgadas por semana, pero las lluvias cayeron notablemente a mediados de marzo y, con 2 excepciones, cada semana desde entonces ha sido considerablemente más seca de lo normal y muy por debajo del umbral en el que el suministro de agua se mantiene al nivel de la demanda. .

Los totales de lluvia semanales de Kapingamarangi han promediado menos de una pulgada durante las últimas 13 semanas, y no llovió durante 4 de las últimas 5 semanas, incluida la semana pasada. Desde principios de mayo, ha caído un total de solo 0,8 pulgadas cuando lo normal sería más de 13,5 pulgadas. Tres pulgadas de lluvia cayeron la primera semana de abril, y 4,21 pulgadas arrojaron Kapingamarangi cerca de la cúspide de abril y mayo. Las otras 11 semanas desde mediados de marzo

normalmente traerían casi 30 pulgadas de lluvia, pero este año han caído menos de 5,7 pulgadas (o un promedio semanal normal de 2,7 pulgadas y un promedio semanal observado de 0,5 pulgadas).

Este año, las lluvias del período de 3 meses de marzo a mayo, el período de 2 meses de abril a mayo y el mes de mayo fueron los más secos registrados (28 años). En cuanto a las precipitaciones a más largo plazo, las estadísticas son solo marginalmente mejores. Enero-mayo fue el segundo período más seco registrado, al igual que el período de 10 meses de agosto de 2021 a mayo de 2022. De los períodos de 1 a 12 meses que terminaron en mayo, el más húmedo estadísticamente fue de diciembre de 2021 a mayo de 2022, que se ubicó en el cuarto lugar más seco en 25 años de registro.

La sequía ha aumentado y disminuido en Kapingamarangi desde diciembre de 2019, y los déficits de humedad nunca se recuperaron por completo entre períodos secos. Durante todo el período de diciembre de 2019 a mayo de 2022 (30 meses), Kapingamarangi tiene casi 100 pulgadas de lluvia por debajo de lo normal. Los totales mensuales tienen un promedio de 7,46 pulgadas, mientras que normalmente caerían 10,71 pulgadas por mes.

En el este de Micronesia, Pingelap ha estado más seco de lo normal durante las últimas 5 semanas. Desde principios de mayo, los totales de lluvia semanal promediaron 1,44 pulgadas (7,22 en total), mientras que el promedio semanal normal es de casi 3 pulgadas. Pero D0 (sequedad anormal) no se introdujo esta semana debido a que en las últimas 5 semanas subnormales, solo 3 estuvieron por debajo de la cantidad necesaria para que el suministro de agua se mantuviera al día con la demanda. Además, las 7 semanas anteriores fueron muy húmedas. Desde finales de marzo hasta principios de mayo, cayó un promedio de 6 pulgadas de lluvia cada semana, cuando normalmente el promedio semanal es de 2,88 pulgadas.

Desde mediados de abril hasta principios de junio, los totales de lluvia han alternado entre un poco por encima de lo normal y un poco por debajo de lo normal, impidiendo la introducción de sequía anormal (D0) a pesar de la segunda semana más seca desde finales de febrero. Además, las 6 semanas antes de mediados de abril fueron muy húmedas. Las precipitaciones promediaron más de 10 pulgadas por semana, cuando normalmente caería un promedio de 4,46 pulgadas cada semana. La climatología húmeda aquí significa que el umbral para que el suministro de agua se mantenga al día con la demanda (más de 2 pulgadas) se alcanza cuando las cantidades semanales están por encima de la mitad de lo normal.

Pohnpei se ha visto inundado con precipitaciones más intensas de lo normal desde al menos principios de febrero. Solo 1 de las últimas 18 semanas fue más seca de lo normal, e incluso entonces, los totales de lluvia excedieron el umbral óptimo en un 50 por ciento. Desde principios de febrero, los totales de lluvia semanal han promediado casi 5,7 pulgadas, mientras que lo normal es de alrededor de 3,5 pulgadas. Los 5 meses de enero a mayo fueron los segundos más lluviosos en 71 años de registros.

La sequía en el este de las Islas Marshall ha disminuido con el inicio de fuertes lluvias hace unas 3 semanas. Los sitios occidentales (Kwajalein, Ailinglapalap y Jaluit) habían estado al borde de una sequía anormal (D0) hasta principios o mediados de mayo, cuando las lluvias aumentaron y han estado por encima de lo normal. Al este, Majuro está cerca de una sequía anormal (D0) con lluvias por debajo de lo normal reportadas en 5 de las últimas 6 semanas. Pero la última semana de mayo superó significativamente el umbral de condiciones hidrológicas óptimas (donde la oferta se mantiene a la altura de la demanda) en un 50 por ciento (3,15 pulgadas), y la primera semana de junio apenas superó esa marca (1,97 pulgadas), manteniendo una sequedad anormal (D0) a raya por un pequeño margen.

El último vestigio de sequía impactante en Marshalls está en Wotje, donde las condiciones han ido mejorando lentamente durante varias semanas. Las condiciones mejoraron a D0 esta semana después de una tercera semana consecutiva de precipitaciones por encima de lo normal. Febrero hasta principios de marzo había sido excepcionalmente seco, con un promedio de lluvia de apenas 0,01 pulgadas por semana, con un promedio semanal de poco menos de 0,5 pulgadas.

Mili en el sureste de Marshalls no está preocupado por la sequía en este momento, con 15 semanas seguidas de lluvia por encima de lo normal que también superó el umbral óptimo de 2 pulgadas por semana. Durante casi 4 meses, la precipitación semanal promedió 4,88 pulgadas, en comparación con un promedio de 2,16 pulgadas. El total semanal superior fue de 12,32 pulgadas del 6 al 12 de abril. Mili experimentó el cuarto mayo más húmedo en 38 años de registro, y cada uno de los totales de 2 a 12 meses que terminaron en mayo de 2022 fueron los más húmedos registrados.

Todos los lugares en las Marianas se clasifican como anormalmente secos (D0), sin cambios desde la semana pasada. Después de un ligero aumento en las lluvias la última semana de mayo, las condiciones se secaron y solo cayeron unas pocas centésimas de pulgada de lluvia en cada lugar la primera semana de junio. Durante las últimas 6 semanas, Guam registró menos de la mitad de las precipitaciones normales (3,39 pulgadas; normal 7,34), al igual que Rota (2,46 pulgadas; normal 5,74). A Saipan le fue un poco mejor en relación con el normal, pero no mucho (2,46 pulgadas; normal 5,74 pulgadas). El deterioro puede introducirse pronto si los totales de lluvia no aumentan.

Los totales de lluvia semanales han sido muy variables en Pago Pago desde principios de febrero. Entre 1 y 3 semanas de exceso de lluvia se alternarían con períodos de varias semanas de totales deficientes. Las últimas 2 semanas se han secado nuevamente luego de un período generalmente húmedo de 4 semanas. La última semana de mayo y la primera semana de junio trajeron 0,96 pulgadas y 0,42 pulgadas, respectivamente (1,38 pulgadas en total). La precipitación normal para estas 2 semanas es de 3,77 pulgadas. El potencial para desarrollar sequía anormal (D0) será monitoreado a medida que Samoa Americana se mueva hacia una época del año relativamente seca.

Mirando hacia el futuro

Se pronostica que un par de sistemas de baja presión y frentes fríos arrastrados traerán lluvias intensas y generalizadas al noreste y el Atlántico medio hasta el 11 de junio. la costa norte del Golfo el 9 y 10 de junio. Es probable que el patrón húmedo continúe desde el noroeste del Pacífico hacia el este hasta el norte de las Montañas Rocosas y el norte de las Grandes Llanuras hasta el 13 de junio, a medida que emerge otro sistema de baja presión desde el noreste del Pacífico. Mientras tanto, se pronostica que una ola de calor se expandirá desde California y el desierto del suroeste hacia el este hasta el centro-sur de los EE. UU. a mediados de junio.

La perspectiva de 6 a 10 días del Centro de Predicción del Clima (válida del 14 al 18 de junio de 2022) muestra grandes probabilidades (más del 70 por ciento) de temperaturas superiores a lo normal en el sur de las Grandes Llanuras, el valle bajo del Misisipí y el sureste. Se favorece que las temperaturas por debajo de lo normal persistan en todo el noroeste del Pacífico. Las precipitaciones por debajo de lo normal son favorecidas para el centro y el sur de las Grandes Llanuras, el valle medio y bajo del Mississippi y gran parte del Cinturón de Maíz. Las probabilidades de precipitaciones por encima de lo normal son elevadas en el noroeste del Pacífico junto con partes del suroeste.

Autor(s)

Richard Tinker, NOAA/NWS/NCEP/CPC

Brad Pugh, NOAA/CPC