

Resumen nacional de sequía para 1 abril, 2025

Resumen

Esta semana, el Monitor de Sequa de EE. UU. (USDM) observó una mejora en las condiciones relacionadas con la sequía en las áreas del Oeste Intermontano, las Altas Llanuras, el Sur, el Alto Medio Oeste y el Sureste. Mientras tanto, las condiciones se degradaron en el mapa en el Suroeste, el Bajo Medio Oeste y el Atlántico Medio. En el oeste, una serie de tormentas del Pacífico trajo lluvias significativas a las áreas costeras de menor elevación y fuertes nevadas de montaña en las cordilleras Klamath, Cascadas y Sierra Nevada, así como a las elevaciones más altas de la Gran Cuenca y las Montañas Rocosas del centro y norte. En las cordilleras costeras del norte de California, los totales de lluvia de 7 días superaron los 10 pulgadas en algunas áreas, según datos preliminares del Centro de Pronóstico de Ros California-Nevada del Servicio Meteorológico Nacional (NWS). La serie de tormentas proporcionó un impulso de final de temporada a los niveles de la capa de nieve de las montañas, incluso en California, donde la capa de nieve a nivel estatal (1 de abril) fue del 96% de lo normal, según el Departamento de Recursos Hídricos de California. En el suroeste, la sequía se expandió e intensificó en áreas del sureste y noreste de Arizona, el noreste de Nuevo México y el suroeste de Colorado, donde los niveles de la capa de nieve están por debajo de lo normal en las cordilleras de San Juan y Sangre de Cristo. En el sur, el sur de Texas recibió precipitaciones récord (más de 12 pulgadas) que llevaron a mejoras generalizadas en las condiciones relacionadas con la sequía. En el Alto Medio Oeste, una tormenta de hielo afectó al noreste de Wisconsin y al norte de Michigan, lo que provocó cortes de energía generalizados. La precipitación de la tormenta llevó a mejoras en el mapa en esas áreas. En partes del noreste, algunas mejoras ocurrieron en respuesta a una combinación de factores, incluyendo precipitaciones normales a superiores a lo normal (últimos 30 a 60 días), aumento de los caudales fluviales y cierta recuperación en los niveles de agua subterránea. En el sureste, la sequía a corto plazo se expandió a las áreas de sequía desde Carolina del Norte hasta Georgia, mientras que Florida vio una pequeña mejora en las condiciones de sequía en respuesta a los recientes eventos de lluvia.

En términos de almacenamiento de embalses en áreas del oeste, los embalses de California continúan estando en o por encima de los promedios históricos para la fecha (1 de abril), con los dos embalses más grandes del estado, el lago Shasta y el lago Oroville, al 113% y 121% del promedio, respectivamente. En el suroeste, al 31 de marzo, el lago Powell está 32% lleno (55% del nivel de almacenamiento típico), el lago Mead está 34% lleno (54% del promedio), y el sistema total del Bajo Colorado está 41% lleno (en comparación con el 42% lleno en la misma época el año pasado), según la Oficina de Reclamación de EE. UU. En Arizona, el Proyecto del Río Salado informa que los embalses del sistema del Río Salado están 72% llenos, el sistema del Río Verde 53% lleno, y el sistema total de embalses 70% lleno (en comparación con el 89% lleno hace un año). En Nuevo México, el embalse más grande del estado a lo largo del Río Grande está actualmente 14% lleno (30% del promedio). En el noroeste del Pacífico, el lago Franklin D. Roosevelt de Washington está lleno al 81 % (148 % del promedio para la fecha), el embalse American Falls de Idaho en el río Snake está lleno al 96 % (108 % del

promedio) y el embalse Hungry Horse en el noroeste de Montana est lleno al 72 % (108 % del promedio).

Noreste

En el mapa de esta semana, se observaron mejoras en reas de Nueva York, Vermont, Nuevo Hampshire, Connecticut, Nueva Jersey y Delaware en respuesta a las precipitaciones beneficiosas observadas durante los ltimos 30 a 60 das. Por el contrario, la sequa a corto plazo y los bajos niveles de caudal llevaron a la expansin de las reas de sequa en Pensilvania, Maryland y Virginia Occidental. Durante la semana, se observaron acumulaciones ligeras de precipitacin (<1 pulgada de liquido) en toda la regin y las temperaturas promedio estuvieron por encima de lo normal, especialmente en la extensin sur, donde las temperaturas fueron de 6 a 10 grados F por encima de lo normal. En trminos de condiciones de la capa de nieve, el Centro Nacional de Teledeteccin Hidrolgica Operacional (NOHRSC) del NWS informa que la regin noreste est actualmente cubierta por nieve en un 33,2% (82,7% el mes pasado) con una profundidad promedio de 2,1 pulgadas y una profundidad mxima de 43,3 pulgadas.

Sureste

Durante la semana pasada, se observaron acumulaciones de lluvia de ligeras a moderadas en toda la regin, con las acumulaciones ms intensas (de 5 a 10 cm) en el Panhandle de Florida, el sur de Florida y el noreste de Alabama. Como consecuencia de las lluvias en Florida, las zonas de sequa severa (D2) y sequa moderada (D1) se redujeron en el mapa. Por el contrario, la continua sequa a corto plazo (dficit de lluvia de 2,5 a 7,6 cm durante los ltimos 30 das) en Virginia, las Carolinas y Georgia provoc la expansin de las zonas de sequa moderada (D1). En cuanto a las temperaturas medias de la semana, toda la regin experiment temperaturas superiores a lo normal, con las mayores anomalas (entre 2,6 y 5,6 C) en Virginia y Carolina del Norte.

Sur

En general, prevalecieron condiciones secas en las reas de la regin, incluyendo Oklahoma, el oeste de Texas, Arkansas y el sur de Misisipi. Por el contrario, las regiones de la Costa del Golfo de Texas y Luisiana recibieron lluvias muy fuertes en algunas reas (de 5 a 15 pulgadas segn estimaciones de radar), con las acumulaciones ms altas observadas a lo largo de la regin sur de la Costa del Golfo de Texas y las llanuras del sur de Texas. El diluvio de lluvia provoc inundaciones potencialmente mortales y la prdida de vidas. Las lluvias tambin llevaron a mejoras significativas en las condiciones relacionadas con la sequa, con mejoras de mltiples categoras en el mapa.

En contraste, las condiciones secas a corto plazo continuaron en Arkansas, aunque se esperan fuertes lluvias que afecten al estado durante la próxima semana. Durante la semana, las temperaturas promedio estuvieron muy por encima de lo normal, con anomalías que oscilaron entre 4 y 10 grados F. En cuanto a las condiciones de los embalses en Texas, se informa que los embalses estatales están al 75.3% de su capacidad, con muchos embalses en la parte este del estado en buenas condiciones, mientras que numerosos embalses en la parte oeste del estado continúan experimentando niveles por debajo de lo normal, según Water for Texas (2 de abril).

Medio Oeste

En el mapa de esta semana, se lograron mejoras generalizadas en respuesta a una importante tormenta de hielo e invierno que afectó al noreste de Wisconsin y al norte de Michigan. La tormenta causó cortes de energía generalizados, lo que llevó a declaraciones de estado de emergencia en ambos estados. Los totales de precipitación para la tormenta variaron de 2 a 4+ pulgadas (líquido), con los totales más altos registrados en el norte de Michigan. En otras partes de la región, la precipitación de 7 días varió de acumulaciones de 1 a 2 pulgadas, mientras que algunas áreas, incluyendo el norte de Minnesota, el norte de Illinois y el este de Iowa, estuvieron generalmente secas la semana pasada. Según NWS NOHRSC, la región del norte de los Grandes Lagos está actualmente cubierta de nieve en un 44.4%, con una profundidad promedio de 3.5 pulgadas y una profundidad máxima de 58.6 pulgadas. Durante la semana, las temperaturas promedio estuvieron por encima de lo normal en la mayor parte de la región, con anomalías que variaron de 2 a 10 grados F por encima de lo normal, excluyendo el norte de Michigan y Wisconsin, donde la temperatura estuvo de 2 a 6 grados F por debajo de lo normal.

Altas Llanuras

En el mapa de esta semana, solo se observaron cambios menores en la región, concretamente en el oeste de Nebraska y zonas de Kansas. En las Sand Hills de Nebraska, la precipitación de los últimos 7 días (2.5 a 5 cm) provocó mejoras de una categoría en zonas de sequía severa (D2) y extrema (D3). En Kansas, las condiciones secas de corta duración (de los últimos 30 a 60 días) provocaron la expansión de zonas aisladas de sequía en el suroeste y noreste del estado. Durante la semana, prevalecieron condiciones generalmente secas en gran parte de la región, con pequeñas acumulaciones (de 1.27 a 2.54 cm de líquido) en el sur y el este de Dakota del Sur, el norte de Nebraska y el sureste de Kansas. En cuanto a las temperaturas, se registraron promedios cercanos a lo normal en toda la región.

Oeste

En el oeste, una serie de tormentas del Pacífico trajo fuertes lluvias a las zonas bajas y nieve a las zonas altas del noroeste del Pacífico y el norte de California. En la zona del lago Tahoe, las nevadas totales en 7 días oscilaron entre 30 cm y más de 60 cm, mientras que en las zonas de las montañas Klamath del noroeste de California se registraron nevadas de hasta 90 cm. Otras regiones montañosas, como las Cascadas de Oregón, las Wasatch y Uintas de Utah, y el norte de las Montañas Rocosas, registraron acumulaciones de entre 15 cm y 60 cm. En cuanto a la capa de nieve regional, la red SNOTEL del NRCS informa (1 de abril) los siguientes niveles de SWE a nivel regional (HUC de 2 dígitos): Noroeste del Pacífico 104 %, Misuri 98 %, Alto Colorado 89 %, Gran Cuenca 103 %, Bajo Colorado 49 % y Río Grande 49 %. En el suroeste desértico, las zonas de sequía extrema (D3) se expandieron en el noreste y sureste de Arizona como consecuencia de caudales fluviales muy bajos y precipitaciones por debajo de lo normal desde el inicio del Año Hidrológico (1 de octubre). En zonas del suroeste y centro-sur de Colorado, se observaron degradaciones en el mapa, donde las condiciones de la capa de nieve en numerosas estaciones SNOTEL del NRCS reportan niveles de SWE muy por debajo de lo normal. Asimismo, se han observado condiciones deficientes de la capa de nieve en las cordilleras del sur de Utah, el norte de Arizona y el norte de Nuevo México.

Caribe

No se realizaron cambios en Puerto Rico en el mapa de esta semana.

La alta presión superficial que domina el Atlántico tropical contribuyó a condiciones ventosas en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos durante la última semana de sequía (del miércoles 26 de marzo al martes 1 de abril de 2025). Se produjeron chubascos con vientos alisios al inicio de la semana, y la cobertura de precipitaciones aumentó más adelante, a medida que una vaguada prefrontal se acercaba a la región desde el noroeste. No se registraron cambios en las proyecciones de sequía para las tres islas esta semana, ya que la región de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos está en transición de la estación seca (climatológica) a la estación lluviosa.

En Santa Cruz, las mediciones de precipitación variaron desde 0,18 pulgadas en VI-SC-24 (Christiansted 2,1 ENE) hasta 1,45 pulgadas en VI-SC-20 (Frederiksted 1,7 ESE).

Las cantidades intermedias de lluvia para la semana incluyeron 0,51 pulgadas en VI-SC-10 (Christiansted 1,6 E), 0,55 pulgadas en VI-SC-25 (Christiansted 4,4 W), 0,64 pulgadas en VI-SC-23 (Christiansted 6,5 W), 0,65 pulgadas en VI-SC-30 (Christiansted 1,7 W), 0,72 pulgadas en VI-SC-29 (Frederiksted 2,5 NNE), 1,14 pulgadas en VI-SC-35 (Frederiksted 1,3 ENE) y 1,18 pulgadas en VI-SC-34 (Frederiksted 1,9 NE).

Datos provisionales del pozo Adventure 28 del USGS mostraron que, hasta hace varios días, la profundidad del agua (pies bajo la superficie terrestre) había disminuido constantemente durante marzo, de aproximadamente 5,08 metros a 5,28 metros. Entre el 29 y el 30 de marzo, lluvias y/o tormentas eléctricas intermitentes provocaron un pico en la serie temporal de datos del pozo, que mostró un breve aumento del nivel freático a 5,9 metros, antes de descender y estabilizarse en torno a los 5,2 metros a finales de mes, justo cuando otra ronda de precipitaciones llegó a la región.

En San Juan, los totales de lluvia durante la semana de sequía oscilaron entre 0,27 pulgadas en VI-SJ-4 (Baha Cruz 0,8 NE) y poco menos de una pulgada (0,99 pulgadas) en VI-SJ-10 (Baha Cruz 3,1 NNO). Varios totales de lluvia intermedios incluyeron 0,47 pulgadas en VI-SJ-8 (Baha Cruz 7,4 E), 0,60 pulgadas en VI-SJ-3 (Playa Azotada por el Viento) y 0,96 pulgadas en VI-SJ-5 (Baha Cruz 1,6 E).

En Windswept Beach, la precipitación total en 2024 fue de 70.02 pulgadas, lo que lo convirtió en el tercer año más lluvioso registrado, después de 2017 y 2010. Los totales mensuales de precipitación para enero, febrero y marzo de 2025 fueron, respectivamente, de 1.52 pulgadas, 2.16 pulgadas y 3.54 pulgadas. Además, marzo fue húmedo y muy ventoso, con más del 60% de la precipitación mensual en un solo día (el 14 de marzo). Los valores del índice de Precipitación Estandarizado (IPS) para Windswept Beach para los períodos de 1, 3, 6, 9 y 12 meses fueron, respectivamente, de +1.61, +0.60, +1.00, +1.05 y +1.55. Esto indica condiciones húmedas para todos los períodos.

Datos provisionales del pozo Susannaberg DPW-3 del USGS mostraron un descenso gradual del nivel del agua del pozo durante marzo, comenzando alrededor de 2,5 metros (por debajo de la superficie terrestre) a principios de mes y terminando cerca de 2,9 metros. Se produjo una breve interrupción del patrón entre el 13 y el 14 de marzo, cuando el nivel del agua del pozo subió de 2,7 metros a 2,6 metros, antes de retomar su tendencia descendente. Esto coincidió con un período de chubascos y tormentas.

En Santo Tomás, las precipitaciones registradas durante esta semana de sequía oscilaron entre 0,7 mm en VI-ST-14 (Nadir 0,3 E, Tropical Marino) y 2,7 mm en VI-ST-13 (Charlotte Amalie 1,2 NNO). Otros dos informes incluyeron 1,8 mm de lluvia en VI-ST-15 (Charlotte Amalie Oeste 1,3 N) y 2,3 mm en VI-ST-5 (Charlotte Amalie Oeste 4,2 ONO).

Datos provisionales del pozo de la Escuela Primaria 3 del USGS mostraron que los niveles de agua subterránea oscilaron entre 1.2 y 2.1 metros (por debajo de la superficie terrestre) durante marzo, con un valor cercano a los 1.8 metros al final del mes. Entre el 13 y el 15 de marzo se produjo un aumento abrupto del nivel del agua del pozo (de 2.1 metros a 1.2 metros), antes de descender gradualmente hasta su nivel actual. El aumento abrupto del nivel del agua del pozo a mediados de marzo coincidió con un período de lluvias y tormentas eléctricas.

Pacífico

No se realizaron cambios en Alaska en el mapa de esta semana.

En las islas hawaianas, prevalecieron condiciones generalmente estables, con solo acumulaciones de lluvia ligeras (<2.5 cm) en todo el estado debido al debilitamiento de los vientos alisios. Se observaron algunos cambios menores en el mapa, incluyendo la expansión de las zonas anormalmente secas (D0) en la zona barlovento de la Isla Grande, así como en Molokai. En cuanto a los impactos, la actividad fluvial en todo el estado se mantiene por debajo de los niveles normales, y en la Isla Grande se han reportado varios niveles bajos de agua en los sistemas de captación de agua de lluvia, según el Servicio Meteorológico Nacional en Honolulu.

Durante la última semana de sequía (miércoles y martes, 26 de marzo - 1 de abril de 2025), las vaguadas de vientos alisios y las líneas de cizalladura fragmentadas trajeron lluvias relativamente ligeras y condiciones ventosas a la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte (CNMI). Una perturbación débil al sur de la República de Palaos ayudó a desplazar un área de convergencia de vientos alisios hacia la República y los Estados Federados de Micronesia (FSM) occidentales, pero las precipitaciones fueron muy limitadas durante la semana. Sobre los FSM orientales, un sistema convectivo de mesoescala (MCS) y la convergencia de vientos alisios trajeron fuertes lluvias a partes de la región. Los alisios relativamente secos prevalecieron en la República de las Islas Marshall (RMI), y la mayoría de las estaciones estuvieron muy por debajo del umbral de lluvia semanal de 2 pulgadas requerido para satisfacer la mayoría de las necesidades de agua. Al sur del ecuador, Samoa Americana experimentó lluvias y tormentas eléctricas durante partes de la semana de sequía de dos vaguadas separadas de nivel medio que se acercaron desde el noreste. Las lluvias excesivas y las inundaciones repentinas no fueron un problema esta semana, en gran parte gracias a que la Zona de Convergencia del Pacífico Sur (SPCZ) se mantuvo bastante al sur de las islas.

Las estimaciones satelitales de lluvia para los últimos 7 días (SPoRT IMERG) en el Pacífico occidental tropical oscilaron entre 0 y 2 pulgadas (mayores localmente), con precipitaciones más significativas en los Estados Federados de Micronesia (FSM) central y oriental, y en partes de las Islas Marshall. Esta semana se registraron aproximadamente 2,5 cm de lluvia en las inmediaciones de Samoa Americana.

La República de Palaos experimentó una semana seca (es decir, con precipitaciones inferiores al mínimo semanal de 5 cm para cubrir la mayoría de las necesidades hídricas), con 5 mm de lluvia en Koror y 2 mm en Airai, la Oficina de Estadísticas de Palaos (WSO). Como todos los meses desde abril de 2024 han sido húmedos, Palaos continúa sin sequía.

En los Estados Federados de Micronesia (FSM), Yap recibió 1,75 mm de lluvia esta semana, muy por debajo del requisito mínimo semanal de lluvia. Los últimos cuatro meses han sido secos. La clasificación de sequía de Yap se mantiene sin cambios en D1(S), ya que la cantidad de lluvia de la semana anterior, de 7,55 mm, contribuyó a

compensar la degradación adicional. No se dispuso de datos de lluvia en Ulithi ni Fananu esta semana, mientras que en Woleai no se registraron precipitaciones (faltan tres días, pero permanece libre de sequa). La laguna de Chuuk registró 2,94 mm de precipitación esta semana. Aunque se considera una semana seca, esta cantidad de lluvia, sumada a que 10 de los últimos 12 meses fueron húmedos, contribuyó a mantener su clasificación de zona libre de sequa. Las condiciones libres de sequa persisten en Lukunor, que experimentó una semana húmeda (7,62 mm), y los últimos cuatro meses (diciembre de 2024 a marzo de 2025) también han sido húmedos. North Fanif registró lluvia esta semana, con 6,75 mm de lluvia. Nukuoro también registró lluvias esta semana, con más del triple del mínimo semanal requerido (16,5 cm). Las últimas 6 semanas y 7 meses también han sido lluviosos, lo que garantiza que las condiciones sin sequa se mantendrán por un tiempo. Kosrae y Pohnpei también registraron lluvias esta semana, con 13,3 cm y 6,3 cm de lluvia, respectivamente. Ambas localidades se mantienen sin problemas esta semana. Kapingamarangi recibió 9 cm de lluvia la semana pasada de sequa. La precipitación mensual ha sido muy variable durante los últimos 12 meses. Su valor se mantiene sin cambios en D0(S), aunque si la próxima semana también es lluviosa, su valor podrá mejorarse a sin sequa. A diferencia de la semana lluviosa en gran parte de los EFM central y oriental, Pingelap registró una semana seca (1,9 cm). De las últimas 12 semanas, solo una fue lluviosa (la semana que finalizó el 18 de marzo, con 8,3 cm). Por ahora, su valor se mantiene sin cambios en D0(S). Si la próxima semana es seca, serán tres semanas secas seguidas y probablemente será necesaria una degradación de una categoría.

Una semana seca se produjo en las Islas Marianas del Norte (menos del requisito mínimo semanal de 1 pulgada) con totales de precipitación que variaron desde escasos 0,13 pulgadas de lluvia en Guam hasta 0,72 pulgadas en el Aeropuerto Internacional de Saipán (IAP). En Guam, la semana que terminó el 4 de marzo fue la única semana lluviosa en las últimas 12 semanas (3,93 pulgadas), con este total de lluvia cayendo justo por debajo del requisito mínimo mensual de 4 pulgadas. De junio de 2024 a enero de 2025, cada mes fue lluvioso; aunque más recientemente, febrero y marzo de 2025 fueron secos. El Índice de Sequa Keetch-Byram (KBDI), que intenta medir la cantidad de precipitación necesaria para que el suelo regrese a su capacidad de campo completa, superó los 600 esta semana en Guam (cero representa un suelo saturado y 800 un suelo absolutamente seco). Para esta semana, la representación de Guam permanece sin cambios en D0(S). Las precipitaciones intermedias en las Islas Marianas del Norte (CNMI) incluyen Tinian (0,46 mm), Dedado (0,56 mm), Saipán (AMME NPS, 0,56 mm), Agat (1,29 mm) y Rota (1,37 mm). Al igual que en Guam, las últimas 12 semanas en Rota han sido mayormente secas, con solo la semana que finalizó el 4 de marzo con lluvias (5,54 mm). Esta semana, la precipitación se mantiene en D0(S). El último mes lluvioso en Saipán fue en noviembre de 2024, con 15,54 mm de lluvia. La precipitación en Saipán se mantiene en D2(S) esta semana.

En toda la RMI, las precipitaciones semanales oscilaron entre 0 pulgadas en Wotje y Utirik y 2,51 pulgadas en Mili. Wotje ha estado seco las últimas 12 semanas y durante los últimos 4 meses (diciembre de 2024 a marzo de 2025). Su clasificación se mantiene en D1(S) esta semana, pero las condiciones parecen propicias para un mayor deterioro.

la próxima semana a menos que se produzcan precipitaciones significativas. Utirik recibió apenas 0,14 pulgadas de lluvia en marzo, pero mantiene su clasificación en D1(S) por ahora. En contraste, se registraron 6,20 pulgadas de lluvia en Mili en marzo, aunque esta cifra aún está muy por debajo del requisito mínimo mensual de 8 pulgadas. Mili se mantiene libre de sequa. Se registraron precipitaciones intermedias de 0,22 pulgadas en Ailinglaplap, 1,14 pulgadas en Kwajalein (la mayoría de las cuales cayeron el último día de la semana de sequa), 1,30 pulgadas en Majuro y 1,45 pulgadas en Jaluit. En Ailinglaplap, cada mes desde mayo de 2024 hasta diciembre de 2024 fue húmedo, pero hasta el momento en 2025, los primeros tres meses han sido secos. Su descripción de sequa se mantiene en D0(S). Esta misma descripción de D0(S) continúa tanto para Jaluit como para Majuro. Esta última ubicación informó que nueve de los últimos 12 meses han sido húmedos. El embalse de Majuro contiene 23,4 millones de galones de agua dulce (64,3 por ciento de su capacidad). En Kwajalein, las últimas 12 semanas (y los últimos 4 meses) han sido secos. Su designación actual de D1(S) puede requerir un deterioro de una categoría la próxima semana, si no cae lluvia significativa antes de eso.

Al sur del ecuador, Pago Pago, en Samoa Americana, reportó una semana lluviosa con 7,2 mm de lluvia. Los últimos cinco meses han sido lluviosos, con 43,5 mm de lluvia en marzo. Las precipitaciones en zonas de mayor altitud incluyen 2,9 mm en Toa Ridge y 2,5 mm en Siufaga Ridge. La designación de sequa de esta semana en Tutuila se mantiene sin cambios, con condiciones libres de sequa.

Mirando hacia el futuro

El Pronóstico Cuantitativo de Precipitación (QPF) de 7 días del Centro de Predicción Meteorológica (WPC) del NWS indica acumulaciones de precipitación moderadas a fuertes que van desde 3 a más de 10 pulgadas (líquido) en áreas del Sur, el Bajo Medio Oeste y el Noroeste del Pacífico (Washington), con las acumulaciones más fuertes esperadas en las regiones del Valle Medio del Misisipi y el Valle del Río Ohio. Se esperan acumulaciones de ligeras a moderadas en áreas del Sureste, el Atlántico Medio, el Alto Medio Oeste y las Llanuras centrales y meridionales. En las Montañas Rocosas centrales y meridionales, se esperan nevadas en las montañas. El Panorama de 6 a 10 días del Centro de Predicción Climática (CPC) indica una probabilidad moderada a alta de temperaturas superiores a lo normal en el Oeste de EE. UU. y las Llanuras, mientras que se esperan temperaturas inferiores a lo normal en el Medio Oeste y la Franja Este. En términos de precipitación, existe una probabilidad moderada a alta de precipitaciones inferiores a lo normal en la mayor parte del Oeste, las Llanuras, el Sur y el Medio Oeste. En otras zonas, se esperan precipitaciones superiores a lo normal en la costa este y en el noroeste del Pacífico (Washington).

Autor(s)

Anthony Artusa, NOAA/NWS/NCEP/CPC

David Simeral, Western Regional Climate Center