

Resumen nacional de sequía para 15 julio, 2025

Resumen

Los últimos siete días se caracterizaron por la sequía en gran parte del oeste, un patrón activo continuo que trajo lluvias sustanciales a las llanuras del sur y una semana húmeda en gran parte del Atlántico Medio y partes del Medio Oeste. Texas volvió a destacar con varios eventos de lluvia que trajeron consigo inundaciones localizadas. La señal de sequía a largo plazo aún se mantiene en partes del sur de Texas, ya que la recarga de los sistemas de agua agotados ha sido lenta, incluso con la lluvia en la región. Se registraron precipitaciones superiores a lo normal desde el este de Nebraska hasta Illinois, lo que trajo algunas lluvias muy necesarias a partes del norte de Illinois. Con el patrón de lluvia activo, las temperaturas en las llanuras del sur fueron de 2 a 4 grados inferiores a lo normal desde Texas hasta Kansas y Nebraska, mientras que gran parte del oeste fue de 4 a 6 grados superior a lo normal, con las mayores desviaciones en Arizona y el noroeste del Pacífico. Las temperaturas más cálidas de lo normal dominaron gran parte de las partes orientales del Medio Oeste y el Noreste, donde las temperaturas fueron de 6 a 8 grados superiores a lo normal.

Noreste

Las precipitaciones fueron abundantes en gran parte de la región durante la semana, con las zonas costeras desde Virginia hasta Massachusetts registrando al menos el 200% de la lluvia normal para la semana. Las áreas de Maine y a lo largo de los Grandes Lagos estuvieron secas, con la mayoría de las áreas con el 50% o menos de la precipitación normal. Las temperaturas más cálidas en la región se registraron en Nueva York, Nuevo Hampshire y Vermont, donde las desviaciones fueron de 6 a 8 grados por encima de lo normal y la mayor parte de la región en o por encima de lo normal para la semana. Las lluvias que se recibieron en partes del sur de Nueva York y el este de Massachusetts permitieron que las condiciones anormalmente secas mejoraran esta semana. En Nueva Jersey, Maryland y el sureste de Pensilvania, el reciente patrón más húmedo permitió la reducción y eliminación de las condiciones anormalmente secas esta semana. Un impacto persistente ha sido los bajos niveles de agua subterránea. A medida que estos indicadores comienzan a recuperarse lentamente, permiten las mejoras realizadas.

Sureste

Las temperaturas de la semana se mantuvieron normales o superiores a lo normal en la mayor parte de la región, con temperaturas más bajas de lo normal solo en las zonas costeras del este de Florida y en las Carolinas. Las lluvias más intensas se registraron en el sur de Florida, el este de Georgia, el oeste de Carolina del Sur y gran parte de Virginia y Carolina del Norte. Fuera de Florida, la región permanece libre de sequía, con solo algunos focos de condiciones anormalmente secas. Las condiciones anormalmente secas se extendieron a las zonas que permanecieron secas esta semana en partes del sur de Alabama y en el Panhandle de Florida. Se introdujeron condiciones anormalmente secas en el este y norte de Georgia, así como en el sur de Virginia, y se extendieron al este de Tennessee. Las condiciones anormalmente secas

se desplazaron al oeste en el centro de Florida, mientras que a lo largo de la costa este, se observó una mejora completa en la intensidad de la sequía D0-D2, dejando solo una pequeña zona de sequía moderada. La sequía severa se extendió al sur de Florida, y la zona de sequía extrema mejoró en el condado de Palm Beach, pero se introdujo una nueva zona de sequía extrema en los Everglades del condado de Miami-Dade.

Sur

Las zonas más húmedas de la región se ubicaron en el centro y este de Texas, así como en partes del este de Oklahoma y el oeste de Arkansas. Las condiciones secas se presentaron principalmente en el oeste y sur de Texas, así como a lo largo de la frontera con Oklahoma en el norte de Texas. Debido a la lluvia, las temperaturas fueron más bajas de lo normal en gran parte de Texas, con algunas zonas del centro de Texas entre 3 y 5 grados por debajo de lo normal durante la semana. Solo el este de Arkansas y el sur de Texas alcanzaron o superaron los niveles normales durante la semana. Las condiciones anormalmente secas mejoraron en el suroeste de Arkansas, mientras que en gran parte del centro de Texas se redujo la intensidad de la sequía debido a las lluvias continuas. Algunas zonas de Texas registraron suficiente lluvia como para experimentar una mejora de varias categorías.

Medio Oeste

Las zonas más húmedas de la región se extendieron desde Iowa hasta Illinois y Misuri, donde esta semana cayó más del 200% de la lluvia normal. Las zonas más secas se ubicaron en el norte de Indiana, Ohio y partes del oeste de Misuri, donde se registró menos del 10% de la lluvia normal. Las temperaturas se mantuvieron dentro de los límites normales o por encima de ellos en casi toda la región, siendo la zona este la más cálida, con variaciones de 2 a 4 grados por encima de lo normal, mientras que partes del oeste de Iowa y el sur de Misuri estuvieron entre 2 y 4 grados por debajo de lo normal. Las zonas que recibieron las mayores lluvias también experimentaron mejoras esta semana. En el norte de Illinois, las condiciones de sequía, de anormalmente secas a severas, mejoraron, mientras que la sequía anormalmente seca y moderada en gran parte del este de Iowa y partes del noroeste de Iowa también mejoró. En Minnesota, las condiciones anormalmente secas mejoraron en el suroeste y norte del estado, con algunas mejoras en la sequía moderada y severa en el extremo norte. Las condiciones anormalmente secas se extendieron al norte de Indiana y al suroeste de Michigan, mientras que la sequía moderada y severa mejoró en las zonas orientales del sur de Michigan. La sequía anormal y la sequía moderada mejoraron en el noreste de Misuri y el sur de Wisconsin esta semana.

Altas Llanuras

Las temperaturas fueron mixtas en la región, con las áreas norte y oeste de 2 a 4 grados por encima de lo normal, mientras que las áreas sur y este estuvieron de 2 a 4 grados por debajo de lo normal durante la semana. Las áreas más húmedas esta semana fueron el suroeste de Kansas, el noreste de Nebraska y partes del noreste de Colorado, donde se registró más del

200% de la lluvia normal. La sequedad continuó en el este de Wyoming y en áreas de las Dakotas, así como en el noreste de Kansas. El patrón más húmedo en Nebraska durante las últimas semanas ha permitido una mejora continua de la sequía en el estado. Se logró una mejora completa de la categoría en la mayor parte del centro y noreste de Nebraska y en partes del sur de Dakota del Sur. La sequía moderada y las condiciones anormalmente secas mejoraron en el noreste de Colorado, mientras que las condiciones anormalmente secas se expandieron en el noreste de Kansas.

Oeste

Las temperaturas de la semana fueron más cálidas de lo normal en la región, con variaciones de 4 a 6 grados por encima de lo normal. Las únicas áreas que estuvieron en o por debajo de lo normal fueron las áreas costeras de California y el este de Nuevo México. Gran parte del área permaneció seca y solo hubo algo de humedad monzónica dispersa en el suroeste. Algunas áreas de Montana recibieron algo de lluvia necesaria, pero las condiciones han sido secas en general en esa región. La degradación dominó la región para los cambios esta semana, sin áreas que vieran mejoras en el mapa. La sequía severa y extrema se expandió sobre el oeste de Colorado, mientras que la sequía moderada y las condiciones anormalmente secas se expandieron sobre gran parte del centro de Wyoming. En el norte de Utah, la sequía severa se expandió mientras se introdujo una nueva área de sequía extrema. Gran parte del Panhandle de Idaho y en partes centrales del estado tuvieron una degradación de categoría completa, mientras que la sequía severa y extrema se expandió sobre partes occidentales de Montana. La sequía moderada y severa se expandió sobre gran parte de Washington y Oregón, y la sequía severa se expandió sobre el noreste de Nevada.

Caribe

No hubo cambios en Puerto Rico esta semana.

Persiste una sequía anormal a corto plazo en todas las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. La isla St. Croix recibió entre 0,15 y 0,53 de lluvia esta semana. Los niveles de agua del pozo están actualmente a 16,3 pies para el pozo Adventure 28. Las estaciones CoCoRaHS ubicadas en la isla St. John recibieron entre 0,38 y 0,71 de lluvia esta semana. Adams, la estación Windswept Beach recibió solo 0,12 de lluvia. La profundidad del agua en el pozo Susannaberg DPW 3 está actualmente a 11,86 pies. Las estaciones CoCoRaHS de la isla St. Thomas recibieron entre 0,46 y 0,49 de lluvia esta semana. A diferencia del pozo Adventure 28 y el Susannaberg DPW 3, que experimentaron una disminución en la profundidad del agua, el pozo Grade School 3 continuó recibiendo aumentos en los niveles de agua y actualmente está a 8,94 pies. A pesar de esto, la isla St. Thomas permanecerá en sequedad anormal.

Pacífico

En Alaska, las condiciones anormalmente secas se extendieron a las partes norte, oeste y centro del estado, mientras que la sequía moderada mejoró ligeramente en el este.

En Hawaii, la sequa moderada y severa mejor en la parte noroeste de la Isla Grande.

La lluvia beneficosa ha continuado cayendo en la Repblica de las Islas Marshall (RMI). Wotje recibí precipitaciones significativas, con 3,31 pulgadas de lluvia la semana pasada y 1,78 pulgadas de lluvia esta semana. Utirik recibí 2,03 pulgadas de lluvia la semana pasada, lo que marca la primera semana en mucho tiempo en que la isla vio precipitaciones adecuadas. Sin embargo, tanto Wotje como Utirik permanecen en sequa extrema a corto plazo. Mili recibí la mayor cantidad de lluvia esta semana con 3,63 pulgadas. Kwajalein y Jaluit recibieron 1,58 pulgadas y 1,9 pulgadas de lluvia, respectivamente, pero permanecen en sequa severa a corto plazo. Majuro recibí 1,85 pulgadas de lluvia esta semana. Ailingalapap no tiene datos de precipitación esta semana, pero permanecer en sequa severa a corto plazo debido a la falta de precipitaciones adecuadas en las últimas semanas.

Fuertes lluvias han afectado a varias islas en los Estados Federados de Micronesia (FSM). Kosrae, Pohnpei y Woleai recibieron 8.1, 8.64 y 6.8 de lluvia esta semana, respectivamente. Nukuoro recibí 3.85 de lluvia esta semana, mientras que Kapingamarangi recibí 3.44. Yap recibí 2.87 de lluvia esta semana, y la laguna Chuuk recibí 2.02. Pingelap continúa recibiendo lluvia beneficosa con un total semanal de 2.29. Aunque la isla permanecer en sequa moderada a largo plazo, se puede considerar una mejora de 1 categoría. Fuertes lluvias también afectaron a la República de Palaos. La estación de Koror recibí 5.33 de lluvia esta semana. En la WSO en Palaos, cayeron 8.27 de lluvia. Las inundaciones siempre son una preocupación en los lugares donde cayeron fuertes lluvias esta semana. A diferencia de los FSM y Palaos, Samoa Americana tuvo una semana más seca. El Aeropuerto Internacional de Pago Pago recibí solo 0,37 pulgadas de lluvia. Las cordilleras de Siufaga y Toa recibieron solo 0,58 y 0,48 pulgadas de lluvia, respectivamente. Samoa Americana se mantiene libre de sequa gracias a las abundantes lluvias de la última semana.

Un patrón monzónico ha comenzado a afectar las Islas Marianas. Guam recibí 9,5 cm de lluvia esta semana, mientras que Rota recibí 10,5 cm. Debido a esto, se les otorga una mejora de categoría 1 a Guam y Rota. Por lo tanto, tanto Guam como Rota están ahora libres de sequa y sequedad. Saipan y Tinian también recibieron una mejora de categoría 1 a la sequedad anormal a largo plazo. Tinian recibí 7,5 cm de lluvia esta semana. Mientras que el Aeropuerto Internacional de Saipan recibí 10,8 cm de lluvia esta semana, el Servicio Meteorológico Nacional (NPS) de Saipan recibí 4,3 cm de lluvia.

Mirando hacia el futuro

Durante los próximos cinco a siete días, se prevé que las llanuras del sur y el oeste estarán secas, con solo un aumento repentino de la humedad monzónica en la región de las Cuatro Esquinas. Se proyecta la mayor cantidad de precipitación en el Medio Oeste y en el Atlántico Medio, así como en las llanuras del centro y norte. Es probable que una perturbación tropical que se está formando sobre el Golfo toque tierra en Luisiana y sus alrededores, trayendo una humedad significativa a las zonas costeras e interiores. Se prevén temperaturas inferiores a lo normal en las zonas costeras del oeste y en el norte de las Montañas Rocosas, con variaciones de 3 a 5 grados. Las temperaturas serán más cálidas en las llanuras centrales y en el Medio Oeste, con variaciones previstas de 6 a 8 grados por encima de lo normal.

Las previsiones meteorológicas para los próximos 6 a 10 días indican que la mayor probabilidad de temperaturas superiores a lo normal se concentra en el Medio Oeste y la Meseta de Ozark. Fuera de las zonas costeras del oeste, se proyecta que la mayor parte del resto del país tendrá las mayores probabilidades de temperaturas superiores a lo normal. Las mayores probabilidades de precipitaciones inferiores a lo normal se concentran en la Gran Cuenca, así como en las llanuras del sur. Se prevé que las mayores probabilidades de precipitaciones superiores a lo normal se concentrarán en la Costa del Golfo, hasta Florida, y en la franja norte del país, desde Washington hasta los Grandes Lagos.

Autor(s)

Brian Fuchs, National Drought Mitigation Center

Daniel Whitesel, National Drought Mitigation Center