

Resumen nacional de sequía para 2 septiembre, 2025

Resumen

Esta semana, el Monitor de Sequa de EE. UU. (USDM) observó una degradación generalizada de las condiciones relacionadas con la sequa en áreas del Medio Oeste, el Atlántico Medio y el Noreste, donde las precipitaciones durante los últimos 30 días han sido inferiores a lo normal. En estas áreas, los déficits de lluvia variaron de 3 a 5 pulgadas, observándose los mayores déficits en áreas de Nueva Inglaterra y el Bajo Medio Oeste. En otras partes, los informes de sequa a corto plazo y el impacto de la sequa del sector agrícola provocaron degradaciones en áreas aisladas del Sureste y el Sur. Durante la semana, la mayor parte de la mitad oriental de los Estados Unidos continentales experimentó temperaturas inusualmente bajas, mientras que en el Oeste las temperaturas fueron superiores a lo normal, especialmente en el Noroeste del Pacífico y el Desierto del Suroeste. En el Oeste, las condiciones fueron generalmente secas; sin embargo, se observaron algunas tormentas eléctricas monzónicas aisladas en el Suroeste, la Sierra Nevada de California, la Gran Cuenca y las Montañas Rocosas. En el Noroeste del Pacífico, la sequedad persistente, así como la disminución del caudal fluvial y de los niveles de humedad del suelo, provocaron la expansión de áreas de sequa excepcional en el Panhandle de Idaho. En cuanto al almacenamiento de agua en los embalses del oeste, los de California se mantienen en niveles similares o superiores a los promedios históricos para la fecha (2 de septiembre), con los dos embalses más grandes del estado, el lago Shasta y el lago Oroville, al 104 % y el 112 % del promedio, respectivamente. En el suroeste, la Oficina de Recuperación de EE. UU. informa (1 de septiembre) que el lago Powell está al 29 % de su capacidad (44 % del promedio para la fecha), el lago Mead al 31 % (52 %) y que el sistema total de Colorado (1 de septiembre) está al 38 % de su capacidad (en comparación con el 44 % de la misma fecha del año pasado).

Noreste

En el mapa de esta semana, se realizaron degradaciones generalizadas en el mapa, incluida la expansión de áreas de sequa en Virginia Occidental, Pensilvania, Nueva Jersey, Nueva York, Vermont, Nuevo Hampshire y Maine. La sequa más severa en la región se centra actualmente en áreas del centro de Maine y partes del norte de Vermont y Nuevo Hampshire. En estas áreas, numerosas estaciones de observación informaron totales de precipitación para el período de los últimos tres meses que estuvieron entre los 5 más secos registrados, incluidos Barre, Vermont (desviación de -6.76 pulgadas de lo normal; el más seco registrado), Berlin, Nuevo Hampshire (-3.95 pulgadas; el más seco registrado) y Portland, Maine (-5.87 pulgadas; el tercero más seco registrado), según datos del Centro Climático Regional del Sureste (SERCC). Además, numerosos arroyos y ríos en toda la región informaron caudales muy por debajo de los niveles normales, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Durante la semana, gran parte de la región estuvo bastante seca; sin embargo, se observaron algunas acumulaciones de lluvia ligera (menos de 5 cm) en zonas aisladas de Nueva York, Connecticut, Massachusetts, Nuevo Hampshire y Vermont. Las temperaturas promedio fueron inferiores a lo normal en la mayor parte de la región, especialmente en la zona sur, donde las temperaturas fueron entre 2,6 y 10 °C inferiores a lo normal.

Sureste

Durante la semana pasada, se observaron acumulaciones de lluvia ligeras a moderadas en reas aisladas en la extensin sur de la regin en Florida, sur de Georgia, sureste de Carolina del Sur y oeste de Alabama, con las acumulaciones ms fuertes (de 3 a 4 pulgadas). En el mapa, la sequedad durante el ltimo periodo de 30 das condujo a la introduccin de reas anormalmente secas (D0) en las Carolinas y Georgia, as como a la introduccin de una pequea rea de sequa severa (D2) en el suroeste de Alabama, donde las desviaciones de lluvia de 30 das variaron de 3 a 5 pulgadas. En el sur de Florida, la mejora de las condiciones durante el ltimo periodo de 30 das condujo a algunas mejoras menores en el mapa. En trminos de temperaturas promedio de la semana, la mayor parte de la regin experiment temperaturas muy por debajo de lo normal, con las mayores anomalas (4 a 8+ grados F) observadas en las Carolinas, el centro de Georgia y el norte de Alabama.

Sur

En el mapa de esta semana, se observaron mejoras en el este de Texas, el norte de Luisiana, el norte de Arkansas y el centro de Oklahoma como respuesta a las fuertes lluvias locales (de 5 a 15 cm o ms) observadas la semana pasada. En otras partes, la sequa a corto plazo provoc la introduccin de reas de sequa anormal (D0) en reas de Texas, incluyendo el Panhandle y la meseta de Edwards. En Tennessee, se observaron degradaciones en el mapa en las partes central y occidental como respuesta a la escasez de precipitaciones (de 2,5 a 10 cm) durante los ltimos 30 das. En cuanto a las condiciones hidrolgicas en Texas, los embalses del estado (en conjunto) estaban al 77 % de su capacidad, con muchos en la parte oriental del estado en buenas condiciones (ms del 90 % de su capacidad), mientras que muchos otros en la parte occidental del estado continan experimentando niveles por debajo de lo normal, segn los Datos de Agua de Texas (3 de septiembre). Durante la semana, las temperaturas promedio estuvieron por debajo de lo normal (de 2 a 8 grados F) en la mayor parte de la regin, con excepcin de las partes sur y oeste de Texas, donde las temperaturas estuvieron entre 1 y 5 grados por encima de lo normal.

Medio Oeste

Se produjeron degradaciones generalizadas en toda la regin en respuesta a la escasez de precipitaciones (que oscilaron entre 2 y 4+ pulgadas) durante los ltimos 30 das. Se observ una sequedad record a casi record (durante los ltimos 30 das) en numerosas estaciones de observacin en toda la regin, incluido el Aeropuerto de Cincinnati (AP), Ohio (-2,71 pulgadas de desviacin de lo normal; el ms seco registrado), Columbus AP, Ohio (-3,1 pulgadas; el ms seco registrado), Springfield, Illinois (-3,21 pulgadas; el segundo ms seco registrado) y Springfield AP, Missouri (-3,45 pulgadas; el ms seco registrado), segn el SERCC. Adems, se reportaron numerosos informes de impacto de la sequa (sector agrcola) durante los ltimos siete das al sistema de Informe de Observador de Monitoreo de Condicin (CMOR) del Centro Nacional de Mitigacin de Sequas, principalmente del sur de Missouri, el centro-norte de Kentucky y el sur

de Ohio. Durante la semana, las temperaturas promedio estuvieron muy por debajo de lo normal (de 2 a 15 grados F) en la mayor parte de la región, mientras que el norte de Minnesota registró anomalías positivas que oscilaron entre 2 y 6+ grados F por encima de lo normal.

Altas Llanuras

En el mapa de esta semana, se observaron mejoras en la región, concretamente en el norte de Kansas y el sur de Nebraska, donde algunas lluvias aisladas (de 1 a 5+ pulgadas) durante la semana pasada continuaron ayudando a reducir los déficits de precipitación a largo plazo.

Durante los últimos 60 días, el Lincoln AP observó su sexto día más húmedo registrado con 10.24 pulgadas (+3.69 desviación de lo normal), según el SERCC. Por el contrario, las condiciones se deterioraron en el mapa en la extensión suroeste de Dakota del Sur, donde una combinación de déficits de precipitación a corto y largo plazo han persistido, lo que ha provocado la expansión de áreas de sequía moderada (D1). Durante la semana, se registraron temperaturas superiores a lo normal (que oscilaron entre 2 y 10 grados F) en el norte de Dakota del Norte, mientras que gran parte del resto de la región experimentó temperaturas inferiores a lo normal (que oscilaron entre 1 y 10 grados F), especialmente en la extensión sur de toda la región.

Oeste

En el oeste, se observó actividad aislada de lluvias monzónicas en áreas del suroeste desértico, Sierra Nevada y la Gran Cuenca, así como en áreas del centro y norte de las Montañas Rocosas. Se observaron mejoras en el mapa en Colorado, el oeste de Montana, el sur de Idaho, el norte de Utah y el sureste de California, mientras que se observaron algunas degradaciones en el centro-norte de Arizona, donde las precipitaciones de la temporada de monzones han sido inferiores a lo normal. Según el Servicio Meteorológico Nacional en Tucson, las precipitaciones monzónicas de 2025 han sido inferiores a lo normal en gran parte del estado, incluyendo Flagstaff, Phoenix y Tucson. Por el contrario, una temporada de monzones más activa ha afectado áreas de Nuevo México, incluyendo las partes sur y este del estado. Durante la semana, las temperaturas promedio fueron inferiores a lo normal en áreas del este de California, el centro de la Gran Cuenca y áreas del oeste intermontano, incluyendo Utah, Colorado y el sur de Wyoming, donde las temperaturas fueron de 5 a 10 grados inferiores a lo normal. En el noroeste del Pacífico, las temperaturas estuvieron por encima de lo normal, con anomalías que oscilaron entre 2 y 15 grados F y las mayores desviaciones se observaron en el este de Washington, el Panhandle de Idaho y el noroeste de Montana.

Caribe

En Puerto Rico, el mapa se mantuvo sin cambios durante la semana.

Durante la semana de sequía del 27 de agosto al 2 de septiembre de 2025, se observaron condiciones relativamente secas en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos (USVI), lo que la convirtió en la segunda semana seca consecutiva desde el paso de las bandas exteriores de lluvia del huracán Erin y las fuertes lluvias locales. Esta semana se caracterizó por una combinación de sol y períodos de nubosidad, con lluvias generalmente dispersas y algunas

tormentas eléctricas. Hubo periodos de alto riesgo de calor, especialmente al final de la semana de sequa, con un flujo del sureste que trajo un aumento en la humedad en los niveles bajos. A pesar de la aproximación de una vaguada de nivel medio desde el noroeste y la humedad de una onda tropical que pasó al sur de las islas, las estimaciones de lluvia basadas en satélite (SPoRT IMERG) durante los últimos 7 días muestran que la mayor parte de la precipitación se mantuvo al suroeste de la región.

En la isla de Santa Cruz, las cantidades de precipitación semanal variaron de 0,05 pulgadas en VI-SC-29 (Frederiksted 2,5 NNE) a 1,04 pulgadas en VI-SC-35 (Frederiksted 1,3 ENE). Los valores de precipitación intermedios incluyeron 0,17 pulgadas en VI-SC-24 (Christiansted 2,1 ENE, 3 días faltantes), 0,27 pulgadas en VI-SC-23 (Christiansted 6,5 O), 0,30 pulgadas en VI-SC-25 (Christiansted 4,4 O), 0,35 pulgadas en VI-SC-34 (Frederiksted 1,9 NE), 0,39 pulgadas en VI-SC-10 (Christiansted 1,6 E), media pulgada en VI-SC-20 (Frederiksted 1,7 ESE) y 0,54 pulgadas de lluvia en VI-SC-30 (Christiansted 1,7 SO). Los niveles máximos y mínimos de agua del pozo Adventure 28 bajo la superficie terrestre oscilaron entre 18.06 pies (2:45 a.m., 28 de agosto) y 18.50 pies (4:45 p.m., 2 de septiembre). Aunque hubo subidas y bajadas relativamente pequeñas en el nivel del agua durante la semana de sequa, se observó una disminución general. Los valores del índice de Precipitación Estandarizado (IPS) en los periodos de 1, 3, 6, 9 y 12 meses para East Hill (#672560) fueron, respectivamente: -1.13, -1.64, -0.31, -0.23 y +0.71. Los valores han empeorado (disminuido) para cada uno de los periodos de tiempo en comparación con la semana pasada, excepto para el IPS de 12 meses que se mantuvo igual. Dadas las cantidades de lluvia observadas semanalmente, los niveles de agua subterránea y los valores del IPS, la designación de sequa de Santa Cruz sigue siendo D1(S). Se seguirá de cerca la posibilidad de que se produzca una degradación futura durante las próximas semanas.

En St. John, las cantidades de precipitación acumulada semanal variaron de 0.03 pulgadas en VI-SJ-10 (Cruz Bay 3.1 NNO) a 0.90 pulgadas en VI-SJ-8 (Cruz Bay 7.4 E). Se midió un total intermedio de 0.19 pulgadas de lluvia en Windswept Beach (VI-SJ-3). Sin embargo, el observador notó que cayeron 0.45 pulgadas de lluvia poco después del corte de datos de esta semana y, por lo tanto, se incluirán en el total de precipitación de la próxima semana. Los totales de lluvia para los últimos tres meses son 7.26 pulgadas en agosto, 2.07 pulgadas en julio y 1.36 pulgadas en junio. Los niveles máximos y mínimos de agua debajo de la superficie terrestre del pozo Susannaberg Dpw 3 variaron de 12.43 pies (3:00 p.m., 27 de agosto) a 12.67 pies (11:00 a.m., 2 de septiembre). Esta semana se observó un lento descenso del nivel del agua de pozo. Los valores del SPI en los periodos de 1, 3, 6, 9 y 12 meses para Windswept Beach fueron, respectivamente: +0,74, +0,19, +0,49, +0,51 y +0,68. Los valores positivos en todos los intervalos de tiempo no indican sequa, a pesar de la precipitación relativamente escasa recibida la semana pasada.

En la isla de Santo Tomás, las mediciones semanales de precipitación incluyeron 0,41 cm en VI-ST-13 (Charlotte Amalie 1,2 NNO) y 0,43 cm en VI-ST-15 (Charlotte Amalie Oeste 1,3 N). Los niveles máximos y mínimos de agua del pozo de la Escuela Primaria 3 bajo la superficie terrestre oscilaron entre 2,05 m (15:00 h, 27 de agosto) y 2,25 m (9:00 h, 2 de septiembre). Se observó un descenso gradual del nivel del agua durante la semana, salvo un ligero aumento hacia el final del periodo. Los valores del SPI en los periodos de 1, 3, 6, 9 y 12 meses para el

Aeropuerto Cyril E. King (#11640) fueron, respectivamente: +0,04, -0,86, +0,41, +0,53 y +1,05, lo que indica cifras similares a las de la semana pasada. Si bien las precipitaciones semanales fueron escasas y los niveles freáticos disminuyeron, en St. Thomas se mantienen las condiciones sin sequa.

Pacífico

En Alaska, la mejora de las condiciones condujo a la eliminación de áreas anormalmente secas (D0) a lo largo de la ladera norte, el interior y el centro sur de Alaska, mientras que D0 se introdujo en la costa central del Golfo y el sudeste de Alaska debido a una combinación de precipitaciones por debajo de lo normal durante los últimos 30 a 60 días y temperaturas por encima de lo normal durante las últimas semanas.

En las islas hawaianas, prevalecieron condiciones secas en la mayor parte del archipiélago, con la excepción de algunas acumulaciones ligeras en la zona de sotavento de la Isla Grande. En general, los últimos 30 días han sido secos en la mayor parte del estado, salvo algunas precipitaciones moderadas que contribuyeron a mejorar los totales mensuales a niveles promedio o superiores. En el mapa de esta semana, se añadieron zonas con condiciones anormalmente secas (D0) en la zona de sotavento de la Isla Grande y en las costas norte de Oahu y Kauai.

El dominio de las Islas del Pacífico Afiliadas a los Estados Unidos (USAPI) estuvo dominado principalmente por características como vaguadas de vientos alisios, circulaciones débiles, la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), la Vaguada Monzónica (MV) y regiones de flujo convergente de bajo nivel. Al sur del ecuador, la semana de sequa se caracterizó por un clima generalmente bueno, dorsales subtropicales y precipitaciones ligeras la mayoría de los días. Hacia el final de la semana, la nubosidad y los chubascos aumentaron en toda la región, a medida que un eje de dorsal con orientación este-oeste se acercaba a la región desde el sur, y una vaguada se acercaba desde el noreste. Se registraron vientos del sureste, de moderados a frescos, cada vez más fuertes, a medida que el eje de dorsal se acercaba desde el sur. No se registraron ciclones tropicales importantes durante la última semana de sequa en el dominio USAPI. Quizás el clima más activo se registró en la zona occidental de los Estados Federados de Micronesia (EFM) y la cercana República de Palaos. Un patrón monzónico dominó esta región durante la mayor parte de la semana pasada. A medida que el patrón monzónico evolucionó y se desplazó hacia el norte (acompañado de un aumento repentino del flujo monzónico), se afianzaron vientos del oeste-suroeste sobre Palau y Yap, acompañados de un flujo muy húmedo y períodos de lluvias racheadas y lluvias intensas a nivel local. Estos vientos del oeste-suroeste, que soplan en contra de los vientos alisios del este habituales en estas bajas latitudes, concuerdan con la ubicación de la denominada "Valle Monzónico" (MV). Hacia el final de la semana de sequa, se formó una dorsal subtropical sobre Palau y Yap, lo que permitió que los vientos y las lluvias disminuyeran brevemente.

Sobre el Pacífico Norte tropical occidental, desde aproximadamente el ecuador hasta 10N y 13E hasta 17E (que abarca la mayor parte de la región USAPI), las estimaciones de precipitación cuantitativa (QPE) a partir de imágenes satelitales SPoRT IMERG variaron entre aproximadamente 0,5 y 4,0 pulgadas. Desde aproximadamente 10-15N a lo largo de la misma

banda de longitud (que incluye la mayor parte de la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte (CNMI), solo se notaron cantidades de 0,5 a 1,0 pulgadas en general. La precipitación estimada por satélite para la región CNMI parece ser inferior a la de las mediciones del pluviómetro descritas a continuación. Esto puede deberse a una combinación de factores como las condiciones convectivas altamente localizadas y rápidamente cambiantes sobre esta área, las limitaciones de los sensores satelitales para "ver" a través de las cimas de nubes convectivas extremadamente profundas e imprecisiones de los sensores satelitales infrarrojos al estimar las tasas de precipitación basadas en la temperatura de la cima de las nubes que varía ampliamente sobre los trópicos oceánicos. La mejora orográfica local también puede ser un contribuyente parcial. Sobre Samoa Americana al sur del ecuador, se estimó una precipitación de 0,5 pulgadas o menos.

En toda Samoa Americana, se registraron 1,9 mm de lluvia en el aeropuerto Pago Pago WSO, muy por debajo del mínimo de 5 cm requerido para cubrir la mayoría de las necesidades hídricas de una semana. La acumulación preliminar de lluvia para el mes de agosto es de 8,75 mm (aproximadamente la mitad de sus 17,5 mm normales), aunque 7 de los últimos 11 meses se han registrado como "hmedos" (es decir, 20 cm o más). En las zonas de mayor altitud de Siufaga Ridge y Toa Ridge, los totales de lluvia semanales y mensuales preliminares de agosto son, respectivamente: 0,49 y 1,43, respectivamente, muy por debajo de los requerimientos mínimos de agua para una semana y un mes. A pesar de la reciente sequa, Tutuila mantiene su designación de zona libre de sequa.

Para la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte (CNMI), el Aeropuerto de Rota registró 2,95 pulgadas de precipitación durante la última semana y 14,79 pulgadas para el total de agosto (preliminar), ambos registrados como "hmedos" (es decir, cumplieron o superaron los umbrales de precipitación semanal y mensual de 1 pulgada y 4 pulgadas, respectivamente). Esto marca la octava semana lluviosa consecutiva para Rota, así como el tercer mes lluvioso consecutivo. Rota continúa libre de sequa. El Aeropuerto Internacional de Saipán reportó 3,59 pulgadas de lluvia la pasada semana de sequa y 8,61 pulgadas para agosto (preliminar), superando ampliamente las necesidades de agua semanales y mensuales. Esto marca el tercer mes lluvioso consecutivo para el sitio. En consecuencia, Saipán mantiene su estado libre de sequa esta semana. En Agat, se registraron 2,38 y 11,58 pulgadas de precipitación durante la última semana y agosto (preliminar), respectivamente. Once de las últimas 12 semanas han sido "hmedas", al igual que los últimos 3 meses. Deddo registró 5,2 cm de precipitación esta semana, lo que marca la octava semana consecutiva de lluvia. Su total preliminar de lluvia para agosto es de 23,5 cm. Tinian registró 3,7 cm de lluvia la pasada semana de sequa, con 12,2 cm reportados para el mes de agosto (preliminares). Tinian también tuvo lluvia en julio y permanece libre de sequa. El territorio insular de Guam registró 10 cm de lluvia esta semana, casi la cantidad necesaria para el mes de lluvia (10 cm). Esta es la décima semana consecutiva de lluvia. Guam recibió 33,8 cm de lluvia (provisionales) en agosto, y los últimos tres meses fueron hmedos. El territorio insular permanece libre de sequa esta semana.

La mayoría de las estaciones en los Estados Federados de Micronesia (FSM) registraron precipitaciones suficientes esta semana para cubrir la mayoría de las necesidades hídricas. Las precipitaciones de la semana pasada y del mes de agosto (provisional) en las estaciones de los FSM incluyen, respectivamente: Pohnpei (6,59 pulgadas, 22,54 pulgadas), North Fanif

(5,19, 14,15), Lukunoch (5,01, 12,20), Kosrae (4,56, 26,17), Chuuk (4,34, 13,74), Rumung (4,05, 15,69), Aeropuerto de la Isla Yap (3,56, 10,23), Woleai (3,41, 10,65), Pingelap (2,52, 11,68), Kapingamarangi (1,79, 10,11) y Nukuoro (1,48, 7,55). La mayoría de estas estaciones de informes esta semana fueron "hmedas", excepto Kapingamarangi y Nukuoro que fueron "secas". Algunas otras estadísticas incluyen: 11 de las últimas 12 semanas fueron hmedas, al igual que los últimos 11 meses en Pohnpei; 4 meses hmedos consecutivos en North Fanif; 9 meses hmedos consecutivos en Lukunoch; 12 semanas hmedas consecutivas y 11 meses hmedos consecutivos en Kosrae, 8 de los últimos 11 meses fueron hmedos en Chuuk; 9 de los últimos 11 meses fueron hmedos en el atolón Woleai; julio y agosto de 2025 fueron meses hmedos en Kapingamarangi; y 9 de los últimos 11 meses fueron hmedos en Nukuoro. Las condiciones de sequa y sin sequa continúan esta semana en todos estos lugares, incluido Nukuoro a pesar de la sequa marginal de la semana y el mes pasados. No fue posible realizar ningún análisis esta semana en Ulithi y Fananu debido a la falta de datos de lluvia.

La República de Palaos experimentó otra semana y mes muy lluviosos. Koror registró 14,5 cm de lluvia la semana pasada, lo que significa que 11 de las últimas 12 semanas fueron lluviosas. El total preliminar de agosto es de 50,5 cm, lo que significa que los últimos 11 meses han sido lluviosos. En Airai (WSO Palaos), la acumulación semanal de lluvia fue de 16,5 cm, y el total preliminar de agosto es de 48,5 cm. Las condiciones de sequa persisten en Palaos.

En la República de las Islas Marshall (RMI), se instalaron Estaciones Meteorológicas Automáticas (EMA) en los atolones para recopilar datos de precipitación. El mayor total de precipitación de esta semana se registró en Ailinglaplap, donde se registraron 6,10 pulgadas de lluvia, lo que marca la quinta semana consecutiva de lluvia. La designación de sequa de Ailinglaplap se mantiene como libre de sequa. La siguiente cantidad de precipitación semanal más alta fue de 4,83 pulgadas en Kwajalein, con un total provisional de agosto de 8,29 pulgadas. La semana y el mes más recientes se registraron como periodos "hmedos" en Kwajalein. El último mes hmedo registrado en este sitio fue en noviembre del año pasado (2024), cuando cayeron 8,83 pulgadas de lluvia. A pesar de estas estadísticas, la designación de Kwajalein se mantiene en D0-S (sequedad a corto plazo). Mili registró 3,90 pulgadas de lluvia esta semana, con un total preliminar de lluvia de agosto de 12,09 pulgadas. Mili se mantiene libre de sequa esta semana. Majuro registró 42 mm de lluvia esta semana, lo que se considera "seco", aunque 9 de las últimas 12 semanas fueron hmedas. El total provisional de agosto es de 27,5 mm, y los últimos 3 meses han sido hmedos. A pesar de esta última semana seca, Majuro mantiene su clasificación de libre de sequa. Finalmente, en Utrik cayeron 1,6 mm de precipitación esta semana, con un total preliminar de 10,8 mm para agosto. La clasificación de sequa de Utrik se mantiene como sequa moderada a corto plazo (D1-S). Debido a la falta de datos de lluvia disponibles en Jaluit y Wotje, no se realizó ningún análisis en esas estaciones.

Mirando hacia el futuro

El Pronóstico Cuantitativo de Precipitación (QPF) de 7 días del Centro de Predicción Meteorológica (WPC) del NWS prevé acumulaciones de precipitación de moderadas a fuertes en áreas del suroeste desértico (sureste de Arizona) asociadas con la humedad remanente del huracán Lorena. Además, se esperan fuertes lluvias en el sur de Florida, mientras que se esperan

acumulaciones de leves a moderadas en reas del noroeste del Pacifico, las Montaas Rocosas, Texas, el bajo medio oeste y el noreste. Los pronsticos del Centro de Prediccin Climtica (CPC) de 6 a 10 das indican una probabilidad de moderada a alta de temperaturas superiores a lo normal en la mayor parte de las llanuras del oeste, centro y norte, y la regin de la costa del Golfo. Por el contrario, se pronostican temperaturas inferiores a lo normal para el medio oeste, el Atlntico medio, el noreste y reas del este de California y el oeste de la Gran Cuenca. En trminos de precipitaciones, hay una probabilidad baja a moderada de precipitaciones superiores a lo normal en la mayor parte de los estados limtrofes de Estados Unidos, con excepcin de las reas del suroeste, el alto medio oeste y Nueva Inglaterra cerca de los Grandes Lagos y la frontera con Canad, donde se esperan precipitaciones inferiores a lo normal.

Autor(s)

Anthony Artusa, NOAA/NWS/NCEP/CPC

David Simeral, Western Regional Climate Center