

Resumen nacional de sequía para 30 septiembre, 2025

Resumen

Esta semana, cayeron lluvias generalizadas desde partes del sur de Misuri y Arkansas hacia el noreste, llegando hasta el noreste de EE. UU. Se registraron lluvias de 2,5 a 5 cm (1 a 2 pulgadas) de intensidad, y localmente se registraron cantidades mayores, especialmente en el noroeste y sur de Arkansas, partes de Tennessee y Kentucky, y en el este de Nueva York y el sur de Nueva Inglaterra. Muchas de las zonas que recibieron estas lluvias sufran sequa o sequedad anormal. En algunas zonas, la lluvia proporcionó suficiente alivio para mejorar las condiciones, mientras que en otras, especialmente en el centro-sur de Misuri, el norte de Arkansas y Nueva Inglaterra, las lluvias más intensas solo bastaron para detener las recientes tendencias de empeoramiento. El clima muy seco continuó en partes del norte de Illinois, Indiana, Ohio, la mayor parte del Bajo Michigan, el norte de las Grandes Llanuras y el Alto Medio Oeste, lo que provocó cierto deterioro en áreas que habían permanecido secas recientemente. Las precipitaciones recientes en partes de las Altas Llanuras y el Oeste mejoraron la situación en el norte de la Cordillera Frontal del Colorado, la mitad sureste de Wyoming, y en partes de Nuevo México, Arizona, Nevada y Oregón. El clima seco continuó empeorar las condiciones en el norte de Montana y la región occidental adyacente de Dakota del Norte, donde la sequedad anormal y la sequa moderada y severa se extendieron. Esta semana se produjeron sequas repentinas generalizadas en partes del extremo sur-central y sureste de EE. UU. Las consecuencias fueron graves en zonas del sur de Georgia, donde la cosecha de cacahuete se vio afectada por la rápida sequa. Si bien las precipitaciones variaron considerablemente, las temperaturas superiores a lo normal se mantuvieron en la mayor parte de EE. UU., excepto en algunas zonas de Arizona y Nuevo México. En la mayor parte del resto del país, las temperaturas se situaron entre 2 y 6 grados por encima de lo normal, mientras que en el norte de las Grandes Llanuras, el Alto Medio Oeste y el Noreste se registró un calor intenso en septiembre, que generalmente oscila entre 6 y 10 grados por encima de lo normal.

Esta semana se produjeron degradaciones localizadas en algunas zonas de Hawái, donde persistieron los déficits de precipitación a corto plazo, en medio de malas condiciones de caudal y efectos sobre la vegetación. Las lluvias de una onda tropical redujeron los déficits de precipitación en el este de Puerto Rico, lo que provocó la desaparición de una de las zonas de sequa anormal. Alaska se mantuvo libre de sequa o sequa anormal esta semana.

Noreste

El noreste tuvo temperaturas más cálidas de lo normal esta semana, con temperaturas que oscilaron entre 6 y 10 grados por encima de lo normal, especialmente en la mitad occidental de la región. Una franja de lluvia moderada a intensa cayó desde el noreste de Virginia Occidental, a través del este de Nueva York, hasta partes del centro de Nueva Inglaterra. En el este de Nueva York, cayeron localmente más de 127 mm de lluvia, lo que fue suficiente para aumentar el caudal y la humedad del suelo, a la vez que redujo la escasez reciente de precipitaciones.

En Nueva Inglaterra, las lluvias más intensas, que en su mayoría oscilaron entre 1 y 4 pulgadas

(localmente) solo fueron suficientes para frenar la sequa en desarrollo, ya que los caudales de los ríos disminuyeron considerablemente después del evento y las lluvias tuvieron dificultades para infiltrarse más profundamente en los suelos. Además, aún existen importantes déficits de precipitaciones a corto plazo en muchas zonas a pesar de las lluvias. El clima muy seco reciente ha provocado que muchos pozos y manantiales se sequen en partes de Nueva Inglaterra. La sequa moderada y extrema se expandió ligeramente en Nueva Hampshire y Massachusetts, y en el este de Maine, respectivamente, donde las precipitaciones fueron más escasas esta semana. En el extremo oeste de Nueva York, se han estado desarrollando condiciones de sequa repentina en medio de grandes déficits de precipitaciones a corto plazo y la disminución de la humedad del suelo, y la sequa moderada se expandió y la sequa severa se desarrolló a lo largo de la costa sur del lago Ontario.

En Pensilvania y el oeste y norte de Virginia Occidental, las precipitaciones recientes fueron mucho más beneficiosas, impulsando el caudal y la humedad del suelo, y propiciando una mejora generalizada de la sequa y la sequedad anormal. Se observaron mejoras localizadas de dos categorías en el oeste de Virginia Occidental, donde cayeron algunas de las lluvias más intensas. Más al sur, en Virginia Occidental, la sequa severa y extrema continuó, ya que las lluvias de esta semana no fueron suficientes para mejorar las condiciones.

Sureste

Esta semana, la región sureste registró temperaturas más cálidas de lo normal, con picos de entre 6 y 8 grados por encima de lo normal en partes de Virginia y Carolina del Norte. Se registraron fuertes lluvias dispersas, con precipitaciones que oscilaron entre 2,5 y más de 7,6 cm (1 y localmente más de 3 pulgadas), en partes del sur de Virginia, el oeste de Carolina del Norte, el norte de Georgia y el norte de Alabama. Mientras tanto, el clima mayormente seco, con excepciones locales, continuó en el centro y sur de Alabama, Georgia y a lo largo de la costa del Golfo de Florida.

Las lluvias más intensas de esta semana, que en su mayoría oscilaron entre 1 y 4 pulgadas, fueron suficientes para mejorar la cantidad de humedad del suelo y el caudal de los arroyos, al tiempo que redujeron los déficits de precipitaciones a corto plazo en partes del sur de Virginia, el oeste de Carolina del Norte y Carolina del Sur y partes del norte de Georgia y Alabama.

El centro y sureste de Alabama y el sur de Georgia experimentaron una sequa rápida y continua esta semana, con un clima mayormente más seco y temperaturas superiores a lo normal. Los déficits de precipitación a corto plazo y de humedad del suelo son bastante bajos en algunas zonas, especialmente en el sur de Georgia, donde la cosecha de cacahuete de secano sufrió durante un período muy seco durante el último mes y medio. El riesgo de incendios forestales también aumentó esta semana en Alabama. Se registró una sequa moderada a corto plazo en partes del Panhandle central de Florida en condiciones similares. En la mitad occidental de la península de Florida, la sequa anormal se extendió a medida que aumentaban los déficits de lluvia y se dificultaba el caudal de los ríos.

Sur

Al igual que la mayoría de las demás regiones esta semana, el sur fue más cálido de lo normal para finales de septiembre, con anomalías de temperatura que en su mayoría registraron entre 2 y 6 grados por encima de lo normal. Las cantidades de lluvia en toda la región variaron ampliamente. El extremo norte de Luisiana y el sur y noroeste de Arkansas fueron bastante húmedos, con cantidades generalizadas de lluvia de 2 a 4 pulgadas, con cantidades localmente mayores. También cayeron cantidades de lluvia más intensas de 2 a 4 pulgadas en partes del sur y oeste de Tennessee. Cantidades más aisladas de lluvia de 1 a 2 pulgadas cayeron en el centro de Texas y el sureste de Oklahoma. Las lluvias en el centro de Texas fueron suficientes para algunas mejoras locales, aunque un área que permaneció más seca vio una expansión local de la sequía moderada. Más al sureste de Texas, el clima mayormente más seco provocó una expansión generalizada de la sequía severa en el área de Austin, junto con la expansión de la sequía moderada y la sequía anormal en las cercanías y al este. El clima reciente más seco y cálido provocó cierta expansión local de la sequía anormal y la sequía moderada a corto plazo en el centro de Oklahoma. La sequía moderada y la sequía anormal se extendieron al sur de Luisiana y al sur de Misisipi, con una sequía severa localizada a lo largo de la costa del Golfo de Misisipi como consecuencia del clima extremadamente seco reciente y la disminución de la humedad del suelo. La sequía moderada y severa también se extendió al centro-este de Misisipi debido a la falta de humedad del suelo y a las precipitaciones de corta duración.

Las lluvias más intensas en partes de Tennessee y Arkansas aumentaron la humedad del suelo y el caudal, y redujeron los déficits de precipitación en las zonas más lluviosas. Esto provocó mejoras generalizadas de categoría 1 y una mejora de categoría 2 en el suroeste de Arkansas. A pesar de las lluvias en el norte de Arkansas, los déficits de precipitación a corto plazo se mantuvieron lo suficientemente significativos como para que las mejoras en esta zona fueran mayormente limitadas esta semana.

Medio Oeste

Temperaturas muy superiores a lo normal cubrieron la región del Medio Oeste durante la última semana de septiembre, con temperaturas entre 6 y 10 grados por encima de lo normal en Ohio, Indiana, el norte de Illinois, Iowa, Wisconsin y la región sur de Michigan. Fuertes lluvias de entre 2,5 y 7,6 cm, con cantidades localmente superiores, cayeron en el extremo sur de Missouri, Illinois, Indiana y Ohio, gran parte de Kentucky y partes del centro-oeste de Missouri y el sureste de Michigan.

Las fuertes lluvias en las zonas mencionadas fueron suficientes para lograr mejoras de categoría 1, donde los déficits de precipitación a corto plazo disminuyeron y la humedad del suelo y el caudal aumentaron. Simultáneamente con la mejora de categoría 2 en el oeste de Virginia Occidental, se produjeron mejoras aisladas de categoría 2 en el sureste de Ohio y el extremo noreste de Kentucky.

El clima predominantemente seco se presentó en el noreste de Misuri, el centro y norte de Illinois, la mitad norte de la península inferior de Michigan, Iowa, Minnesota, Wisconsin y la península superior de Michigan. La disminución de la humedad del suelo y del caudal, junto con el creciente déficit de precipitaciones a corto plazo, provocó degradaciones de primera categoría en partes del norte de Minnesota, el norte de Minnesota, la península inferior central de

Michigan, el norte de Indiana, el noroeste de Ohio, el centro y norte de Illinois, y las zonas cercanas del sur de Wisconsin y la zona de San Luis. Los impactos de esta sequa a corto plazo incluyeron bajos rendimientos de los cultivos en Ohio, una produccion de forraje deficiente y generalizada en el sur de Misuri recientemente y enfermedades en el venado de cola blanca en Kentucky.

Altas Llanuras

Esta semana, las temperaturas fueron mayormente ms clidas de lo normal en las Altas Llanuras, excepto en el centro y sur de Colorado. Las Dakotas y el norte de Wyoming experimentaron temperaturas especialmente clidas al final de septiembre, con temperaturas entre 6 y 10 grados por encima de lo normal. Se registraron precipitaciones generalizadas, de moderadas a fuertes, desde el suroeste de Nebraska y el noroeste de Kansas hasta el norte de Colorado y el sureste de Wyoming, incluyendo algunas precipitaciones invernales en zonas ms elevadas. Las precipitaciones superaron localmente los 5 cm en partes del noreste de Colorado y zonas adyacentes de Nebraska y Kansas.

En el norte de Colorado y el sureste de Wyoming, las precipitaciones recientes mejoraron la humedad del suelo y el caudal, y redujeron la escasez de precipitaciones, lo que provoc mejoras generalizadas de categoria 1 en estas zonas. En el centro-sur de Dakota del Sur, el reciente aumento de las lluvias provoc la eliminacin de la sequa moderada, ya que esta semana se reevaluaron las condiciones en esa zona. La sequa moderada se extendi ligeramente en el Valle de San Luis, en el centro-sur de Colorado, donde la escasez de precipitaciones a corto plazo aument en medio de malas condiciones de vegetacin.

Oeste

Esta semana, en el oeste, las temperaturas fueron mayormente ms clidas de lo normal, con excepcin de algunas zonas de Arizona y Nuevo Mxico. Se registraron lluvias aisladas de 5 cm o ms en zonas del centro-oeste de Nuevo Mxico, lo que provoc mejoras localizadas de categoria 1 en la zona. Esta semana, se registraron lluvias intensas ms significativas, que superaron localmente los 5 cm, en zonas del centro de Arizona. Desafortunadamente, esto provoc una inundacin grave y mortal. Las fuertes lluvias en el centro y sur de Arizona tambin provocaron mejoras de categoria 1 en el Monitor de Sequa de esta semana. Se registraron lluvias intensas aisladas en el centro y noreste de Nevada (a lo largo de la frontera con Utah), lo que provoc mejoras aisladas de categoria 1. Una reevaluacin de las condiciones en el centro y centro-norte de Oregón produjo algunas mejoras locales, donde la humedad del suelo y el caudal han mejorado y los dficits de precipitacin han disminuido. Justo al noroeste de estas mejoras, las malas condiciones de la vegetacin, el bajo caudal y los importantes dficits de precipitacin provocaron una pequena expansin de la sequa severa. La sequa severa se extendi al centro-sur de Utah, donde los dficits de precipitacin a largo plazo aumentaron junto con la escasez de humedad del suelo y caudal. El clima seco reciente y la cada de la humedad del suelo, del caudal de los arroyos y de los niveles de agua subternea provocaron expansiones de sequas severas y moderadas y de sequa anormal en el norte de Montana.

Caribe

Las precipitaciones superiores a lo normal en el este de Puerto Rico, asociadas con el paso de una onda tropical, provocaron una reduccin en la cobertura de sequa anormal. Esta semana, las temperaturas en toda la isla estuvieron, en su mayora, entre 1 y 2 grados por encima de lo normal.

Al comienzo de la semana de sequa (del mircoles 24 al martes 30 de septiembre), una onda tropical (AL94) trajo lluvias y tormentas elctricas a la regin. Tras el paso de la onda, las condiciones de vapor provocaron altos ndices de calor (al menos 42 C). El 29 de septiembre, pequeas concentraciones de polvo sahariano se desplazaron sobre las islas. Aunque el huracn Humberto se encontraba al menos a 800 kilmetros al norte (el 29 de septiembre), las playas de las Islas Vrgenes Estadounidenses an se encontraban al alcance de las olas del noreste que gener.

Las observaciones de precipitaciones durante la ltima semana en St. Croix variaron de 0,51 pulgadas en VI-SC-25 (Christiansted 4,4 W) a 1,62 pulgadas en VI-SC-29 (Frederiksted 2,5 NNE). Las cantidades intermedias incluyeron 0,60 pulgadas tanto en VI-SC-24 (Christiansted 2,1 ENE) como en VI-SC-30 (Christiansted 1,7 SO), 0,63 pulgadas en VI-SC-31 (Christiansted 3,2 O), 0,96 pulgadas en VI-SC-10 (Christiansted 1,6 E), 1,01 pulgadas en VI-SC-23 (Christiansted 6,5 O), 1,31 pulgadas en VI-SC-20 (Frederiksted 1,7 ESE), 1,32 pulgadas en VI-SC-35 (Frederiksted 1,3 ENE) y 1,58 pulgadas en VI-SC-34 (Frederiksted 1,9 NE). La observacin de 0,02 pulgadas en el Aeropuerto Henry Rohlsen parece demasiado baja considerando las ubicaciones circundantes y, por lo tanto, se descart esta semana. Los valores del ndice de Precipitacin Estandarizado (IPS) de esta semana para East Hill (672560) para 1, 3, 6, 9 y 12 meses fueron: +1,45, +0,49, +0,54, +0,52 y +1,23, lo que no favoreci la sequa. Los niveles de agua subternea en el pozo Adventure 28 en Santa Cruz oscilaron entre 5,6 metros (16:45 AST, 24 de septiembre) y 5,6 metros (23:45 AST, 30 de septiembre), lo que indica un ligero aumento general del nivel fretico. Si bien la designacin de sequa de Santa Cruz se mantiene como D0(S) esta semana, la reevaluacin de la prxima semana y el hecho de que nos encontramos dentro de la temporada de lluvias tradicional (agosto a noviembre) podran justificar su eliminacin.

En la isla de San Juan, las mediciones de precipitacin oscilaron entre 1,36 pulgadas (solo 4 das de datos) en VI-SJ-8 (Baha Cruz 7,4 E) y 3,38 pulgadas en VI-SJ-3 (Playa Windswept). Se registraron cantidades intermedias de 2,05 y 3,34 pulgadas de lluvia en VI-SJ-10 (Baha Cruz 3,1 NNO) y VI-SJ-5 (Baha Cruz 1,6 E), respectivamente. En Playa Windswept, las precipitaciones de los ltimos tres meses fueron de 2,07 pulgadas en julio, 7,26 pulgadas en agosto y 8,81 pulgadas (preliminares) en septiembre de 2025. Los valores del SPI de esta semana para East End (672551) no estaban disponibles. En el pozo Susannaberg Dpw 3 de St. John, los niveles freticos oscilaron entre 3,4 metros (10:00 a. m. AST, 24 de septiembre) y 2,6 metros (4:45 a. m. AST, 30 de septiembre), lo que representa un aumento significativo de 0,8 metros en el nivel del agua del pozo. La isla de St. John se mantiene libre de sequa.

En Santo Toms, las precipitaciones semanales variaron desde 44 mm en VI-ST-13 (Charlotte Amalie 1.2 NNO) hasta poco menos de 50 mm (50 mm) en VI-ST-15 (Charlotte Amalie Oeste

1.3 N). Se observó una precipitación intermedia de 47 mm en VI-ST-14 (Nadir 0.3 E [Marina Tropical]), que coincide con las demás estaciones, aunque con la salvedad de que solo se dispona de datos de una de esta semana. El Aeropuerto Cyril King estimó 24 mm de lluvia esta semana, lo cual podría ser correcto, aunque representa aproximadamente la mitad del total de las demás estaciones. Los valores del SPI en el Aeropuerto Cyril King (11640) para 1, 3, 6, 9 y 12 meses fueron: +0,30, -0,18, +0,47, +0,41 y +1,27 (con un nivel de humedad de 12 meses; por lo demás, cerca de lo normal en otros intervalos de tiempo). En el Pozo de la Escuela Primaria 3 de Santo Toms, los niveles de agua subterránea oscilaron entre 5,54 pies (9:15 a. m. AST, 24 de septiembre) y 3,78 pies (1:15 a. m. AST, 26 de septiembre). Si bien no se trata de un aumento tan pronunciado en el nivel del agua del pozo como en San Juan, un aumento de 1,76 pies es significativo. La isla de Santo Toms se mantiene libre de sequa.

Pacífico

Las precipitaciones en el sureste de Alaska superaron en su mayoría lo normal, entre 2,5 y 10 cm, esta semana, mientras que en la mayor parte del estado se mantuvieron a pocos centímetros de lo normal. Las temperaturas fueron variables, aunque tendieron a bajar entre 3 y 6 grados por debajo de lo normal en el centro, oeste y norte de Alaska esta semana. Alaska se mantuvo libre de sequa o sequedad anormal esta semana.

Esta semana se registraron precipitaciones por debajo de lo normal en el este y partes del norte de la Isla Grande de Hawái. La sequa extrema se extendió ligeramente al sur de la isla, mientras que la reducción de los caudales fluviales y los recientes déficits de lluvia provocaron la expansión de la sequa severa en el noreste. En partes del norte y este de Oahu, el clima también se volvió más seco esta semana, lo que provocó la expansión de la sequa moderada y severa, donde los déficits de lluvia aumentaron, los caudales disminuyeron y la salud de la vegetación se vio afectada. Las temperaturas en todo el estado fueron, en general, entre 0,5 y 2 grados por debajo de lo normal.

Diversas características meteorológicas afectaron la región USAPI durante la pasada semana de sequa (del miércoles 24 al martes 30 de septiembre). La mayor parte de la actividad se localizó sobre los Estados Federados de Micronesia (FSM) occidentales, Palaos y las aguas oceánicas al norte de Palaos, que fueron visitadas por dos ciclones tropicales: el supertifón Ragasa y el tifón Bualoi. Ragasa ya se encontraba abandonando la zona al inicio del periodo, y Bualoi se alejaba de Yap y Koror en dirección a Filipinas. En la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte (CNMI), un oleaje norte elevado y prolongado, proveniente de la distante tormenta tropical Neoguri, generó olas peligrosas de 2,4 a 3 metros y corrientes de resaca peligrosas a lo largo de los arrecifes orientados al norte de las Marianas. Sobre los EFM orientales, se observó un gran escudo de nubes y chubascos a principios del periodo debido a un fragmento residual de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), vaguadas de vientos alisios y la vaguada tropical de la alta troposfera (TUTT) al norte. El oleaje oceánico del distante Neoguri provocó aumentos de 6 a 8 pies en el nivel del agua, principalmente en Pohnpei y Kosrae. Una ZCIT moderadamente activa trajo periodos de chubascos intermitentes y algunas tormentas eléctricas a la República de las Islas Marshall (RMI) esta semana. Más tarde en el periodo, Invest 93W se estaba alejando de las Marianas; en su estela, varias vaguadas de vientos alisios y

relativamente seca, ya que un sistema de alta presión justo al sur de las islas continuó limitando la actividad de chubascos. Una amplia zona de nubosidad y chubascos permaneció justo al norte del área. A finales de la semana, una atmósfera predominantemente seca y estable sobre Samoa Americana estaba dando paso a un área de convergencia débil de nivel bajo y una vaguada, acompañada de lluvias incrustadas dentro del flujo de vientos alisios.

Para el período de 7 días que finalizó a las 12:00 h del 30 de septiembre, las estimaciones de precipitación satelital SPoRT (GPM IMERG) mostraron precipitaciones de 2,54 cm o menos en la República de las Islas Marshall (RMI), la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte (CNMI), los Estados Federados de Micronesia (FSM) oriental y central, y en amplias regiones con precipitaciones de 2,54 a 5,08 cm (localmente de 5,08 a 10,16 cm), principalmente en los EFM occidentales y las aguas oceánicas al norte de Palaos. Los totales más altos para esta última región se deben en parte al paso de ciclones tropicales. Al sur del ecuador, Samoa Americana se mantuvo cerca del borde sur de una franja de lluvia alargada que produjo hasta 2,54 cm de lluvia.

En las Islas Marianas Centrales (CNMI), las precipitaciones medidas la semana pasada oscilaron entre 2,35 cm en Tinian y 11,27 cm en Saipán. Los totales intermedios de precipitaciones incluyeron 5,55 cm en Guam, 5,71 cm en el aeropuerto de Rota, 7,54 cm en Agaña y 9,24 cm en Dedado. Dados los umbrales semanales y mensuales de 2,54 cm y 10,16 cm, respectivamente, para cubrir la mayoría de las necesidades hídricas en las CNMI, Tinian fue la única estación que no alcanzó el umbral mínimo semanal esta semana. Sin embargo, el total preliminar de precipitaciones de septiembre en Tinian fue de 15,24 cm, más que suficiente para cubrir el requisito mensual de 10,16 cm. Rota y Agaña registraron las últimas 12 semanas y los últimos 4 meses como "hmedos", con totales provisionales de precipitaciones de septiembre de 21,54 y 31,18 cm, respectivamente. Los totales provisionales de precipitaciones de septiembre para Saipán y Guam son de 26,44 y 31,14 cm, respectivamente. Por cierto, en los últimos tres meses se han registrado precipitaciones más que suficientes para cubrir la mayoría de las necesidades hídricas en Saipán, con totales de 140, 370 y 168 mm para junio, julio y agosto, respectivamente. Las condiciones se mantienen sin sequas en las Islas Marianas del Norte.

En los Estados Federados de Micronesia (FSM), se observó una combinación de estaciones "hmedas" (más de 5 cm) y "secas" (menos de 5 cm) durante la última semana de sequa. Las precipitaciones oscilaron entre 1,1 cm en Lukunoch y 14 cm en Gilman. Las precipitaciones intermedias que no alcanzaron el requisito mínimo semanal de 5 cm incluyeron 1,7 cm en Kapingamarangi, 2,6 cm en Nukuoro, 3,8 cm en Pohnpei y 5 cm en Chuuk. Las precipitaciones intermedias que superaron el requisito de 5 cm incluyeron 6,7 cm en Kosrae, 8,2 cm en Woleai, 10,4 cm en Rumung, 11,5 cm en North Fanif y 12 cm en Yap. Algunas cantidades preliminares de lluvia mensual que no alcanzaron el mínimo de 20 cm requerido para cubrir la mayoría de las necesidades hídricas incluyen apenas 5 cm en Kapingamarangi y 13 cm en Lukunoch. Entre las zonas que superaron el mínimo de 20 cm para septiembre de 2025 (datos preliminares) se incluyen 21,5 cm en Nukuoro, 33,8 cm en Pohnpei, 38,1 cm en Chuuk y 48,1 cm en Yap. Algunas estadísticas diversas para la región incluyen las últimas 4 semanas secas en Kapingamarangi (que conserva su designación D1(S)), las últimas 12 semanas y los últimos 12 meses lluviosos en Kosrae, condiciones hmedas desde diciembre de 2024 hasta agosto de

2025 en Lukunoch, antes de esta semana, 11 semanas consecutivas de lluvia en Pohnpei (incluyendo condiciones hmedas registradas desde octubre de 2024 hasta septiembre de 2025), y un abril a septiembre de 2025 lluvioso en Chuuk. No se dispona de datos, o no se dispona de datos suficientes, para un anlisis de las estaciones de Fananu, Pingelap y Ulithi esta semana. En resumen, no se indic sequa ni sequedad en ninguna de las estaciones de los Montes de los Fiordos, excepto en Kapingamarangi (D1(S)).

En la Repblica de Palaos, Koror registr 10,5 mm de precipitacin la semana pasada, y los datos preliminares indican 28,5 mm de lluvia durante septiembre. Adems, los ltimos 12 meses se han registrado como hmedos. En Airai (WSO Palaos), se registraron 7,2 mm de lluvia, muy por encima del mnimo semanal de 5,08 mm. Palaos se mantiene sin sequa esta semana.

En toda la RMI esta semana, los totales de precipitacin variaron de 1,80 pulgadas en Jaluit (una semana "seca") a 4,20 pulgadas en Wotje. Las acumulaciones intermedias incluyeron 2,91 pulgadas en Ailinglaplap, 3,34 pulgadas en Majuro y 3,66 pulgadas en Kwajalein. Los totales preliminares de lluvia de septiembre incluyen 6,87 pulgadas en Wotje ("seca"), 10,92 pulgadas en Kwajalein, 11,52 pulgadas en Ailinglaplap, 12,87 pulgadas en Majuro y 15,15 pulgadas en Jaluit. Las designaciones de sequa se mantuvieron secas y libres de sequa en Kwajalein, Ailinglaplap, Jaluit y Majuro esta semana. Los datos no estaban disponibles en Mili y Utirik esta semana, lo que impide cualquier posible anlisis. Wotje report 10,8 mm de lluvia esta semana (de los cuales 6,2 mm cayeron el ltimo da del periodo) y un total preliminar de 17,3 mm para el mes de septiembre. Si bien esta es una cantidad considerable de lluvia la semana pasada, Wotje ha tenido dificultades para registrar semanas o meses hmedos recientes, por lo que su pronstico se mantiene en D0(S) esta semana.

Al sur del ecuador, Samoa Americana se vio afectada por condiciones relativamente secas la semana pasada. Las precipitaciones se concentraron en torno a 2,5 cm, con 2,4 cm en Toa Ridge, 2,7 cm en Pago Pago (con unas considerables 17,7 cm la semana anterior) y 2,8 cm en Siufaga Ridge. Las acumulaciones provisionales de lluvia para septiembre en estas mismas estaciones fueron de 21,7 cm, 28,1 cm y 27,5 cm, respectivamente. Tutuila se mantiene sin sequa esta semana.

Mirando hacia el futuro

Entre la tarde del mircoles 1 de octubre y el lunes 6 de octubre, el Centro de Predicciones Meteorolgicas del Servicio Meteorolgico Nacional pronostica tiempo mayormente seco en grandes porciones de los Estados Unidos Contiguos, que abarcan desde el sur de California al este y noreste a travs del Valle de Ohio, el este de los Grandes Lagos y el noreste. Fuera del sureste, las cantidades de precipitacin de al menos 0,75 pulgadas se limitan a partes de la Sierra Nevada, el norte de Nevada, el norte de Utah, partes de Idaho, el norte de Wyoming, el sur de Montana, el oeste de Dakota del Sur y el centro de Dakota del Norte. Se pronostican cantidades de lluvia ms intensas en partes del sureste de Luisiana y la costa del Golfo de Mississippi, el extremo sur de Carolina del Sur, el extremo sureste de Georgia y gran parte de la Pennsula de Florida. En la Pennsula de Florida y el extremo sureste de Luisiana, las cantidades de lluvia pueden superar las 4 pulgadas.

De cara al 7-11 de octubre, los pronsticos del Centro de Prediccin Climtica (CPC) del Servicio

Meteorológico Nacional (SNM) indican una fuerte tendencia a precipitaciones superiores a lo normal en el suroeste de EE. UU., especialmente en Arizona y Nuevo México, mientras que se prevén precipitaciones superiores a lo normal en partes de las Grandes Llanuras centrales, el Alto Medio Oeste y la península de Florida. El CPC prevé precipitaciones inferiores a lo normal en partes del centro-sur de EE. UU. y de la costa norte del Pacífico. Se prevé que la mayor parte del suroeste, centro y este de EE. UU. registren temperaturas superiores a lo normal, junto con el extremo noroeste. Algunas zonas del oeste, desde California hasta el centro y este de Montana, podrán registrar temperaturas cercanas a lo normal.

El pronóstico del CPC para Hawái favorece precipitaciones y temperaturas superiores a lo normal en todo el estado.

En Alaska, el pronóstico del CPC favorece fuertemente las precipitaciones por encima de lo normal en el noroeste del estado y por debajo de lo normal en el sureste. Se prevén temperaturas más cálidas de lo normal en la mayor parte del estado, excepto en el sureste de Alaska, donde es más probable que se registren temperaturas cercanas a lo normal.

Autor(s)

Anthony Artusa, NOAA/NWS/NCEP/CPC

Curtis Riganti, National Drought Mitigation Center