

Resumen nacional de sequía para 14 octubre, 2025

Resumen

Un aumento repentino de humedad tropical a finales de temporada trajo fuertes precipitaciones e inundaciones en algunas zonas de los Estados de las Cuatro Esquinas. Se reportaron cantidades de entre 10 y 15 cm (4 y localmente ms de 6 pulgadas) en partes del interior de Arizona y el sur de Colorado. Ms al este, un potente sistema de tormentas costeras trajo vientos racheados y fuertes lluvias a partes de la Costa Este. Las precipitaciones totales se acercaron a 30 cm (1 pie) cerca de Georgetown y Pawley's Island, Carolina del Sur, mientras que se registraron cantidades de entre 18 y 25 cm (7 y 10 pulgadas) dispersas en Carolina del Sur y cerca de Whiteville, Carolina del Norte. Se registraron totales de entre 10 y 15 cm (4 y 6 pulgadas) en lugares dispersos desde el sur de Florida hacia el norte hasta el este de Massachusetts. Las rfagas de viento alcanzaron entre 96 y 105 km/h (60 y 65 mph) en varias boyas cerca de la costa de Carolina del Norte; Cape Lookout, Carolina del Norte; e Island Beach Park, Nueva Jersey. En contraste, solo unas pocas dcimas de pulgada, como mximo, cayeron en el sureste de California, la mayor parte de la Gran Cuenca, las Altas Llanuras centrales y septentrionales, gran parte de las Grandes Llanuras, la Regin de los Grandes Lagos, partes del Valle Medio y Bajo del Misisipi, gran parte del interior del Sur Profundo y la Regin de la Costa del Golfo. Las designaciones de sequa mejoraron en mltiples categoras en algunas de las reas ms hmedas del interior de Arizona, el sur de Colorado y el este de Carolina del Sur, mientras que amplias reas de mejora de 1 categora cubrieron la Regin de las Cuatro Esquinas central y suroccidental, el Valle Medio y Bajo del Ohio y lugares adyacentes, y partes de la Costa Atlntica desde el sur de Florida hasta el sur de Nueva Inglaterra. En contraste, la sequedad y la sequa persistieron o se intensificaron en grandes partes del Sur Profundo lejos de la Costa Atlntica, la Regin Central de la Costa del Golfo, el Valle Bajo del Misisipi, las Grandes Llanuras del centro-este y centro-sur, y lugares dispersos en el nivel norte de los 48 estados contiguos desde Montana hasta el norte de Nueva Inglaterra.

Noreste

Delaware. Se observaron totales de 2 a 4 pulgadas localmente en el resto del centro y sur de Nueva Jersey, el sur de Nueva Inglaterra, del centro al sureste de Nueva York, la franja central de Pensilvania, gran parte del sur y noreste de Virginia Occidental y partes de las elevaciones ms altas de Maryland. La mayora de las localidades de la Regin Noreste reportaron cantidades moderadas de 0.5 a localmente cercanas a 2 pulgadas, con algunas cantidades menores reportadas en el sur de Maine y a lo largo del Valle del San Lorenzo. Esto trajo mejoras de sequa de categora 1 a gran parte del sur de Nueva Inglaterra, finalmente trayendo una pequea mejora tangible a Cape Cod, que ha estado arraigado en la sequa por ms tiempo que la mayora de las otras localidades del Noreste. Tambin se not una mejora en algunas reas del sur y este de Virginia Occidental, el este del norte del estado de Nueva York y el este de Nueva Jersey, mientras que algunas reas del este de Maine y el Valle del San Lorenzo notaron un aumento en los indicadores de sequedad y sequa.

Sureste

Las partes orientales de la Región Sureste afectadas por el complejo de tormentas costeras experimentaron una mejora significativa en la sequedad y la sequa, acompañadas de fuertes lluvias, reas de inundaciones y vientos fuertes. Gran parte del este de Carolina del Sur y algunas reas adyacentes notaron mejoras de 2 categorías, de 6 a 12 pulgadas de lluvia, mientras que se notó una mejora en muchas reas de la costa atlántica desde Florida hasta las Carolinas. Más al oeste, prevalecieron condiciones mucho más secas, junto con temperaturas generalmente superiores a lo normal. El aumento de los déficits de lluvia a corto plazo contribuyó a la pérdida de humedad superficial, lo que provocó reas significativas de deterioro de la sequedad y la sequa desde el oeste de Virginia y el norte de Carolina del Norte hacia el sur a través del norte del estado de Carolina del Sur, partes de Georgia, la franja norte de Florida y gran parte de Alabama. La sequa D3 (extrema) se expandió significativamente por el suroeste de Georgia, gran parte del Panhandle de Florida y el estado adyacente de Alabama.

Sur

Las lluvias recientes permitieron una ligera mejora en la sequa y la sequa en el oeste de Tennessee, el vecino Misisipi, el centro de Oklahoma y el oeste de Texas. Sin embargo, el deterioro fue más común en la Región Sur, donde la mayor parte del noroeste de Misisipi, Luisiana y el este de Oklahoma registraron cierta intensificación. Se registraron lluvias moderadas a localmente intensas en zonas aisladas, pero la mayor parte de la Región registró cantidades inferiores a lo normal durante la semana.

Medio Oeste

Las fuertes lluvias trajeron una mejora generalizada a la mayor parte de Kentucky, la zona sur de Ohio e Indiana, el este de Ohio y algunas zonas cercanas al sur del lago Michigan. Algunas zonas en el centro de Ohio experimentaron una mejora de dos categorías. En otras zonas, cayeron cantidades menores, lo que provocó un deterioro disperso en Illinois, el centro de Indiana, Michigan, el centro-este y el noroeste de Wisconsin, Minnesota, el noroeste de Iowa y partes de Missouri (especialmente la franja occidental). Durante los últimos dos meses, se registraron precipitaciones de entre 10 y 20 cm por debajo de lo normal en la mayor parte de Missouri e Illinois, además de partes del suroeste de Iowa y la península inferior de Michigan, en el centro-este. Gran parte del norte de Indiana y el noroeste de Ohio registraron entre 7,6 y 12,7 cm por debajo de lo normal durante este período.

Altas Llanuras

Precipitaciones de fuertes a excesivas azotaron las zonas más altas de Colorado. La mayoría de las reas, desde el centro-oeste hasta el centro-sur del estado, recibieron al menos 76 mm de precipitación, con cantidades mucho mayores, llegando a los 203 mm en algunos puntos, en las zonas más altas del centro-sur de Colorado. Estas precipitaciones propiciaron mejoras generalizadas, con algunas de las zonas más húmedas registrando mejoras de dos categorías.

En otras zonas, se registraron precipitaciones de ligeras a moderadas (generalmente de 127 a 380 mm) en la mayor parte de las llanuras y Wyoming, con cantidades superiores a 254 mm en zonas aisladas del centro de Kansas, el este de Dakota del Norte y el extremo oeste de Wyoming. Las zonas significativas de desarrollo o deterioro de la sequedad se limitaron al este de Kansas y la franja sur de Dakota del Sur.

Oeste

La humedad tropical tarda llegar a los Estados de las Cuatro Esquinas, provocando precipitaciones de fuertes a excesivas en amplias zonas de Arizona, el oeste de Nuevo México y el este de Utah. También se observó una mejora en zonas dispersas del centro y oeste de Utah, y el suroeste de Montana. Las pocas zonas con deterioro se ubicaron en el centro-norte y noreste de Montana, donde partes de algunos condados pasaron de D0 a sequía moderada (D1). En otras partes de la Región Oeste, las precipitaciones fueron moderadas, y la sequía y la sequía se mantuvieron prácticamente sin cambios.

Caribe

La sequía anormal (D0) se extendió por más zona del sudeste de la Commonwealth, mientras que el aumento de las precipitaciones puso fin a D0 cerca de la costa centro-sur.

La tormenta tropical Jerry pasó al noreste del Caribe esta semana, provocando un aumento de la humedad y la inestabilidad en las Islas Vírgenes de Estados Unidos y causando intensas ráfagas de lluvias torrenciales.

En Santa Cruz, las estaciones CoCoRaHS reportaron diversas cantidades de lluvia para la semana. VI-SC-35 (Frederiksted, 1.3 ENE) recibió 3.21 pulgadas de lluvia, mientras que VI-SC-30 (Christiansted 1.7 SO) registró 2.98 pulgadas. VI-SC-34 (Frederiksted, 1.9 NE) reportó 2.71 pulgadas, aunque faltan dos días de datos. VI-SC-20 (Frederiksted, 1.7 ESE) midió 2.72 pulgadas, y VI-SC-10 (Christiansted, 1.6 E) notó 2.19 pulgadas. Finalmente, VI-SC-23 (Christiansted, 6.5 O) registró 1.63 pulgadas de lluvia. Esta semana, el valor del índice de Precipitación Estandarizado (SPI) de 1 mes para East Hill es 1.5, lo que refleja las fuertes lluvias recientes. Además, los valores del SPI de los últimos 3, 6, 9 y 12 meses también mostraron tendencias positivas debido a las precipitaciones recientes. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), el nivel fretico en el pozo Adventure 28 (St. Croix, Islas Vírgenes Estadounidenses) ha disminuido de 5,7 m (18,60 pies) el mes pasado, el 14 de septiembre, a 5,5 m (18,15 pies) esta semana, el 14 de octubre, lo que mantiene a St. Croix libre de sequía.

Esta semana, St. John experimentó lluvias significativas en toda la isla. Windswept Beach (VI-SJ-3) registró 8,5 cm de lluvia, mientras que Myall Point (VI-SJ-9, 0,1 S) registró 7,4 cm. Cruz Bay (VI-SJ-5, 1,6 E) recibió 2,9 cm. Todos los valores del índice de Precipitación Estandarizado (IPE) en la estación East End (672551) de St. Johns son positivos, lo que indica que la isla se encuentra actualmente con condiciones climáticas húmedas. Al 14 de octubre de 2025, el nivel fretico en el pozo Susannaberg DPW 3 en St. John, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, disminuyó de 4,9 m el 14 de septiembre a 2,3 m el 14 de octubre, lo que permite que St. John se mantenga libre de sequía.

Santo Toms también recibió precipitaciones significativas en toda la isla. Por ejemplo, el 11 de octubre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional informó que el Aeropuerto Cyril E. King de Santo Toms recibió 90 mm de lluvia en un solo día, lo que contribuyó a un total semanal de 105 mm. El pluviómetro de VI-ST-13 (Charlotte Amalie, 1,2 NNO) registró 120 mm de lluvia, aunque faltaban datos de un día. Mientras tanto, VI-ST-15 (Charlotte Amalie Oeste, 1,3 N) registró 89 mm de lluvia, también con un día de datos faltantes. Además, VI-ST-14 (Nadir 0,3E/Marino Tropical) registró 14 mm de lluvia, pero tenía cuatro días de datos faltantes. Además, el nivel de agua subterránea en el pozo Grade School 3 en St. Thomas, USVI, ha disminuido de 8,19 pies el 14 de septiembre a 2,59 pies el 14 de octubre. Este cambio indica que St. Thomas permanece libre de sequa.

Pacífico

Actualmente no existen condiciones de sequa.

A pesar de las áreas con precipitaciones ligeras a moderadas, la sequedad y la sequa que cubren la mayor parte del estado no han cambiado respecto de la semana anterior.

Esta semana, la mayoría de las Islas Marshall se mantuvieron libres de sequa, mientras que algunas islas experimentaron precipitaciones considerables. Por ejemplo, Majuro, Ailinglapalap y Wotje registraron 16,2 mm, 10,5 mm y 6,7 mm de lluvia, respectivamente. Jaluit y Kwajalein reportaron 5,9 mm y 6,7 mm de lluvia, respectivamente. Además, Mili recibió 9,5 mm de lluvia esta semana, lo que ha ayudado a la isla a mantenerse libre de sequa gracias a las lluvias de las últimas semanas. Por otro lado, Utirik registró 1,1 mm de lluvia esta semana y se encuentra libre de sequa gracias a las lluvias recientes y las recomendaciones de los expertos locales.

Esta semana, fuertes lluvias afectaron varias islas de los Estados Federados de Micronesia. Kosrae recibió 15,5 mm de lluvia, Nukuoro 14,5 mm y Pohnpei 9,5 mm. Además, Yap, la laguna de Chuuk, Lukunor y Woleai recibieron 6,2 mm, 5,6 mm, 4,9 mm y 2,7 mm de lluvia, respectivamente, lo que garantiza que estas islas permanezcan libres de sequa. Pingelap recibió solo 4,5 mm esta semana, pero se mantuvo libre de sequa debido a las condiciones húmedas de las semanas anteriores. Por el contrario, Kapingamarangi no recibió lluvia y actualmente experimenta una sequa severa.

Samoa Americana ha experimentado recientemente lluvias importantes, con fuertes aguaceros en varias zonas de la isla. Pago Pago registró 89 mm de lluvia, Siufaga Ridge recibió 144 mm y Toa Ridge reportó 82 mm esta semana. Como resultado, Samoa Americana se encuentra actualmente libre de sequa.

Palaos tuvo tiempo lluvioso esta semana: la Oficina del Servicio Meteorológico de Airai registró 3,4 mm de lluvia, mientras que Koror reportó 5,4 mm. Como resultado, la isla se mantuvo libre de sequa.

Esta semana, prevalecieron condiciones climáticas húmedas en las Islas Marianas, con fuertes lluvias en algunas zonas. Según el informe semanal de precipitaciones, Rota registró 62 mm de lluvia, Guam 29 mm, Tinian 19 mm y Saipan 13 mm. Como resultado, las Islas Marianas se encuentran actualmente libres de sequa.

Mirando hacia el futuro

Del 15 al 20 de octubre de 2025, se pronostican fuertes precipitaciones (de 1,5 a 3,0 pulgadas) en las zonas costeras y barlovento desde las Cascadas hasta el océano Pacífico, en el este de Montana y la región adyacente de Dakota del Norte, a lo largo de un límite frontal desde el valle medio del Misisipi hasta la franja central de la región de los Grandes Lagos, y en zonas dispersas del noroeste de Pensilvania, el valle del Tennessee y el valle inferior del Ohio. Se anticipan cantidades moderadas de 0,7 a 1,5 pulgadas en el resto del noroeste del Pacífico, las elevaciones más altas del norte del oeste intermontano, el centro y norte de Wyoming, la franja norte de las llanuras, partes de las Grandes Llanuras centrales, la mayoría de las áreas desde el sureste de las Grandes Llanuras hasta la región de la costa del Golfo, el sur profundo del interior, la mayor parte del valle del Ohio, la parte baja del noreste y el sur de Nueva Inglaterra. Mientras tanto, se esperan unas pocas décimas de pulgada como máximo en la región del Atlántico Sur, la mayor parte de la mitad sur de las llanuras y el cuarto suroeste de los 48 estados contiguos. Las temperaturas promediarán generalmente por debajo de lo normal desde las Montañas Rocosas hacia el oeste, y por encima de lo normal desde las Llanuras hasta la Costa Atlántica. Se esperan máximas diarias de 4 a 5 F por debajo de lo normal desde el sureste de California hasta el sur de Idaho y el este de Oregón, mientras que las temperaturas máximas superarán en promedio los 8 a 11 F en el centro y sur de Texas y la mayor parte de Maine.

El pronóstico de 6 a 10 días del Centro de Predicción Climática, válido del 21 al 25 de octubre, favorece precipitaciones más intensas de lo normal en el centro y norte de California, el noroeste de Nevada y el noroeste del Pacífico. Las probabilidades de totales en el tercio superior de ocurrencias históricas superan el 60 por ciento al oeste de las Cascadas.

Condiciones más húmedas de lo normal son nominalmente favorecidas en Hawái, la mayor parte de Alaska, las secciones del sur de las Montañas Rocosas y las Altas Llanuras, el centro y oeste de Texas, y desde los Grandes Lagos hasta gran parte de la Región del Atlántico Medio y el Noreste. Es más probable que haya precipitaciones por debajo de lo normal en las secciones del centro y norte de las Montañas Rocosas y las Grandes Llanuras, así como en partes de la Región del Atlántico Sur. Se espera un clima más cálido de lo normal desde el norte del Oeste Intermontano hasta los Apalaches, además de gran parte del Atlántico Sur y el Noreste. Es más probable que el sur de Texas y la mayor parte de Maine experimenten un clima más cálido de lo normal. También se favorece un clima inusualmente cálido en la mitad oriental de Alaska continental y en Hawái. Se espera que las temperaturas promedien cerca de lo normal desde las Montañas Rocosas hasta la Costa Oeste y a lo largo de las Carolinas y Virginia. También se espera que la franja central de Alaska promedie cerca de lo normal, mientras que se prevén temperaturas por debajo de lo normal en el oeste de Alaska continental.

Autor(s)

Richard Tinker, NOAA/NWS/NCEP/CPC

Tsegaye Tadesse, National Drought Mitigation Center