

Resumen nacional de sequía para 28 octubre, 2025

Resumen

La semana pasada se observaron fuertes precipitaciones (ms de 76 mm) en gran parte de las zonas altas y costeras desde el norte de California hasta la frontera con Canad. Ms al este, cantidades similares afectaron a numerosas localidades desde Oklahoma hasta el centro de Texas, algunas zonas del valle del bajo Misisipi, partes de los Apalaches del sur, zonas de la costa central del Golfo de Mxico, el centro-este de la pennsula de Florida y algunas reas cercanas al lago Erie. Entre 127 y 254 mm de precipitacin cayeron en algunas zonas costeras y de mayor altitud de Washington y Oregón, desde el centro-norte hasta el centro-este de Oklahoma, el noreste de Texas, el centro-sur de Misisipi y el centro-este de Florida. Se registraron precipitaciones de moderadas a intensas (entre 25 y 75 mm, con cantidades mayores en algunas zonas) en el resto del noroeste del Pacífico, partes de las zonas de mayor altitud del norte de la región intermontaosa del oeste, parte del norte de las Grandes Llanuras, la mayor parte del centro y oeste de Michigan, algunas zonas aisladas de Nueva Inglaterra y muchas reas desde el centro de las Carolinas hasta el centro de las Grandes Llanuras, además de gran parte del norte y centro de Texas, el sur del valle del Bajo Misisipi y algunas zonas aisladas del noroeste y centro de Florida. Otras localidades de los Estados Unidos continentales ("los 48 estados contiguos") recibieron, en el mejor de los casos, apenas unos milímetros de precipitacin.

Esto resultó en mejoras significativas en reas del noroeste del Pacífico, el norte de la región intermontaosa del oeste, las Grandes Llanuras desde el este de Kansas hasta el centro de Texas, el interior del sur profundo, el valle de Ohio, el este de los Grandes Lagos, las Carolinas, el sur de los Apalaches y algunas zonas de Nueva Inglaterra. En algunas de las reas ms secas, las condiciones de sequa empeoraron en algunas partes de las Grandes Llanuras centrales y septentrionales, el Panhandle de Texas, el sur profundo y la costa de Texas, el sur de Alabama y Georgia, y pequeñas reas del Atlántico medio y el noreste desde Nueva York hasta la costa de Maine. El deterioro de las condiciones también afectó a pequeñas partes de Hawái (el interior de Maui, el noreste de Maui y el sureste de la Isla Grande). Las condiciones en Puerto Rico permanecieron sin cambios, aunque persistió una sequa anormal en partes del sureste de la isla, y Alaska se mantuvo libre de sequa.

En general, la cobertura de condiciones secas de grado 0 o superiores en los 48 estados contiguos disminuyó ligeramente del 72 % al 69 %, manteniéndose muy por encima del promedio desde el año 2000 (49,2 %). La extensión de la sequa (grado 1 o superior) también disminuyó ligeramente del 46,1 % al 43,6 % en los 48 estados contiguos, manteniéndose igualmente por encima del promedio desde el año 2000 (31,1 %).

Noreste

Cayeron varios centímetros de precipitacin al abrigo del lago Erie, mejorando las condiciones en esa zona. En otras regiones, se registraron lluvias de ligeras a moderadas al abrigo del lago Ontario y en la mayor parte de Nueva Inglaterra, con algunas cantidades mayores observadas en el norte de Nuevo Hampshire y el este de Maine. En el resto de la región

noreste, solo se registraron totales dispersos inferiores a 0,5 cm. Se observó una mejora en el suroeste y noroeste de Pensilvania, el extremo occidental de Nueva York, algunas de las zonas más elevadas de Vermont y Nuevo Hampshire, y parte del este de Maine. Por el contrario, la escasez de precipitaciones provocó un deterioro en el sur de Maine, partes del interior del estado de Nueva York y pequeñas zonas del sur de Nueva Jersey y Maryland. Varios puntos en el extremo sur del noreste reportan caudales mínimos históricos o casi históricos para finales de octubre, incluyendo el río Lehigh en Glendon, Pensilvania, Rock Creek cerca de Washington D. C., y algunos arroyos cerca de Downingtown, Phoenixville y Allentown, Pensilvania. Las precipitaciones totales de los últimos 60 días están entre 3 y 6 pulgadas por debajo de lo normal en una franja que va desde Maryland y el sur de Pensilvania hasta el centro y el este de Pensilvania, el norte y el oeste de Nueva Jersey, el norte y el sureste del estado de Nueva York y zonas dispersas de Nueva Inglaterra.

Sureste

Las precipitaciones fueron muy variables en la región sureste. Cayeron al menos 25 mm en el centro y sur de las Carolinas, el centro y norte de Georgia y Alabama, el sur del Panhandle de Florida y partes del centro y este de la península de Florida. Más de 76 mm azotaron el oeste de Carolina del Sur y áreas adyacentes, zonas aisladas del norte de Georgia, parte del centro-este de la península de Florida y la costa oeste del Panhandle de Florida. En contraste, llovió poco o nada en la mayor parte de Virginia, el sur de Georgia, el sureste de Alabama y la mayor parte de la península de Florida.

Esto dio como resultado una mejora bastante generalizada desde el centro de Carolina del Sur hacia el oeste, abarcando los Apalaches meridionales y las zonas norte y oeste de Alabama. Más al sur, donde las precipitaciones fueron más escasas y dispersas, se produjo un deterioro en el sureste de Alabama, parte del sur de Georgia, además de porciones del Panhandle de Florida y el sur de la península de Florida.

Las condiciones de sequía más intensas abarcan ahora una amplia franja del norte de Florida y zonas adyacentes de Georgia, donde predominan las condiciones D3. Áreas más pequeñas con condiciones D3 cubren el centro-oeste de Alabama y el noroeste de Georgia. La categoría D2 persiste en las zonas aledañas, además del sureste de Alabama, el este de Carolina del Norte y parte del norte de Virginia. En general, la cobertura de sequía disminuyó ligeramente, del 85,0 % al 81,7 %, pero las categorías más intensas (D2 o superior) aumentaron del 19,1 % al 22,9 %, debido principalmente al rápido y continuo deterioro en el norte de Florida y sus alrededores. Los mayores déficits de precipitación en los últimos 60 días se registran en partes de la cordillera Blue Ridge de Virginia, el este de Carolina del Norte y algunas zonas cercanas a las fronteras entre Florida, Georgia y Alabama. En estas áreas, el déficit acumulado de precipitación oscila entre 100 y 200 mm desde finales de agosto.

Sur

Las intensas lluvias en muchas regiones propiciaron una amplia mejora en la mayor parte de Texas, Oklahoma, Luisiana, Misisipi y Tennessee. Se observó cierto deterioro en áreas que no

recibieron lluvias intensas, específicamente en el sur y la costa de Texas, parte del Panhandle de Texas y algunas zonas del Valle del Rojo (Sur). Varias pulgadas de lluvia resultaron en algunas franjas de mejora de categoría 2 en el centro y centro-este de Texas, así como en el centro de Oklahoma, donde se registraron entre 4 y 8 pulgadas de precipitación. En general, la cobertura de sequa disminuyó del 80.6% al 68.6% de la región, mientras que la cobertura de sequa (D1 o superior) se redujo del 37.1% al 27.6%. La extensión de D3-D4 disminuyó ligeramente del 10.7% al 9.6%. Pero a pesar de la semana lluviosa, las precipitaciones acumuladas en 90 días oscilaron entre 3 y 6 pulgadas por debajo de lo normal en gran parte del Valle del Rojo (Sur), y entre 4 y localmente más de 10 pulgadas desde el centro de Texas hacia el este a lo largo y cerca de la costa del Golfo.

Medio Oeste

Cayeron varios centímetros de precipitación al abrigo del lago Erie, lo que provocó una mejora de dos categorías en el noreste de Ohio. Se registraron precipitaciones de moderadas a fuertes en el norte de la Península Superior de Michigan, el oeste de la Península Inferior de Michigan, el noroeste de Minnesota, el sureste de Missouri y las zonas cercanas a la confluencia de los ríos Misisipi y Ohio. Otras localidades de Michigan, el norte de Minnesota, la mitad sur de Missouri y el centro y sur de Kentucky registraron totales de precipitaciones de ligeras a localmente fuertes, mientras que la mayor parte del área desde el sur de Minnesota, Iowa y el norte de Missouri hacia el este, a través de Illinois, Indiana y Ohio, experimentó una semana seca, con solo algunos puntos aislados que registraron hasta 5 mm. Algunas de las zonas más húmedas de Michigan y el valle del Ohio experimentaron una mejora en las condiciones hacia el final de la semana, y se registraron algunas otras mejoras tras una reevaluación de las fuertes lluvias de principios de mes. Se produjo un empeoramiento de las condiciones en partes de la franja seca desde Iowa hasta Indiana. En general, la cobertura de condiciones meteorológicas de grado 0 o superior disminuyó ligeramente, del 71,2 % al 68,8 % de la región del Medio Oeste, pero las condiciones más intensas (grado 2 o superior) aumentaron ligeramente, del 9,7 % al 11,6 % de la región. Las precipitaciones de los últimos 60 días fueron, en general, entre 7,6 y 12,7 cm inferiores a lo normal en el norte de Wisconsin, parte del norte y este de Iowa, el centro y norte de Illinois y numerosas localidades del centro de Indiana y el noroeste de Ohio.

Altas Llanuras

La región de las Grandes Llanuras es actualmente la menos afectada por la sequa. Solo el 37,2 % de la región se ve afectada por sequa (D0 o D1-D4). Colorado y Wyoming son los estados más afectados por la sequa, con casi el 55 % de su territorio combinado cubierto por condiciones D0 o peores, y aproximadamente un tercio experimentando algún grado de sequa (D1-D4), principalmente en las zonas de mayor altitud. En los estados de las Grandes Llanuras, no hay sequa en Dakota del Norte y la sequa (D0) afecta a menos del 3 % del estado. Las condiciones secas son un poco más comunes al sur, con condiciones D0 o peores que afectan al 39 % de Dakota del Sur, al 35 % de Nebraska y al 25 % de Kansas. En los tres estados, la cobertura por sequa (D1 o peor) es inferior al 13 %. La semana pasada, lluvias moderadas a localmente intensas provocaron mejoras en algunas zonas del este de

Kansas y el extremo noroeste de Wyoming, mientras que se produjeron zonas de deterioro en el este de Dakota del Sur y pequeñas partes del centro-sur de Colorado y el extremo noreste de Kansas.

Oeste

Tras los cambios sustanciales registrados la semana pasada en la región oeste, las condiciones se mantuvieron estables en general, salvo en la franja norte de dicha región. No se observaron cambios con respecto a la semana anterior en Nuevo México, Arizona, Utah, Nevada y la mayor parte de California. En la franja norte de la región oeste, las intensas precipitaciones propiciaron una mejora en algunas zonas, principalmente en el norte de California, Oregón y Washington, desde la cordillera de las Cascadas hasta la costa del Pacífico. En muchas localidades de las zonas altas de Washington y cerca de la costa de Washington y el norte de Oregón se registraron más de 76 mm de precipitación, con cantidades dispersas de entre 102 mm y más de 203 mm en algunas zonas, especialmente en el noroeste y el centro-norte de Washington. Más al este, las recientes precipitaciones propiciaron cierta mejora en el oeste de Montana y el norte de Idaho, mientras que, hacia el este, la escasez reciente de precipitaciones provocó un empeoramiento en el centro-norte de Montana.

Caribe

La sequía anormal (D0) se mantuvo sin cambios con respecto a la semana pasada después de algunas lluvias dispersas de ligeras a moderadas en Puerto Rico.

Las Islas Vírgenes de los Estados Unidos permanecieron libres de sequía. Las estimaciones cuantitativas de precipitación a 7 días del Servicio Meteorológico Nacional indicaron que St. Thomas recibió entre 12,7 y 38,1 mm, St. John entre 12,7 y 25,4 mm, mientras que St. Croix recibió 12,7 mm o menos. El Índice de Salud de la Vegetación indicó un estrés hídrico leve en St. Croix. Los niveles de agua en los pozos de todas las islas aumentaron durante el último mes y comenzaron a descender nuevamente.

Pacífico

Actualmente no hay sequía ni sequedad en Alaska.

La semana pasada, las lluvias volvieron a ser irregulares en todo el archipiélago. El informe del Monitor de Sequía de la semana pasada se mantiene prácticamente sin cambios esta semana, salvo en tres áreas donde la sequía se intensificó: la zona montañosa de Maui (a D2), el noreste de Maui (a D1) y parte del sureste de la Isla Grande (a D2). Esta última región es climáticamente húmeda, y en algunas localidades se registraron solo dos tercios de la precipitación normal para el período comprendido entre enero y finales de octubre, lo que equivale a casi un metro por debajo de lo normal.

La República de Palaos recibió más de 76 mm de lluvia en el Aeropuerto Internacional de Palaos, mientras que Koror COOP, que había recibido abundantes precipitaciones en semanas anteriores, solo registró 14,7 mm. El suministro de agua deberá ser suficiente, ya que estas

necesitan 50 mm semanales para cubrir sus necesidades mnimas.

Las Islas Marianas recibieron abundantes lluvias en la mayora de las localidades. Guam registr 54 mm (2,13 pulgadas), mientras que Saipn recibí entre 44 y 88 mm (1,72 y 3,45 pulgadas) en las tres localidades que reportaron datos. Rota report apenas 22 mm (0,88 pulgadas) y ms de 50 mm (2 pulgadas) en semanas anteriores. Estas islas necesitan 25 mm (una pulgada) semanales para cubrir sus necesidades mnimas de agua.

La mayora de las localidades de los Estados Federados de Micronesia recibieron al menos dos pulgadas de lluvia. Las excepciones fueron Kapingamarangi, que se mantuvo en el nivel D2, con tan solo 0,45 pulgadas de precipitacin. Pingelap registr apenas 0,04 pulgadas de lluvia y se cree que tuvo problemas con el pluviometro, ya que la isla no sufri escasez de lluvia. Algunas de las mayores precipitaciones se registraron en Pohnpei y Woleai, con 6,39 y 4,99 pulgadas, respectivamente.

Todas las localidades de las Islas Marshall recibieron al menos 2 pulgadas de precipitacin esta semana o la anterior, por lo que el suministro de agua debera ser suficiente.

Samoa Americana se mantuvo libre de sequa. Pago Pago y Siufaga Ridge recibieron 9,5 cm y 6,2 cm de lluvia, respectivamente. Toa Ridge recibí 2,5 cm y casi 15 cm la semana anterior.

Mirando hacia el futuro

Durante los prximos 5 das (del 30 de octubre al 3 de noviembre), se esperan pocas o ninguna precipitacin en gran parte de los 48 estados contiguos, especialmente en la mayora de las reas desde los Apalaches hasta la costa del Pacfico. Se pronostican precipitaciones de ligeras a moderadas para la mayor parte del interior de Nueva Inglaterra, los Apalaches centrales y meridionales, la cordillera de las Cascadas y la costa de Oregón, las zonas de mayor altitud del oeste intermontano, gran parte de la pennsula de Florida y algunas zonas de la llanura costera del Atlntico Sur. Se anticipan precipitaciones ms intensas, superiores a 38 mm (1,5 pulgadas), en la cordillera de las Cascadas y la costa de Washington, en puntos aislados cerca de la costa central y occidental del Golfo de Mxico, gran parte del valle medio y superior del ro Ohio, la mayor parte de una amplia franja desde Maryland hasta Nueva York y los Cayos de Florida. Se pronostica que las temperaturas mximas diarias estarn entre 11 y 22 C (2 y 4 F) por debajo de lo normal en el sureste y cerca de lo normal en el noreste y el valle del Bajo Misisipi. Se espera un calor inusual con mximas diarias de 22 C (4 F). Se esperan temperaturas de 10 F o ms por encima de lo normal en las Grandes Llanuras del norte y en la mayor parte del territorio desde las Altas Llanuras hasta la costa del Pacfico, con excepcin del noroeste del Pacfico. Las temperaturas mximas diarias promedio podran alcanzar entre 10 y 14 F por encima de lo normal en la Gran Cuenca oriental y en las Montaas Rocosas centrales y del norte.

Entre el 4 y el 8 de noviembre, se esperan nuevamente precipitaciones superiores a lo normal en el noroeste del Pacfico, extendindose al norte de la regin intermontaosa del oeste, la Gran Cuenca occidental y el centro y norte de California. La probabilidad de precipitaciones supera el 50 % desde el noroeste de California hasta el centro y oeste de Washington y Oregón. En otras regiones, se prevn precipitaciones ligeramente en gran parte del Atlntico Sur, el centro-sur y sureste de Alaska, y algunas zonas del norte de Alaska. Mientras tanto, en la mayor parte

una amplia franja que abarca desde las Montañas Rocosas hasta los Apalaches, hay una mayor probabilidad de condiciones más secas de lo normal, con más del 50 % de probabilidad en Nuevo México y la mitad occidental de Texas. También se prevén precipitaciones inferiores a lo normal en casi toda la región, excepto en el extremo oriental de la Isla Grande de Hawái. Se prevén temperaturas superiores a lo normal desde los Grandes Lagos y el bajo valle del río Ohio hasta la mayor parte del valle del Misisipi y la costa del Pacífico. La mayor probabilidad de temperaturas superiores a lo normal también se extiende al sur de Florida, el centro-sur y este de Alaska y Hawái. La mayoría de las zonas ubicadas sobre y cerca de las Montañas Rocosas centrales tienen más del 80% de probabilidades de experimentar temperaturas cálidas. Solo se prevén temperaturas inferiores a lo normal en Nueva Inglaterra y la zona adyacente de Nueva York. En otras áreas, lo más probable es que se registren temperaturas cercanas a lo normal.

Autor(s)

Richard Tinker, NOAA/NWS/NCEP/CPC

Denise Gutzmer, National Drought Mitigation Center