

Resumen nacional de sequía para 4 noviembre, 2025

Resumen

Las fuertes precipitaciones volvieron a azotar el noroeste del Pacífico, especialmente en la mitad norte de la cordillera de las Cascadas y a lo largo de la costa de Washington y el norte de Oregón. Cayeron entre 6 y 10 pulgadas de precipitación en la mayor parte del extremo noroeste de Washington, y entre 6 y 8 pulgadas en la mayor parte de la zona norte de las Cascadas de Washington y en algunas áreas cercanas a la frontera entre Washington y Oregón, así como a lo largo de la costa noroeste de Oregón. Desde el centro de Oregón hacia el norte, cayeron más de 3 pulgadas en las Cascadas y las zonas costeras, mientras que en otras localidades, desde las estribaciones de las Cascadas hasta el océano Pacífico, se registraron entre 1.5 y 3.0 pulgadas. Más al este, se observaron precipitaciones localmente intensas (de 1 a casi 4 pulgadas) en el noroeste de Montana y el norte de Idaho. Otras zonas, desde las Grandes Llanuras hacia el oeste hasta el océano Pacífico, fueron mucho más secas, con la mayoría de las localidades sin registrar precipitaciones medibles. En la mitad oriental del país, cayeron precipitaciones de moderadas a intensas (de 1 a 4 pulgadas localmente) en la mayor parte del noreste, con las mayores cantidades en el norte de Nueva York y en una franja que se extiende desde el suroeste de Nueva Inglaterra y el área metropolitana de Nueva York hacia el norte, a través del noreste de Nueva York y el estado adyacente de Vermont. Las áreas alrededor de los Outer Banks de Carolina del Norte y el sureste de Virginia también registraron fuertes precipitaciones (de 2 a 4 pulgadas), mientras que las cantidades oscilaron entre 1 y 3 pulgadas en la mayor parte del centro y este de Maine, Nueva Jersey, el centro y este de Pensilvania, partes de la región del Atlántico Medio, y en Kentucky, la mayor parte de Tennessee y los valles adyacentes de Ohio y Mississippi. El lado oeste del valle medio e inferior del Mississippi registró generalmente entre 0.5 y 2.0 pulgadas de precipitación, similar a los totales reportados en el sureste superior, las Carolinas centrales, los Apalaches centrales y el valle superior del Ohio. En contraste, se observaron pocas o ninguna precipitación en la mayor parte del valle inferior del Mississippi, cerca de la costa central y oriental del Golfo de México, en la región del Atlántico Sur, desde Carolina del Sur hasta el sur de Florida, y en la región de los Grandes Lagos y las zonas adyacentes del Medio Oeste.

Estas condiciones propiciaron mejoras generalizadas en el noreste, la región del Atlántico Medio, la mayor parte de las Carolinas, los Apalaches centrales y meridionales, el valle del Ohio, partes del valle medio del Misisipi y el valle inferior adyacente, algunas zonas de las Montañas Rocosas centrales y septentrionales y el sur de California, y partes del noroeste del Pacífico, donde las fuertes precipitaciones no aliviaron la escasez de humedad tanto como cabría esperar debido al rápido aumento de los niveles normales de precipitación en esta época del año. Mientras tanto, tras las beneficiosas precipitaciones de la semana anterior, los bajos niveles de precipitación de la semana pasada provocaron una intensificación o reintensificación de la sequía en gran parte de Texas, el sur de Oklahoma, la región de los Grandes Lagos del norte, partes de las Grandes Llanuras del norte, zonas de las Grandes Llanuras centrales, el centro-norte de Montana y el centro de Maui. También se observó un empeoramiento de la situación en algunas zonas desde el sur de Carolina del Sur hasta el sur de Florida y en partes del Piedmont de Virginia.

Noreste

Gracias a las precipitaciones moderadas a intensas que se extendieron por la mayor parte de la región noreste, muchas zonas experimentaron una mejora en el mapa del Monitor de Sequa. Aun así, la sequa y la escasez de agua continuaron afectando una extensión inusualmente grande de la región. Algn grado de sequa (D0+) cubrió el 85,5 por ciento de la región, una disminución con respecto al 93,4 por ciento de la semana anterior y el nivel más bajo desde mediados de septiembre (81,1 por ciento). Las condiciones de sequa (D1+) se redujeron hasta cubrir el 54,5 por ciento de la región, frente al 65,3 por ciento de la semana anterior. Y la cobertura de sequa severa a excepcional (D2+) disminuyó al 23,0 por ciento, en comparación con el 34,3 por ciento de la semana anterior, siendo también el nivel más bajo desde mediados de septiembre (22,5 por ciento).

Sureste

Se registraron lluvias de moderadas a intensas (de 0,5 a más de 3 pulgadas en algunas zonas) desde Virginia hacia el sur, a través del centro de las Carolinas, los Apalaches y el norte de Alabama. Desde las zonas centrales de las Carolinas, Georgia y Alabama hacia el sur, hasta Florida, solo cayeron unas pocas décimas de pulgada, o incluso nada, y la mayoría de las localidades no registraron precipitaciones medibles. Como era de esperar, esto resultó en una mejora sustancial en amplias zonas de Virginia y Carolina del Norte, mientras que en las áreas más al sur, especialmente en el sur de Georgia y Florida, las condiciones persistieron o empeoraron. Con el aumento de la cobertura de sequa D3, que abarca gran parte del sur de Georgia, la superficie afectada por sequa extrema o excepcional (D3-D4) en este estado aumentó al 12,7 por ciento, la cifra más alta en más de 6 años (16,1 por ciento a mediados de octubre de 2019). Sin embargo, en la región en su conjunto, se observaron mejoras en áreas que deterioros, a pesar de que la mayor parte de las mejoras se concentraron en dos estados (Virginia y Carolina del Norte). Algn grado de sequedad (D0+) afectó al 75,5 por ciento de la región, una disminución con respecto al 81,7 por ciento de la semana anterior. La cobertura de sequa (D1+) disminuyó del 54,6 al 48,9 por ciento, la primera vez en 3 semanas que la cobertura de sequa cae por debajo del 50 por ciento.

Sur

La semana pasada, lluvias de moderadas a intensas (de 25 a 75 mm) cayeron sobre Tennessee, partes de Arkansas y algunas zonas adyacentes. Como resultado, la sequa en el oeste de Tennessee y gran parte de Arkansas disminuyó ligeramente. La mayoría de las demás localidades de Tennessee, Arkansas, el este de Oklahoma y el norte de Mississippi registraron varias décimas de pulgada de lluvia, y cantidades similares cayeron en zonas aisladas del sur de Mississippi, Luisiana y la costa de Texas. El resto de la región, incluyendo la mayor parte de Texas y Oklahoma, no registró precipitaciones significativas. Tras las beneficiosas lluvias de la semana anterior, la ausencia de precipitaciones esta semana permitió que la sequa se intensificara o se extendiera por grandes zonas de Texas y el sur de Oklahoma. Después de

que la superficie afectada por la sequa (D1+) se redujera a aproximadamente un tercio del estado la semana anterior, esta semana aumentó más del 45%, el mayor porcentaje desde principios de mayo. En las últimas semanas se han reportado zonas con estrés hídrico en los cultivos de final de temporada y algunas pérdidas de cosechas en Oklahoma y Texas.

Medio Oeste

Lluvias de moderadas a localmente intensas (de 3,8 a 7,6 centímetros) cayeron sobre gran parte de Kentucky y el noreste de Ohio, aunque las cantidades fueron considerablemente menores en la mayoría de las localidades. Se registraron precipitaciones de 2,5 centímetros o un poco más cerca del río Ohio y en el centro de Ohio, mientras que en el sur de Illinois e Indiana, en una franja que se extiende desde Misuri hacia el norte a través del interior de Minnesota, y en la región norte de los Grandes Lagos, se observaron algunas décimas de centímetro a poco más de 2,5 centímetros. En el resto de la región de los Grandes Lagos, el este de Minnesota, las zonas central y norte de Indiana e Illinois, y el noroeste de Ohio, se registraron pocas o ninguna precipitación. Como era de esperar, este patrón de precipitaciones resultó en una mejora continua cerca del río Ohio y en la mayor parte de Ohio, mientras que la semana seca provocó la persistencia o intensificación de la sequa en la franja norte y central de la región. En particular, el aumento de los déficits de precipitación de 60 y 90 días provocó una expansión significativa de la sequa moderada (D1) en el centro-sur de la península superior de Michigan, el norte de Wisconsin y el centro-este de Minnesota. Como resultado, aunque la cobertura de algún grado de sequedad o sequa (D0+) disminuyó del 68,8 al 65,1 por ciento la semana pasada, la cobertura de sequa (D1+) aumentó ligeramente del 33,4 al 34,8 por ciento.

Altas Llanuras

La región de las Grandes Llanuras es actualmente la menos afectada por la sequa, a pesar de que la superficie afectada aumentó ligeramente la semana pasada, cuando la mayor parte de la región registró apenas unas décimas de pulgada de precipitación. Las precipitaciones cuantificables se limitaron al este de Kansas y al sureste de Nebraska. La semana seca provocó cierto deterioro en algunas zonas, pero aun así, menos del 39 por ciento de la región experimenta algún grado de sequa (D0+), y solo el 17,8 por ciento sufre sequa severa (D1+). Los déficits de precipitación aumentaron en la mayor parte de la región, pero las zonas afectadas por el deterioro fueron relativamente limitadas, dada la baja demanda de agua, tanto natural como humana, en esta época del año.

Oeste

Varias pulgadas de precipitación azotaron las secciones central y norte de las Cascadas y la costa del noroeste del Pacífico, y se registraron totales de 1 a 3 pulgadas en el noroeste de Montana y el norte de Idaho, así como en las zonas bajas del noroeste del Pacífico entre la costa y las Cascadas. Se reportaron varias décimas de pulgada de precipitación más al sur, a lo largo de la costa oeste y en las zonas bajas del norte de la región intermontañosa occidental, pero la mayor parte de la región occidental no recibió precipitaciones medibles durante la

semana. Esto provocó áreas de intensificación en el centro-norte de Montana y el sureste de Nuevo México, mientras que las fuertes precipitaciones generaron mejoras en el noroeste del Pacífico. Sin embargo, dado lo temprano que es en la temporada de lluvias y que los niveles normales están aumentando con bastante rapidez, la mejora en la sequedad y la sequía no fue tan generalizada como cabría esperar. La cobertura de sequía (D1+) en Washington se mantuvo sin cambios con respecto a la semana anterior, en un 94,8 por ciento, y la extensión de las clasificaciones de sequía más intensas (D2-D4) disminuyó solo ligeramente, del 65,1 al 63,9 por ciento. Hubo incluso menos cambios en Oregón, aunque la sequedad allí no está tan extendida como en Washington. Montana reportó una intensificación en las partes centro-norte del estado, pero una ligera mejora más al oeste, como fue el caso en los límites de las áreas D3 y D4 en Idaho. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, los caudales de numerosos ríos en el oeste siguen siendo muy bajos. En el río Missouri, en Great Falls, MT, a principios de noviembre, el caudal se observó en 3.620 pies cúbicos por segundo, muy por debajo del promedio para la fecha desde principios de siglo (4.934 pies cúbicos por segundo, con un rango de 3.880 en 2021 a 6.470 en 2010). En el río Firehole, cerca de West Yellowstone, MT, el caudal fue de 212 pies cúbicos por segundo a principios de noviembre, por debajo del promedio de 272 para fechas similares entre 2002 y 2024, que osciló entre 236 en 2022 y 318 en 2008. Estas cantidades han aumentado ligeramente desde finales del verano. A finales de agosto, una medición de campo de 193 pies cúbicos por segundo solo fue superada por la de 192 pies cúbicos por segundo registrada a principios de agosto de 2016.

Caribe

En Puerto Rico, la sequía anormal (D0) se mantuvo sin cambios con respecto a la semana pasada, tras algunas lluvias ligeras a moderadas y dispersas.

Las Islas Vírgenes de Estados Unidos se mantuvieron libres de sequía y sequedad anormal esta semana. En Windswept Beach, en St. John, se registraron 0,8 pulgadas de lluvia. En St. Thomas, las cantidades de lluvia reportadas por los observadores de CoCoRaHS fueron de aproximadamente media pulgada o menos. En St. Croix se registraron mayores cantidades de lluvia, con muchos observadores reportando más de 1 pulgada.

Pacífico

Actualmente no hay sequía ni escasez de agua en Alaska.

Las precipitaciones fueron escasas en todo el archipiélago la semana pasada, lo que mantuvo la importante escasez de humedad en gran parte del estado. La sequía persiste en la mayor parte del estado, aunque se observó un ligero empeoramiento en algunas zonas del centro y norte de Maui. Mahi Pono, una empresa agrícola con una gran superficie de cultivo en el centro de Maui, al oeste de Upcountry, tiene prohibido el uso de agua superficial para sus operaciones agrícolas desde finales de agosto, dependiendo en su lugar del bombeo de agua subterránea. Kahului, en el centro-norte de Maui, ha registrado solo 0,18 pulgadas de lluvia desde principios de septiembre, en comparación con un promedio de casi 1,5 pulgadas. Desde principios de año, cayeron 6,75 pulgadas de lluvia en Kahului, apenas el 57% de lo normal (11,8

pulgadas). El arroyo Honopou, cerca de Huelo, en Maui, ha registrado caudales entre el 5% ms bajo de los registros durante la mitad de los das de este ao. Por estas razones, se declar sequa extrema (D3) en parte del centro de Maui, mientras que la sequa moderada (D2) se extendi al norte de Maui, al noreste de Upcountry. Ms al este, en la Isla Grande, las precipitaciones inusualmente bajas han persistido durante muchos meses. Desde el 1 de septiembre, Hilo ha registrado 11,58 pulgadas de lluvia, 9,15 pulgadas por debajo de lo normal; y desde el 1 de enero, las 46,96 pulgadas registradas representan menos de la mitad de lo normal (95,72 pulgadas). Honolulu tambin registra menos de la mitad de las precipitaciones normales desde principios de septiembre. Lihue ha tenido ms lluvia de lo normal desde el 1 de septiembre, pero las cifras acumuladas del ao siguen muy por debajo de lo normal (19,01 pulgadas, en comparacin con un promedio de 28,04 pulgadas). La mayora de las localidades del archipilago registran caudales de arroyos por debajo o muy por debajo de lo normal.

En Pago Pago, han cado al menos 2,79 pulgadas de lluvia esta semana, si bien faltan datos de cuatro das para completar el anlisis. En Toa Ridge, se registraron 2,21 pulgadas de lluvia esta semana, mientras que no se dispone de datos recientes sobre precipitaciones en Siufaga Ridge. Samoa Americana se mantuvo libre de sequa y sequedad anormal esta semana.

Esta semana no se dispona de datos en Palaos, por lo que no se realiz ninguna representacin del USDM en esa zona.

Las Islas Marianas se mantuvieron libres de sequa o sequedad anormal esta semana. Las cantidades de lluvia registradas esta semana incluyeron 1,59 pulgadas en Guam, 2,6 pulgadas en Rota, 1,68 pulgadas en Tinian y 1,84 pulgadas en Saipan.

La sequa severa a corto plazo continu esta semana en Kapingamarangi. Las precipitaciones totalizaron 2.23 pulgadas esta semana, lo que puso fin a un largo periodo de semanas consecutivas con menos de 2 pulgadas de lluvia. Se inform de vegetacin amarillenta en la isla. Debido a la falta de datos, Fananu, Ulithi y Pingelap no recibieron la designacin del USDM (Monitor de Sequa de Estados Unidos). Todas las dems islas de los Estados Federados de Micronesia permanecieron libres de sequa o sequedad anormal. Yap registr 2.52 pulgadas de lluvia con cuatro das de datos faltantes. Woleai registr 4.7 pulgadas de lluvia, tambin con cuatro das de datos faltantes. Chuuk registr 4.77 pulgadas de lluvia con un da de datos faltantes. Lukunor registr 3.97 pulgadas de lluvia con dos das de datos faltantes. Nukuoro registr 3.48 pulgadas de lluvia con un da de datos faltantes. Pohnpei registr 3.18 pulgadas de lluvia con un da de datos faltantes. Kosrae registr 4.75 pulgadas de lluvia.

La Repblica de las Islas Marshall se mantuvo libre de sequa o sequedad anormal esta semana. En Kwajalein se registraron 5,79 pulgadas de lluvia, con un da sin datos. En Ailinglapalap se registraron 2,65 pulgadas de lluvia, con dos das sin datos. En Jaluit, se registraron 1,51 pulgadas de lluvia, tras las ms de 7 pulgadas de la semana anterior. En Majuro, se registraron 2,35 pulgadas de lluvia. En Utirik, Wotje y Mili, las precipitaciones fueron menores a principios de noviembre, aunque las lluvias recientes fueron en general suficientes, por lo que no se ha desarrollado ninguna sequedad anormal. En Utirik, dado que en octubre se registraron poco menos de 8 pulgadas de lluvia, se realizar un seguimiento de cualquier posible sequedad que pueda presentarse.

Mirando hacia el futuro

Durante los próximos 5 días (hasta el 10 de noviembre), se espera que el noroeste del Pacífico permanezca relativamente húmedo. Se prevén entre 3 y 6 pulgadas de lluvia en partes de las Cascadas de Washington y el norte de Oregón, y en el extremo noroeste de Washington. Generalmente, se pronostican entre 2 y 3 pulgadas en el resto de las Cascadas centrales y septentrionales, la mayor parte de la costa de Washington y las zonas costeras del noroeste de Oregón y el noroeste de California. En otras zonas, se anticipan precipitaciones moderadas a localmente intensas (de 1 a 2 pulgadas) en las áreas restantes desde el norte de California hasta la frontera con Canadá. Esto incluye gran parte de las Montañas Rocosas del norte, el sur de Michigan, la zona al sudeste del lago Erie, el norte del estado de Nueva York y partes de Nueva Inglaterra. Se prevén acumulaciones de lluvia que oscilan entre unas pocas décimas de pulgada y aproximadamente una pulgada en el norte de la región Intermontánea, las elevaciones más altas del oeste de Wyoming, zonas aisladas de las Grandes Llanuras del norte, partes del Medio Oeste, la mitad este de los Grandes Lagos, la mayor parte de los Apalaches, el valle medio y superior del río Ohio, los estados de la costa central del Golfo de México, gran parte del noreste y el sureste de Florida. Se espera que otras zonas reciban, como máximo, unas pocas décimas de pulgada, con poca o ninguna precipitación en la llanura costera del Atlántico Sur, la mayor parte del interior de Florida, el valle inferior del río Mississippi y desde las Grandes Llanuras centrales y meridionales hacia el oeste hasta California. Se pronostica que las temperaturas promedio serán más cálidas de lo normal en el oeste y más frías de lo normal en el este. Una masa de aire frío, la más fría de la temporada hasta el momento, se desplazará por el este a principios de la próxima semana. No persistirá por mucho tiempo, pero durante una o dos noches las temperaturas podrán acercarse al punto de congelación tan al sur como la costa central del Golfo de México, y las temperaturas en los 50 grados Fahrenheit podrán llegar hasta el sur de la península de Florida. En general, durante los 5 días, se espera que las temperaturas máximas promedio sean de 5 a 8 grados Fahrenheit por debajo de lo normal desde los Grandes Lagos y el Medio Oeste hacia el sureste hasta el norte de Florida. En contraste, se espera que las temperaturas máximas diarias desde las Grandes Llanuras hasta la costa del Pacífico promedien de 5 a 12 grados Fahrenheit por encima de lo normal, con las mayores desviaciones previstas en partes de la Gran Cuenca, cerca de la frontera entre California y Oregón, y en las Montañas Rocosas más septentrionales.

El pronóstico a 6-10 días del Centro de Predicción Climática para el período del 11 al 15 de noviembre prevé precipitaciones inferiores a lo normal en la mayor parte del área que se extiende desde las Grandes Llanuras hasta la costa atlántica, excepto en la franja norte de la región. La probabilidad de sequía inusual supera el 50 por ciento desde los valles del bajo Mississippi y Ohio hacia el este, a través de los estados del Atlántico Sur, excluyendo el sur de Florida. Se prevén condiciones más húmedas de lo normal desde las Grandes Llanuras hasta la costa del Pacífico, con una probabilidad de precipitaciones inusualmente intensas superior al 60 por ciento en el centro y suroeste de California. También se prevén condiciones algo más húmedas de lo normal en Hawái y en la mayor parte de Alaska. Se espera que las temperaturas se siten por debajo del promedio en el este, desde la región de los Grandes Lagos, el valle medio del Ohio y la costa central del Golfo, hacia el este hasta la costa atlántica. La

probabilidad de temperaturas inferiores a lo normal supera el 70 por ciento desde el norte de Florida hacia el norte, a lo largo de la llanura costera, hasta el sur de Nueva Inglaterra. Desde aproximadamente el río Mississippi hasta la costa del Pacífico, se prevén temperaturas superiores a lo normal, con una probabilidad superior al 70 por ciento en una amplia zona que abarca la mayor parte de las Montañas Rocosas centrales y meridionales y las Grandes Llanuras. También se esperan temperaturas cálidas en la mayor parte de Alaska y en Hawái.

Autor(s)

Richard Tinker, NOAA/NWS/NCEP/CPC

Curtis Riganti, National Drought Mitigation Center