

# **Resumen nacional de sequía para 11 noviembre, 2025**

## **Resumen**

Esta semana predominó el tiempo seco en las Grandes Llanuras, Minnesota y Wisconsin, el centro-sur de Estados Unidos y el suroeste. La mitad norte de California, el oeste de Oregón, el oeste de Washington, el norte de Idaho y el noroeste de Montana recibieron precipitaciones de moderadas a intensas. Desde el norte de California hacia el noroeste del Pacífico, las acumulaciones superaron localmente los 76 mm (3 pulgadas). En el noreste y en algunas zonas de la región de los Grandes Lagos se registraron precipitaciones localmente mayores, incluyendo fuertes nevadas por efecto lacustre en el centro-norte y noroeste de Indiana. En el sureste se registraron lluvias dispersas de más de 13 mm (media pulgada), pero la mayor parte de la región tuvo una semana seca. El tiempo más seco en partes de las Grandes Llanuras y el centro-sur de Estados Unidos provocó un deterioro generalizado, especialmente en Texas, Oklahoma y Luisiana. Las intensas precipitaciones en Oregón e Idaho propiciaron mejoras en ambos estados. En Montana, el tiempo fue desigual: mejor en el oeste, pero empeoró en el centro-norte, lo que prolongó la reciente sequía. El tiempo mayormente seco en el sureste provocó un deterioro en Florida, el sur de Georgia y algunas zonas de Virginia. En el noreste de Illinois, el noroeste de Indiana, Ohio, Virginia Occidental y gran parte de Nueva Inglaterra, se observaron mejoras tras las recientes precipitaciones.

## **Noreste**

Esta semana cayeron más de 25 mm de precipitación en gran parte del estado de Nueva York y el norte de Nueva Inglaterra, con algunas zonas que superaron los 50 mm. Como resultado, mejoraron los déficits de precipitación a corto plazo, lo que conllevó una mejora generalizada de la sequía y la sequía anormal que afectaban a estas áreas. En el noroeste de Maine, las precipitaciones fueron menores y los déficits a corto plazo aumentaron; como consecuencia, la sequía severa se extendió en la zona. En el centro y sur de Virginia Occidental, las recientes precipitaciones ayudaron a mejorar el caudal de los ríos y a paliar los déficits de precipitación, y la gravedad de la sequía disminuyó. Las temperaturas en Pensilvania, Nueva Jersey y Maryland fueron, en general, entre 2 y 6 grados más cálidas de lo normal, mientras que en el resto del noreste se mantuvieron, en su mayoría, dentro de los 2 grados de lo normal.

## **Sureste**

Las temperaturas en el sureste estuvieron mayormente por encima de lo normal esta semana, y en muchas localidades la semana terminó entre 2 y 6 grados más cálida de lo habitual. La mayoría de las zonas finalizaron la semana con menos de media pulgada de precipitación, con algunas excepciones locales. El clima seco y cálido de esta semana provocó un empeoramiento de la humedad del suelo y déficits de precipitación a corto plazo en el sur de Georgia y el Panhandle de Florida, donde se extendió la sequía moderada, severa y extrema. La sequía moderada también se extendió cerca de la Bahía de Tampa, donde aumentaron los déficits de humedad del suelo y precipitación y disminuyó el caudal de los arroyos. Los niveles de caudal se mantuvieron bajos en el centro-sur de Virginia, donde también aumentaron los déficits de

precipitación a corto plazo y se extendió la sequía moderada. Más al oeste, la sequía moderada mejoró en el suroeste de Virginia, donde la humedad del suelo y el caudal de los arroyos mejoraron tras las recientes lluvias.

## **Sur**

Esta semana se registraron temperaturas superiores a lo normal en la mayor parte del sur de Estados Unidos. Las temperaturas en Texas y Oklahoma fueron especialmente altas, y muchas zonas de estos estados terminaron la semana entre 4 y 8 grados por encima de lo normal. En algunas partes del suroeste de Texas, las temperaturas fueron aún más elevadas, llegando a superar los 10 grados por encima de lo normal en algunos puntos. La mayor parte del sur permaneció seca esta semana, aunque algunas zonas del centro y este de Tennessee recibieron más de media pulgada de precipitación. La sequía y la sequía anormales se extendieron desde la mitad sur de Oklahoma hasta el suroeste de Arkansas, y desde el centro y este de Texas hasta partes de Luisiana. Los impactos de la sequía a corto plazo fueron el tema principal en el sur de Oklahoma, donde el déficit de precipitación aumentó, la humedad del suelo y los niveles de los estanques disminuyeron y la vegetación se vio afectada. El caudal de los arroyos se vio comprometido en algunas zonas del centro y sur de Texas, mientras que los niveles de humedad del suelo también disminuyeron en el sur de Texas debido a una demanda evaporativa inusualmente alta para esta época del año. El déficit de precipitación a corto plazo también provocó cierta degradación en zonas de sequía anormal y sequía moderada y severa en Luisiana.

## **Medio Oeste**

Las precipitaciones variaron en todo el Medio Oeste esta semana. Se registraron nevadas más intensas debido al efecto lago en el norte de Indiana, el noreste de Illinois, el suroeste de la península inferior de Michigan y partes de la península superior de Michigan. En gran parte de Ohio y el centro y este de Kentucky cayeron más de 12 mm de precipitación. Las temperaturas oscilaron entre 1 y 4 grados por debajo de lo normal en el noreste de Wisconsin y Michigan, y entre 2 y 6 grados por encima de lo normal en el sur de Missouri y el oeste de Kentucky. En el resto de la región, las temperaturas fueron variables, aunque la mayoría de las zonas se mantuvieron dentro de los 4 grados de lo normal. Las precipitaciones más intensas registradas recientemente en el centro-norte de Ohio propiciaron mejoras en el caudal de los ríos y en los déficits de precipitación a corto plazo. Las fuertes nevadas en el noroeste de Indiana y el noreste de Illinois mejoraron la humedad del suelo y los déficits de precipitación, así como la sequía y la aridez anormal. Más al sur, en el centro-este de Illinois, la sequía severa y extrema se extendió, provocando una disminución del caudal de los ríos y un agravamiento de los déficits de precipitación a corto plazo. Los déficits de precipitación a corto plazo aumentaron en el centro-sur y suroeste de Wisconsin, donde también se extendieron la aridez anormal y la sequía moderada. La sequía moderada también se extendió en el norte de la Península Inferior de Michigan, donde el déficit de precipitaciones a corto plazo aumentó junto con la disminución de la humedad del suelo. La sequía moderada se extendió en algunas zonas del sureste de Missouri, donde el clima seco reciente agravó el déficit de precipitaciones a corto plazo en un contexto de baja

humedad del suelo y escasos niveles de caudal de los ros.

## **Altas Llanuras**

Las temperaturas en el extremo oriental de las Grandes Llanuras se mantuvieron en su mayoría dentro de un par de grados de lo normal, debido a que un fuerte frente frío se desplazó hacia el centro de Estados Unidos cerca del final del período. En general, la mayor parte de la región experimentó temperaturas superiores a lo normal, especialmente el oeste de Nebraska y las zonas centro y oeste de Colorado y Wyoming, donde esta semana fueron comunes temperaturas de entre 4 y 8 grados por encima de lo normal. Se registraron algunas precipitaciones, generalmente inferiores a media pulgada de equivalente líquido, desde el centro de Dakota del Sur hasta el noreste de Nebraska. También se registraron precipitaciones superiores a media pulgada en el noroeste de Wyoming, en las cercanías del Parque Nacional de Yellowstone, y en una sección de las Black Hills de Dakota del Sur. En el resto de la región, predominó el tiempo seco. El déficit de precipitaciones a corto plazo aumentó en partes del este de Nebraska, donde la sequía anormal se extendió al norte y noroeste de Lincoln. Partes del oeste de Nebraska y las zonas adyacentes del sureste de Wyoming y Colorado también continuaron secas, y la sequía anormal y algunos casos de sequía moderada se agravaron en estas áreas. En el centro-sur de Colorado, la degradación localizada también se debió, en parte, a los efectos del déficit de precipitaciones a largo plazo.

## **Oeste**

Las temperaturas estuvieron por encima de lo normal en toda la región. El sureste de California, Nevada, Utah y el sur de Nuevo México fueron, en general, las zonas más cálidas en comparación con lo normal, con muchas localidades en estas áreas finalizando la semana entre 6 y 10 grados por encima de lo habitual. Partes del noroeste de Estados Unidos registraron precipitaciones de moderadas a intensas esta semana, mientras que la mayor parte del área desde el centro de California hacia el sur y el este permaneció seca. Gran parte del noroeste de Montana y el norte de Idaho recibieron entre 12 y 50 mm de precipitación esta semana. El este de Washington recibió mayormente más de 12 mm de precipitación, mientras que el oeste de Washington, el oeste de Oregón y el centro-norte y noroeste de California recibieron cantidades mayores, que oscilaron entre 50 y, localmente, más de 125 mm de precipitación. Las recientes precipitaciones contribuyeron a mejorar el caudal de los ríos y a paliar el déficit de precipitaciones en gran parte de Idaho, lo que conllevó una mejora generalizada de las condiciones de sequía. La sequía severa también mejoró en gran parte del oeste de Montana como resultado de las recientes precipitaciones. La sequía severa también desapareció en el noroeste de Oregón después de que las recientes precipitaciones intensas mejoraran los niveles de caudal de los ríos y redujeran el déficit de precipitaciones a corto y largo plazo. En el centro-norte de Montana, las condiciones de sequía empeoraron debido a que el clima se mantuvo mayormente seco, lo que provocó mayores déficits de precipitación a corto plazo y bajos niveles de caudal de los arroyos.

## **Caribe**

Esta semana, las precipitaciones en Puerto Rico fueron generalmente inferiores a lo normal en las zonas centro y este de la isla, mientras que en algunas reas cercanas a la costa oeste se registraron precipitaciones de una pulgada o ms por encima del promedio. Las temperaturas en el este de Puerto Rico fueron mayormente de 1 a 3 grados superiores a lo normal. Persisti una sequa anormal en algunas zonas del sureste de la isla.

Las Islas Vrgenes de los Estados Unidos no sufrieron sequa esta semana. En Windswept Beach, en St. John, se registraron tan solo 0,23 pulgadas de lluvia, mientras que los observadores de CoCoRaHS reportaron 0,59 y 0,32 pulgadas en otras zonas de la isla. En St. Thomas, las precipitaciones reportadas por los observadores de CoCoRaHS fueron de aproximadamente una pulgada o menos. En St. Croix, los informes de los observadores mostraron precipitaciones que variaron entre 0,14 y 0,62 pulgadas en toda la isla, con un promedio de 0,45 pulgadas.

## **Pacífico**

Alaska se mantuvo libre de sequa y sequedad anormal esta semana. Las anomalas semanales en las precipitaciones variaron ampliamente en todo el estado, aunque, en general, el sureste y el centro-este de Alaska registraron precipitaciones superiores a lo normal, mientras que el centro y el centro-oeste tendieron a ser ms secos de lo normal. Las temperaturas se elevaron entre 5 y 15 grados por encima de lo normal en el centro-norte y el centro-este de Alaska, mientras que tambin fueron comunes, aunque en menor medida, en el sureste de Alaska. Se registraron temperaturas ms fras de lo normal en gran parte del suroeste de Alaska y en las Islas Aleutianas, y algunas zonas de estas reas terminaron la semana con temperaturas entre 5 y 10 grados por debajo de lo normal.

Se observaron algunas mejoras localizadas en las zonas de barlovento de la Isla Grande y el este de Maui, donde las recientes lluvias torrenciales propiciaron una mejora en el caudal de los arroyos. Tambin se registraron lluvias ms intensas esta semana en algunas zonas de barlovento de Molokai y Oahu. Las zonas ms orientales de la Isla Grande presentaron condiciones ms secas de lo normal, y la sequa severa persisti en la regin. Las temperaturas en Hawi se mantuvieron en su mayora dentro de un rango de 1,5 grados respecto a lo normal, aunque en la Isla Grande se registraron valores mayoritariamente superiores a este rango.

En Pago Pago, han cado al menos 51 mm de lluvia esta semana, con tres das sin datos en el anlisis. En Toa Ridge, han cado 57 mm de lluvia esta semana, y en Siufaga Ridge se registraron 3 mm de precipitaciones. Samoa Americana se mantuvo libre de sequa y sequedad anormal esta semana.

En Koror se registraron 2,18 pulgadas de lluvia, con dos das sin datos, por lo que Palau se mantuvo libre de sequa o sequedad anormal esta semana.

Las Islas Marianas no sufrieron sequa ni condiciones climticas extremas esta semana. Las precipitaciones registradas esta semana incluyeron hasta 79 mm en Guam, 43 mm en Rota, 26 mm en Tinian y hasta 63 mm en Saipn.

La sequa severa de corta duracin continu esta semana en Kapingamarangi. Si bien se registraron precipitaciones beneficiosas esta semana, el total ascendi a 33,5 mm (1,32 pulgadas), pero fue inferior a los 50,8 mm (2 pulgadas) semanales necesarios para satisfacer la demanda hdrica. Se report amarilleamiento de la vegetacin en la isla. Debido a la falta de datos, Fananu, Ulithi y Pingelap no recibieron la designacin USDM. El resto de las islas de los Estados Federados de Micronesia permanecieron libres de sequa o sequedad anormal. Yap registr 102,6 mm (4,04 pulgadas) de lluvia, con dos das de datos faltantes. Woleai registr 152,4 mm (5,99 pulgadas) de lluvia, tambin con un da de datos faltante. Chuuk registr 35,8 mm (1,41 pulgadas) de lluvia, con dos das de datos faltantes. Lukunor registr 60,2 mm (2,37 pulgadas) de lluvia, con cinco das de datos faltantes. Nukuoro registr 10,4 mm (0,41 pulgadas) de lluvia, con dos das de datos faltantes. Pohnpei registr 51,6 mm (2,03 pulgadas) de lluvia, con dos das de datos faltantes. Kosrae registr 130,8 mm (5,15 pulgadas) de lluvia, con un da de datos faltante.

La Repblica de las Islas Marshall se mantuvo libre de sequa o sequa anormal esta semana. Kwajalein registr 147 mm de lluvia, con un da sin datos. Ailinglapalap registr 60 mm de lluvia, con dos das sin datos. En Jaluit, se registraron 154 mm de lluvia, con un da sin datos. En Majuro, se registraron 92 mm de lluvia, con un da sin datos. En Mili, se registraron 66 mm de lluvia. En Utirik y Wotje, las cantidades de lluvia fueron menores, con 6 mm y 26 mm respectivamente. En Utirik, dado que poco menos de 8

En octubre se registraron pulgadas de lluvia y en noviembre solo se registraron 0,58 pulgadas; se monitorear cualquier sequa que se desarrolle en la zona.

### ***Mirando hacia el futuro***

Desde la noche del 12 de noviembre hasta el 17 de noviembre, el Centro de Prediccin Meteorolgica del Servicio Meteorolgico Nacional (NWS) pronostica fuertes precipitaciones en partes del oeste de Estados Unidos. Se esperan acumulaciones de entre 75 y 125 mm (localmente mayores) en amplias zonas de California, especialmente en las reas costeras del suroeste y partes de Sierra Nevada. Tambin se anticipan fuertes precipitaciones de entre 50 y 125 mm (localmente mayores) en partes del noroeste de Washington y la Pennsula Olmpica. Se pronostican ms de 19 mm de precipitacin en el sureste de California, el sur de Nevada, partes del oeste y centro de Arizona y el suroeste de Utah. Algunas otras localidades podran recibir 25 mm o ms de precipitacin, incluyendo las montaas de San Juan en el suroeste de Colorado y partes del norte de Idaho y el noroeste de Montana. Se pronostica un clima mucho ms seco en la mayor parte del resto de los Estados Unidos continentales durante este periodo, aunque algunas zonas de Nueva York y Nueva Inglaterra podran recibir ms de 12 mm de precipitacin.

Para el periodo del 18 al 22 de noviembre, el Centro de Prediccin Climtica del Servicio Meteorolgico Nacional (NWS) pronostica precipitaciones superiores a lo normal en gran parte de los Estados Unidos continentales, especialmente desde el suroeste hacia el noreste hasta el valle del ro Ohio. Se prev un clima ligeramente ms seco de lo normal en el noreste de Maine, mientras que en la pennsula de Florida es ms probable que se registren precipitaciones cercanas a lo normal. Se esperan temperaturas cercanas a lo normal en Nueva Inglaterra,

mientras que en el resto del territorio, al oeste de la Divisoria Continental, es más probable que se registren temperaturas más frías de lo normal, y al este de la Divisoria Continental, temperaturas superiores a lo normal. La confianza de los pronosticadores en un clima más cálido de lo normal es mayor desde la costa del Golfo de México hacia el norte hasta el Medio Oeste inferior y las Grandes Llanuras del sur, y cerca y al oeste del lago Superior. Se prevén precipitaciones y temperaturas superiores a lo normal en Hawái. En Alaska, también se prevén precipitaciones superiores a lo normal, con las mayores probabilidades en el suroeste del estado. Se esperan temperaturas superiores a lo normal en la mayor parte de Alaska, excepto en el extremo noroeste, donde se esperan temperaturas cercanas a lo normal.

## **Autor(s)**

Curtis Riganti, National Drought Mitigation Center

Lindsay Johnson, National Drought Mitigation Center