

Resumen nacional de sequía para 18 noviembre, 2025

Resumen

El tiempo seco predominó en la mayor parte del centro y este de Estados Unidos esta semana, con algunas áreas localizadas de precipitaciones más intensas en el noreste y partes del este de Dakota del Sur. En el oeste, las fuertes lluvias y nevadas fueron generalizadas, especialmente en partes del sur de Nevada, el sur y la costa de California, Sierra Nevada, el noroeste del Pacífico y el noroeste de Montana. Las temperaturas al oeste del río Mississippi fueron en su mayoría más cálidas de lo normal, especialmente en Montana y Wyoming, donde las temperaturas de 12 grados o más por encima de lo normal fueron comunes. Al este del río Mississippi, las temperaturas cercanas o por debajo de lo normal fueron generalizadas, especialmente en el sur de Georgia y Florida, donde las temperaturas fueron entre 6 y 12 grados más frías de lo normal. Dado el clima más húmedo reciente, las condiciones continuaron mejorando en partes del noreste, donde el caudal de los ríos y la humedad del suelo continuaron recuperándose y los déficits de precipitación disminuyeron. Las mejoras también fueron generalizadas en California y Washington, donde las recientes precipitaciones han reducido o eliminado los déficits de precipitación y han aumentado la humedad del suelo y el caudal de los ríos. El deterioro de las condiciones fue común en Oklahoma, Texas, Luisiana, Florida, Georgia y Carolina del Norte, donde aumentaron los déficits de precipitación a corto plazo. También se produjo un deterioro generalizado en partes de Nebraska, el centro y noreste de Montana y la zona occidental de los Grandes Lagos, ya que la sequía, principalmente a corto plazo, se intensificó en cada una de estas áreas. Algunos episodios recientes de clima más seco o más húmedo de lo normal provocaron pequeños cambios en las áreas de sequía anormal en Puerto Rico. El clima más húmedo en las laderas de barlovento de Hawái provocó mejoras locales en Oahu, Maui y la Isla Grande, donde el caudal de los ríos ha respondido bien al aumento de las precipitaciones.

Noreste

Las precipitaciones continuaron esta semana en el noreste, lo que provocó mejoras localizadas en la sequía y la sequedad anormal. Las lluvias más intensas se registraron en el centro de Nueva York, donde algunas zonas recibieron más de 5 centímetros de precipitación. Al menos 1,2 centímetros de lluvia cayeron en amplias zonas de Nueva York, Nueva Inglaterra y el norte de Pensilvania. Una pequeña área cerca de Allentown, Pensilvania, experimentó un empeoramiento, pasando a sequía moderada debido al aumento del déficit de precipitaciones a corto plazo y a la disminución de la humedad del suelo y el caudal de los ríos. Se observaron mejoras generalizadas en el norte de Nueva Inglaterra, el centro, norte y oeste de Nueva York y algunas partes de Virginia Occidental y el oeste de Pensilvania. En estas zonas, las recientes precipitaciones han mejorado el caudal de los ríos y la humedad del suelo, reduciendo el déficit de precipitaciones. Sin embargo, la humedad del suelo o el déficit de precipitaciones, o

ambos, persisten en muchas reas, por lo que se necesita ms lluvia en toda la regin. Las temperaturas esta semana se mantuvieron en su mayora cerca de lo normal o por debajo de lo normal, con gran parte del norte de Pensilvania y la mayor parte de Nueva York terminando la semana con temperaturas entre 3 y 6 grados Celsius por debajo de lo normal.

Sureste

El tiempo esta semana en el sureste de Estados Unidos fue prcticamente seco, lo que empeor la sequa o la sequedad anormal en muchas zonas. Las temperaturas inferiores a lo normal en toda la regin, especialmente entre 6 y 12 grados por debajo de lo habitual en el sur de Georgia y Florida, junto con la menor incidencia de la luz solar, mantuvieron baja la demanda de evaporacin esta semana. En el sur de Georgia y partes del noroeste de Florida, la sequa extrema se extendi y se desarroll una sequa excepcional donde persistieron importantes dficits de precipitacin a corto plazo, el caudal de los ros se mantuvo bajo y los niveles de humedad del suelo continuaron disminuyendo. Los dficits de precipitacin a corto plazo tambin provocaron un empeoramiento de las condiciones en el centro y oeste de Carolina del Norte y en el centro-sur de Virginia. En la pennsula de Florida, los dficits de precipitacin a corto plazo, los bajos niveles de agua, el escaso caudal de los ros y la baja humedad del suelo en algunas zonas provocaron la expansin de la sequa moderada y severa, as como de la sequedad anormal.

Sur

Esta semana predomin el tiempo seco en casi toda la regin sur, lo que provoc un deterioro generalizado de las condiciones en algunos estados. Se registraron temperaturas superiores a lo normal en partes de Texas y Oklahoma y en algunas localidades de Arkansas, mientras que en otras zonas predominaron temperaturas cercanas o inferiores a lo normal. En el Panhandle de Texas y en el suroeste del estado, las temperaturas superaron en al menos 9 grados lo habitual. Al sur de Oklahoma City, se desarroll una sequa extrema, con la consiguiente desecacin de los estanques, debido a un importante dficit de precipitaciones a corto plazo y una demanda de evaporacin superior a la normal. El deterioro de las condiciones se extendi por gran parte del sur de Oklahoma, donde persistieron los dficits de precipitacin a corto plazo, acompaados de temperaturas superiores a lo normal. La combinacin de dficits de precipitacin a corto y largo plazo y las altas temperaturas provocaron un empeoramiento de las condiciones en el sur de Texas, mientras que tambin se deterioraron en partes del norte de Texas y el Panhandle durante el reciente periodo de sequa y calor. Los dficits de precipitacin a corto plazo tambin aumentaron en gran parte del noreste de Texas, Luisiana, el suroeste de Arkansas y el sur de Misisipi, lo que provoc un empeoramiento de las condiciones. Los niveles de caudal de los ros y la

humedad del suelo también fueron bajos en algunas zonas que empeoraron esta semana.

Medio Oeste

Esta semana, se registraron precipitaciones dispersas en partes del centro y este de Misuri, Illinois, el sur de Indiana, el norte y este de Iowa y el este de la Pennsula Superior de Michigan. Por lo demás, predominó el tiempo seco. En Decatur, Illinois, comenzaron las restricciones de agua de fase uno, y la sequía severa y extrema se extendió en el área circundante a Champaign-Urbana, a medida que se intensificaron nuevamente la escasez de humedad en el suelo y las precipitaciones. Desde el noreste de Iowa hasta la zona occidental de los Grandes Lagos, se desarrollaron o extendieron la sequía moderada y severa y la sequedad anormal. Los déficits de precipitación y de humedad en el suelo a corto plazo fueron especialmente intensos en la región boscosa del norte de Wisconsin, donde se desarrolló una sequía severa y se extendió la sequía moderada. El caudal de los ríos y la humedad del suelo continuaron siendo bajos en medio de crecientes déficits de precipitación en partes de Misuri, donde la sequedad anormal y la sequía moderada y severa se extendieron localmente. La sequía severa ahora cubre toda el área de Kansas City, donde los niveles de humedad del suelo siguen siendo bajos tras un final de verano y un otoño muy secos. Se registraron temperaturas superiores a lo normal en el oeste del Medio Oeste (principalmente a lo largo y al oeste del río Misisipi), mientras que las temperaturas cercanas o inferiores a lo normal fueron más comunes en Indiana, Kentucky, Ohio y la Pennsula Inferior de Michigan.

Altas Llanuras

Esta semana predominó el tiempo seco y más cálido de lo normal en la región de las Grandes Llanuras, con la excepción del centro-este de Dakota del Sur y algunas zonas de gran altitud de Colorado y Wyoming. Las temperaturas en Wyoming y partes del este de Colorado fueron 12 grados o más superiores a lo normal esta semana, mientras que en el este de las Dakotas, Nebraska y Kansas fueron entre 3 y 9 grados más cálidas de lo habitual. La escasez de precipitaciones a corto plazo y la disminución de la humedad del suelo en algunas zonas provocaron la expansión y el desarrollo de sequía anómala y moderada en partes del este y centro de Nebraska. En el oeste de Nebraska, la sequía anómala y moderada se extendió bajo condiciones similares, mientras que también se desarrolló sequía severa donde se registraron déficits de precipitación más importantes a largo plazo. En el área de Kansas City y sus alrededores, la sequía moderada y severa se extendió localmente donde disminuyeron los niveles de humedad del suelo y aumentaron los déficits de precipitación a corto plazo. La sequía anómala se extendió por las llanuras del sureste de Colorado, donde aumentaron los déficits de precipitación a corto plazo, mientras que la sequía moderada se consolidó en el noroeste.

de Colorado, donde la sequa a corto plazo coincidi con dficits de precipitacin a largo plazo.

Oeste

Esta semana se registraron fuertes precipitaciones generalizadas en California, el sur de Nevada, el noroeste del Pacfico, el norte de Idaho y el noroeste de Montana. Localmente, cayeron ms de 125 mm de lluvia en el noroeste de Washington, en algunas zonas del noroeste de Montana y el norte de Idaho, y en diversas partes de California, especialmente en algunas regiones costeras y la Sierra Nevada. Los niveles de humedad del suelo aumentaron en toda California debido a las intensas precipitaciones. Los dficits de precipitacin disminuyeron en muchas reas o desaparecieron por completo, lo que provoc mejoras generalizadas de una categoria en California y mejoras localizadas de dos categorias cerca de Los ngeles. A medida que se evala el impacto de estas precipitaciones en el ciclo del agua en California y Nevada en las prximas semanas, podran producirse nuevas mejoras. Las condiciones tambin mejoraron tras las recientes precipitaciones, que redujeron los dficits de precipitacin y mejoraron localmente la humedad del suelo, las aguas subterrneas y el caudal de los ros en el noroeste de Washington, el centro y este de Washington, el norte de Idaho y el noroeste de Montana, el suroeste de Arizona, el suroeste de Utah y a lo largo de una parte de la frontera entre Utah y Nevada. A pesar de las precipitaciones generalizadas, las anomalas de temperatura semanales fueron clidas en todo el oeste del pas esta semana. En comparacin con lo normal, Montana e Idaho fueron generalmente las zonas ms clidas, con partes de Montana y el sur de Idaho terminando la semana con temperaturas 12 grados o ms superiores a lo normal. En las llanuras del centro y noreste de Montana, la sequa moderada y severa y la sequedad anormal empeoraron rpidamente debido a las temperaturas superiores a lo normal y el clima ms seco. En estas reas, el caudal de los ros disminuy localmente en medio del aumento de la humedad del suelo y los dficits de precipitacin a corto plazo.

Caribe

Las recientes lluvias en algunas zonas del sureste de Puerto Rico redujeron el dficit de precipitaciones y mejoraron los niveles de los pozos, lo que provoc una mejora localizada en las condiciones de sequa. En el centro-norte de Puerto Rico, el tiempo ms seco de esta semana mantuvo las precipitaciones por debajo de lo normal durante el ltimo mes. Como consecuencia, los caudales de los ros disminuyeron y se desarroll una sequa anormal. Las temperaturas en Puerto Rico esta semana fueron en general uno o dos grados superiores a lo normal.

Esta semana, las islas de Santo Toms, Santa Cruz y San Juan experimentaron precipitaciones moderadas, provocadas principalmente por chubascos asociados a los

vientos alisios en lugar de tormentas organizadas. El nivel fretico tambien mostr una tendencia al alza, lo que indica condiciones relativamente ms secas en todas las islas.

En St. Croix, la mayora de las estaciones CoCoRaHS reportaron menos de una pulgada de lluvia durante la semana. La mayor cantidad de lluvia registrada fue en la estacin VI-SC-35 (Frederiksted, 1.3 ENE), con 0.64 pulgadas. Le sigui la estacin VI-SC-20 (Frederiksted, 1.7 ESE) con 0.45 pulgadas, y luego la VI-SC-34 (Frederiksted, 1.9 NE) con 0.24 pulgadas. La estacin VI-SC-30 (Christiansted, 1.7 SW) registr 0.12 pulgadas, mientras que la VI-SC-10 (Christiansted, 1.6 E) observ 0.14 pulgadas. Finalmente, la estacin VI-SC-23 (Christiansted, 6.5 W) report la menor cantidad de lluvia con 0.15 pulgadas. Esta semana, el ndice de Precipitacin Estandarizado (SPI) de 1 mes para East Hill es de -1.26, lo que indica condiciones ms secas de lo normal. Segn el USGS, la profundidad del nivel fretico en el pozo Adventure 28 en St. Croix, Islas Vrgenes de EE. UU., aument de 18.04 pies el 19 de octubre a 18.36 pies el 18 de noviembre. Adems, en comparacin con la misma fecha del ao pasado (18 de noviembre de 2024), cuando el nivel del agua era de 17.39 pies, la lectura de esta semana muestra un aumento. Esta tendencia indica que St. Croix est experimentando condiciones de sequa anormales.

Esta semana, la isla de St. John experiment lluvias ligeras. En Windswept Beach (VI-SJ-3) se registraron 0.57 pulgadas de lluvia, mientras que en Cruz Bay (VI-SJ-5, 1.6 E) se registraron 0.27 pulgadas. El nivel del agua en el pozo Susannaberg DPW 3 en St. John, Islas Vrgenes de EE. UU., aument de 7.49 pies el 19 de octubre a 9.0 pies el 18 de noviembre. Sin embargo, este nivel sigue siendo relativamente ms bajo que hace un mes, lo que indica que St. John se mantiene libre de sequa esta semana.

En la isla de Santo Toms tambien se registraron lluvias ligeras. El pluviometro de VI-ST-13 (Charlotte Amalie, 1.2 km al NNO) registr 0.56 pulgadas de lluvia, mientras que el de VI-ST-15 (Charlotte Amalie Oeste, 1.3 km al N) registr 0.38 pulgadas. El nivel fretico en el pozo de la Escuela Primaria 3 en Santo Toms, Islas Vrgenes de EE. UU., ha aumentado de 2.08 pies el 19 de octubre a 4.72 pies el 18 de noviembre (esta semana). A pesar de este aumento, Santo Toms se mantiene libre de sequa esta semana gracias a la disminucin del nivel fretico con respecto a la superficie terrestre durante los ltimos meses.

Pacífico

El tiempo en la mayor parte de Alaska, excluyendo el sureste, fue ms seco de lo normal esta semana. Las temperaturas en las zonas centro-sur, centro-este y central de Alaska fueron ms fras de lo normal, con algunas localidades registrando temperaturas entre 6 y 12 grados por debajo de lo habitual para la semana. Las temperaturas fueron cercanas o superiores a lo normal en el sureste, donde algunas localidades terminaron la semana con temperaturas entre 3 y 9 grados por encima de lo normal. Tambin se registraron temperaturas entre 3 y 9 grados por encima de lo normal en la zona de la

vertiente norte. A pesar del tiempo ms seco en algunas partes de Alaska esta semana, no se ha desarrollado una sequa anormal.

Recientemente se registraron precipitaciones superiores a lo normal en las laderas de barlovento de algunas zonas de Hawi, lo que provoc una mejora en las reas con mayor caudal de los ros y una disminucin del dficit de precipitaciones, especialmente en el noreste de la Isla Grande, el norte de Maui Oriental y parte de la costa norte de Oahu. La sequa extrema persisti en algunas zonas de la Isla Grande y Maui, mientras que la sequa severa se mantuvo en partes de Molokai y Oahu. Las temperaturas en todo el estado se mantuvieron, en su mayora, dentro de 1,5 grados de lo normal.

Las Islas Marshall se han visto afectadas por un desplazamiento de norte a sur de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT)/vaguada monznica, lo que ha provocado lluvias frecuentes e intensas. La mayora de las zonas no presentan sequa, mientras que algunas islas registraron precipitaciones significativas: Mili recibi 5,74 pulgadas, Wotje 3,85 pulgadas y Majuro 3,22 pulgadas. Se registraron lluvias moderadas en Ailinglapalap (1,18 pulgadas) y Jaluit (1,17 pulgadas), mientras que Utirik solo registr 0,08 pulgadas. No se dispone de datos de Kwajalein para el anlisis de esta semana.

La regin de los Estados Federados de Micronesia experimenta una intensa actividad de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT)/vaguada monznica, lo que provoc lluvias persistentes en las costas de barlovento y precipitaciones ms intensas en las zonas montaas. As, Kosrae registr 6,27 pulgadas de lluvia, Woleai 3,92 pulgadas y Pohnpei 3,79 pulgadas. Adems, la laguna de Chuuk, Nukuoro y Yap recibieron 2,15, 1,13, 1,93 y 1,11 pulgadas de lluvia, respectivamente, lo que mantuvo a estas islas libres de sequa. Lukunor registr 0,9 pulgadas de lluvia y permanece libre de sequa gracias a las condiciones ms hmedas de semanas anteriores. Sin embargo, Kapingamarangi registr solo 1,26 pulgadas esta semana, despus de haber recibido 5,1 pulgadas en un solo da la semana pasada, y continua en condiciones de sequa severa. No se dispone de datos para Pingelap esta semana.

Samoa Americana experimenta varios das de lluvias moderadas a intensas esta semana, atribuidas a un patrón de vientos alisios hmedos, convergencia de bajo nivel asociada a la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), ondas tropicales y elevacin orogrfica en las regiones montaas. Por ejemplo, Pago Pago registr 2,55 pulgadas de lluvia, mientras que Siufaga Ridge y Toa Ridge recibieron 1,7 pulgadas y 1,07 pulgadas de lluvia, respectivamente. Como resultado, Samoa Americana no presenta actualmente condiciones de sequa.

Esta semana, Palaos experimenta frecuentes chubascos y lluvias intensas localizadas debido a su ubicacin cerca del extremo occidental de una banda convectiva activa asociada a la vaguada monznica y las ondas tropicales. En Koror se registraron 2,47 pulgadas de lluvia, mientras que la Oficina del Servicio Meteorolgico en Airai (WSO Palau) registr 3,11 pulgadas. Como consecuencia, la isla se mantiene libre de condiciones de sequa.

Esta semana, las Islas Marianas experimentaron principalmente lluvias ligeras asociadas a los vientos alisios, con algunos periodos de actividad convectiva, seguidos de una disminucin de las precipitaciones hacia el final de la semana. Segn el informe semanal de precipitaciones, Guam recibí 0,74 pulgadas, Tinian 0,59 pulgadas, Saipan 0,31 pulgadas y Rota 0,3 pulgadas. Aunque las islas recibieron menos de una pulgada de lluvia, se mantienen libres de sequa gracias a las condiciones hmedas de las semanas anteriores.

Mirando hacia el futuro

Desde la noche del 19 de noviembre hasta el 24 de noviembre, el Centro de Prediccin Meteorolgica del Servicio Meteorolgico Nacional (NWS) pronostica que una extensa rea recibir cerca o ms de 25 mm de precipitacin, desde el sur de Ohio hacia el oeste hasta el noreste de Colorado y hacia el sur hasta el noroeste de Luisiana y gran parte de Oklahoma y Texas (excepto el suroeste). Tambin se pronostican precipitaciones de al menos 19 mm en partes del sur de California, el sur de Arizona y los dos tercios sureste de Nuevo Mxico. Se pronostican fuertes precipitaciones, que localmente superarn los 76 mm, en partes del oeste de Washington. Se pronostica tiempo mayormente seco en las Grandes Llanuras del norte y desde el Alto Medio Oeste hacia el este hasta la mayor parte de Nueva York y el norte de Nueva Inglaterra. Es probable que el tiempo seco continúe en gran parte del sureste, especialmente en las zonas afectadas por la sequa del sureste de Luisiana, el sur de Georgia y Florida.

Para el periodo del 25 al 29 de noviembre, el Centro de Prediccin Climtica del Servicio Meteorolgico Nacional pronostica precipitaciones superiores a lo normal en partes del norte, centro y este de Estados Unidos. Las zonas con mayor probabilidad de precipitaciones superiores a lo normal incluyen las Grandes Llanuras del norte y el sureste del pas. Se prev un clima ms seco de lo normal en el suroeste de Estados Unidos, especialmente en la costa de California, el sureste de Arizona, el sur de Nuevo Mxico y el suroeste de Texas. El pronstico prev temperaturas inferiores a lo normal desde el norte de Washington hacia el este hasta el lago Superior y hacia el sur a travs de las Grandes Llanuras centrales. En el oeste, es ms probable que se registren temperaturas superiores a lo normal desde el centro de Oregón hacia el sur a lo largo de la costa del Pacífico y hacia el este hasta cerca de la Divisoria Continental. El pronstico prev temperaturas superiores a lo normal en reas desde la costa del Golfo hasta la regin del Atlántico Medio, con la mayor probabilidad de temperaturas cldas concentrada en el sureste.

En Hawái, se prevn temperaturas y precipitaciones superiores a lo normal en todo el estado. En Alaska, el pronstico indica temperaturas ms cldas de lo normal en las zonas central y occidental del estado, mientras que en el sureste de Alaska es ms probable que haga ms fro de lo normal. Se prevn precipitaciones superiores a lo normal en el suroeste de Alaska, mientras que el pronstico apunta a precipitaciones inferiores a lo normal en el norte y sureste del estado.

Autor(s)

Curtis Riganti, National Drought Mitigation Center

Tsegaye Tadesse, National Drought Mitigation Center