

Resumen nacional de sequía para 25 noviembre, 2025

Resumen

Esta semana, el Monitor de Sequa de Estados Unidos (USDM) registró una mejora en las condiciones de sequa en reas del Oeste, el Medio Oeste inferior, el Noreste y el Sur del pas. En el mapa, se observaron mejoras generalizadas en las zonas afectadas por la sequa en Arizona, as como en otras reas del suroeste desrtico, incluyendo el oeste de Nuevo Mxico y el sur de Utah. En California, las tormentas de las ltimas semanas, sumadas a un patrón general de mayor humedad en los ltimos meses, han contribuido a mejorar las condiciones, lo que ha permitido eliminar las zonas de sequa en el sur de California. Desde el 1 de octubre, numerosas localidades en California, el sur de Nevada y Arizona han registrado acumulaciones de precipitacin record o casi record, incluyendo Santa Brbara, California (+8.2 pulgadas por encima de lo normal), Ontario, California (+4.11 pulgadas), Las Vegas, Nevada (+2.08 pulgadas) y Flagstaff, Arizona (+5.71 pulgadas). En el noroeste del Pacífico, han prevalecido condiciones ms secas de lo normal (durante los ltimos 30 das) en reas de la regin, incluyendo el centro y este de Oregón, el sur de Idaho y el suroeste de Montana. Adems, la acumulacin de nieve en el noroeste del Pacífico continuó por debajo de los niveles normales. En el Medio Oeste inferior (Misuri) y reas del Sur (Texas), se registraron mejoras generalizadas gracias a las lluvias de la semana pasada. En reas del Medio Oeste superior (Michigan, Wisconsin), han prevalecido condiciones excepcionalmente secas durante los ltimos 60 das, con numerosas localidades registrando sequa record o casi record. En el sureste, las condiciones clidas y secas persistieron, lo que provocó la expansin e intensificacin de la sequa en el noroeste de Florida, el sur de Alabama y el sur de Georgia. En el noreste, las recientes lluvias redujeron las zonas de sequa en Virginia Occidental, mientras que reas aisladas de Nueva Inglaterra experimentaron mejoras leves.

En cuanto al almacenamiento de agua en los embalses del oeste de Estados Unidos, los embalses de California continúan estando en o por encima de los promedios histricos para la fecha (24 de noviembre), con los dos embalses ms grandes del estado (Lago Shasta y Lago Oroville) al 110% y 100% de sus promedios, respectivamente. En el suroeste, el Lago Powell se encuentra actualmente al 29% de su capacidad y el Lago Mead al 32%, con el contenido total del sistema del ro Colorado al 37% de su capacidad el 23 de noviembre (en comparacin con el 42% de su capacidad en la misma fecha del ao anterior), segn la Oficina de Recuperacin de los Estados Unidos. En Arizona, el Proyecto del Ro Salt informa que los embalses del sistema del ro Salt estn al 54% de su capacidad, el sistema del ro Verde al 68% y el sistema total de embalses al 56% (en comparacin con el 73% hace un ao). En Nuevo Mxico, el embalse ms grande del estado, Elephant Butte, a lo largo del ro Grande, se encuentra actualmente al 5% de su capacidad (12% del promedio). En el noroeste del Pacífico, el lago Franklin D. Roosevelt en Washington est al 94% de su capacidad (105% del promedio para la fecha), el embalse American Falls en el ro Snake en Idaho est al 25% de su capacidad (64% del promedio), y el embalse Hungry Horse en el noroeste de Montana est al 88% de su capacidad (107% del promedio).

Noreste

En el mapa de esta semana, se observaron mejoras en reas de Maine, New Hampshire, Massachusetts, Nueva York, Virginia Occidental y Maryland. En Nueva Inglaterra, las mejoras se debieron a las precipitaciones beneficiosas durante los ltimos 30 a 60 das, as como a la mejora de las condiciones de las aguas subterrneas. En la parte sur de la regin, las lluvias de los ltimos 7 das (entre 25 y ms de 50 mm) impulsaron el caudal de los ros y los niveles de humedad del suelo, lo que provoc una reduccin de las zonas de sequa en la parte oriental de Virginia Occidental. En Nueva Jersey, la sequa se intensific en reas aisladas (sur y noroeste), donde las zonas de sequa severa (D2) se expandieron en el mapa. Durante los ltimos 90 das, el dficit de precipitaciones en Nueva Jersey oscil entre 50 y ms de 150 mm. Adems, el Servicio Geolgico de Estados Unidos (USGS) informa de niveles de caudal inferiores a lo normal (< percentil 10) en numerosos puntos de medicin en todo el estado. En cuanto a las condiciones de la capa de nieve, el Centro Nacional de Teledeteccin Hidrolgica Operativa del Servicio Meteorolgico Nacional (NWS NOHRSC) informa que la regin noreste est cubierta actualmente en un 42,5% por nieve (en superficie), con una profundidad media de 3,5 cm y una profundidad mxima de 65 cm. Durante la semana, las temperaturas medias fueron inferiores a lo normal en la mayor parte de la regin, con las mayores diferencias (de 4 a 8 grados Fahrenheit) observadas en reas de Nueva York, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island y Connecticut.

Sureste

Durante la semana pasada, las condiciones fueron generalmente secas, con algunas zonas aisladas, incluyendo el este de Carolina del Norte y el norte de Alabama y Georgia, que recibieron ligeras precipitaciones (< 1 pulgada). En el mapa, las condiciones de sequa empeoraron en Florida, Alabama, Georgia y Carolina del Sur. En el noroeste de Florida, el suroeste de Georgia y el sureste de Alabama, una combinacin de factores que incluyen dficits de precipitacin a corto plazo (ltimos 30 a 120 das) y niveles excepcionalmente bajos de caudal de los ros y humedad del suelo provocaron la expansin e intensificacin de la sequa. En el sur de Florida, las reas de sequa moderada (D1) se expandieron debido a la escasez de precipitaciones durante el periodo de los ltimos 30 a 60 das. En cuanto a las temperaturas promedio de la semana, las mayores anomalas (de 10 a ms de 15 grados Fahrenheit) se observaron en el norte de Alabama y Georgia, y en el oeste de Carolina del Norte.

Sur

En gran parte de la regin, predominaron las condiciones generalmente secas esta semana, especialmente en las zonas ms al sur y al oeste, con poca o ninguna precipitacin. En contraste, se registraron lluvias ligeras a moderadas (de 2 a ms de 4 pulgadas) a lo largo de una franja que se extiende desde el centro de Texas hasta el suroeste de Arkansas. Estas lluvias beneficiosas provocaron mejoras de una categoria en reas de sequa moderada (D1) a extrema (D3), concentrndose la mayora de las mejoras en el centro y noreste de Texas. En otras zonas, se observaron mejoras menores en el mapa en el sureste de Oklahoma, el suroeste de Arkansas y el norte de Mississippi. En Luisiana, los dficits de precipitacin a corto

plazo (ltimos 90 das) y la disminucin de los niveles de humedad del suelo provocaron la expansin de las reas de sequa moderada (D1) y sequa severa (D2). Durante la semana, las temperaturas promedio estuvieron muy por encima de lo normal en toda la regin, con anomalas que oscilaron entre 4 y 16 grados Fahrenheit por encima de lo normal. En cuanto a la situacin de los embalses en Texas, Water for Texas (25 de noviembre) inform que los embalses estatales se encontraban al 74% de su capacidad, con muchos embalses en la parte oriental del estado en muy buenas condiciones, mientras que numerosos embalses en la parte occidental del estado continuaban con niveles por debajo de lo normal.

Medio Oeste

En el mapa de esta semana, se observaron mejoras en la zona sur de la regin de Misuri debido a las abundantes lluvias (de 25 a 64 mm) registradas en todo el estado. En otras partes de la regin, se produjeron mejoras menores en el sur de Illinois, el centro de Indiana y el noroeste de Michigan. Durante la semana, las temperaturas promedio estuvieron por encima de lo normal en el oeste y el sur de la regin, con anomalas que oscilaron entre 5 y 15 grados Fahrenheit por encima de lo normal, registrndose las mayores diferencias en el oeste de Minnesota y el sur de Misuri. Las temperaturas fueron ms frescas en la mitad oriental de la regin, con variaciones de 5 grados Fahrenheit por encima de lo normal a 5 grados por debajo de lo normal (centro y norte de Michigan, este de Ohio). Segn la herramienta de Perspectivas Climticas del Centro Regional del Sureste, los ltimos dos meses han sido muy secos en gran parte de la regin, con sequas rcord o casi rcord en las siguientes localidades: Duluth, Minnesota (-4,52 pulgadas); Madison, Wisconsin (-3,57 pulgadas); Green Bay, Wisconsin (-2,58 pulgadas); Detroit, Michigan (-3,75 pulgadas); y St. Louis, Misuri (-4,3 pulgadas).

Altas Llanuras

En el mapa de esta semana, solo se realizaron cambios menores en la regin, incluyendo modificaciones en el este de Kansas, Nebraska y el suroeste de Dakota del Sur. Durante la semana, las precipitaciones en toda la regin fueron generalmente escasas y se limitaron principalmente a las zonas este y central de Kansas, as como al este y centro de Dakota del Sur. En cuanto a las temperaturas medias, se registraron temperaturas superiores a lo normal (de 5 a ms de 15 grados Fahrenheit por encima de lo habitual) en toda la regin, observndose las mayores anomalas en las Dakotas. Segn el NWS NOHRSC, la extensin espacial actual de la capa de nieve regional se limita a reas del centro y norte de Dakota del Norte.

Oeste

En el oeste del pas, las recientes tormentas han proporcionado las tan necesarias precipitaciones a las zonas afectadas por la sequa en California, el centro y sur de Nevada, el sur de Utah, Arizona, el sur de Colorado y el oeste de Nuevo Mxico. En el mapa de esta semana, se observaron mejoras generalizadas en Arizona, en el tercio sur de California y en zonas aisladas de Nevada, Utah, Colorado y Nuevo Mxico. Adems, la reciente actividad de tormentas en el extremo sur de la regin ha mejorado las condiciones de la capa de nieve en el

sur y centro de Sierra Nevada, las montañas Spring (sur de Nevada), los picos de San Francisco (norte de Arizona), la meseta de Mogollón (centro de Arizona), las cordilleras del suroeste de Utah y las montañas Nacimiento (norte de Nuevo México). En otras zonas, las condiciones de la capa de nieve fueron deficientes en la mayor parte de la región intermontaña y el noroeste del Pacífico. En otras partes de la región, se registraron algunos deterioros menores en el mapa en el norte de Colorado y el centro-norte de Montana.

Caribe

En Puerto Rico, se produjeron pequeñas ampliaciones de las zonas de sequía anormal (D0) en la parte central de la isla como consecuencia de la sequía a corto plazo (últimos 30 días), los bajos caudales de los ríos, la reducción de la humedad del suelo y la sequedad de la vegetación.

Esta semana, la sequía anormal a corto plazo persistió en St. Croix y se extendió a St. Thomas y St. John. Las mediciones de precipitación registradas en la red CoCoRaHS en St. Croix variaron entre 0,38 y 0,93 pulgadas. Un punto de monitoreo del nivel fretico del Servicio Geológico de los Estados Unidos mostró que la profundidad del agua continuó aumentando lentamente. La profundidad del agua también aumentó en los puntos de monitoreo del nivel fretico en St. Thomas y St. John, mientras que el déficit de lluvia a corto plazo se incrementó en ambas islas. Las mediciones de precipitación en St. Thomas oscilaron entre 0,25 y 0,31 pulgadas. En St. John, las mediciones de CoCoRaHS variaron entre 0,21 y 0,25 pulgadas, mientras que el observador en Windswept Beach reportó 0,45 pulgadas de lluvia.

Pacífico

En el mapa de esta semana, no se realizaron cambios en Alaska.

En el mapa de esta semana no se realizaron cambios en las islas hawaianas.

Samoa Americana se mantuvo libre de sequía o sequedad anormal esta semana. En Toa Ridge cayeron 3,31 pulgadas de lluvia, mientras que en Siufaga Ridge cayeron 4,64 pulgadas. En Pago Pago cayeron al menos 4,08 pulgadas de lluvia esta semana, lo que continúa una serie de semanas lluviosas en la zona.

Palaos se mantuvo libre de sequía o sequedad anormal esta semana, a pesar de que solo cayeron 1,15 pulgadas de lluvia en los cinco días transcurridos. Dado que en cada una de las tres semanas anteriores se registraron más de 2 pulgadas de lluvia, las condiciones deberán seguir siendo cercanas a la normalidad en Palaos.

En Saipán se desarrolló una sequía anormal a corto plazo, con un registro de 0,23 pulgadas de lluvia esta semana. Esta fue la tercera semana consecutiva con menos de 1 pulgada de lluvia, precedida por precipitaciones inferiores a lo normal (aunque aún suficientes) en octubre. En Tinian se registraron 0,53 pulgadas de lluvia, la segunda semana consecutiva con menos de una pulgada de precipitación, si bien aún no se ha desarrollado una sequía anormal. En Guam, las 0,88 pulgadas de lluvia de esta semana marcaron la segunda semana consecutiva con poco menos de 1 pulgada de lluvia, aunque todavía no se ha desarrollado una sequía anormal. En Rota cayeron 1,09 pulgadas de lluvia y las condiciones se mantuvieron dentro de la

normalidad.

En Yap, cayeron 4.27 pulgadas de lluvia y las condiciones se mantuvieron normales. No se elaboró un informe del Monitor de Sequa para Ulithi debido a la falta de datos. En Woleai, las condiciones se mantuvieron libres de sequa o sequedad anormal con 3.09 pulgadas de lluvia esta semana. Tampoco se elaboró un informe del Monitor de Sequa para Fananu debido a la falta de datos. Chuuk se mantuvo libre de sequa o sequedad anormal, ya que cayeron al menos 7.06 pulgadas de lluvia esta semana. Lukunor también se mantuvo libre de sequa o sequedad anormal tras recibir al menos 4.12 pulgadas de lluvia esta semana. Nukuoro se mantuvo libre de sequa o sequedad anormal esta semana después de que cayeran 2.66 pulgadas de lluvia. Las condiciones en Kapingamarangi mejoraron, pasando de sequa severa a moderada a corto plazo, después de que cayeran 4.86 pulgadas de lluvia esta semana, lo que marca la tercera semana de las últimas cuatro con al menos 2 pulgadas de lluvia. Pohnpei se mantuvo libre de sequa o sequedad anormal y recibió 3.72 pulgadas de lluvia esta semana. No se elaboró un informe del Monitor de Sequa para Pingelap esta semana debido a la reciente falta de datos. Kosrae se mantuvo libre de sequa o sequedad anormal esta semana, donde 4.65 pulgadas de lluvia continuaron un período de lluvias que se remonta a varios meses.

No se elaboró un mapa del Monitor de Sequa para Kwajalein debido a la reciente falta de datos. Ailinglaplap se mantuvo libre de sequa o sequedad anormal esta semana, aunque los 1,83 pulgadas de lluvia registrados esta semana marcan la segunda semana consecutiva con menos de 2 pulgadas. Jaluit se mantuvo libre de sequa o sequedad anormal esta semana y recibió 2,29 pulgadas de lluvia. Después de 1,6 pulgadas de lluvia la semana pasada, el total de precipitaciones mensuales en Utirik alcanzó las 2,26 pulgadas, y se desarrolló una sequedad anormal a corto plazo. Wotje se mantuvo libre de sequa o sequedad anormal con 0,69 pulgadas de lluvia la semana pasada, lo que eleva el total mensual a 5,75 pulgadas. Mili se mantuvo libre de sequa o sequedad anormal con 0,93 pulgadas de lluvia la semana pasada, lo que eleva el total mensual de precipitaciones a más de 10 pulgadas. Majuro se mantuvo libre de sequa o sequedad anormal esta semana y recibió 3,96 pulgadas de lluvia.

Mirando hacia el futuro

El pronóstico de precipitación cuantitativa (QPF) a 7 días del Centro de Predicción Meteorológica del NWS prev acumulaciones de precipitación moderadas, de 2 a más de 4 pulgadas (líquidas), en áreas del sur y sureste de Estados Unidos. Asimismo, se espera que una importante tormenta invernal afecte las regiones del Alto Medio Oeste y los Grandes Lagos. En el oeste, se prevén condiciones secas en California y la Gran Cuenca, mientras que se esperan algunas acumulaciones menores en la región Intermontana. En el noroeste del Pacífico, se esperan acumulaciones moderadas en el oeste de Washington y algunas acumulaciones menores en áreas de las Montañas Rocosas del norte de Idaho y el noroeste de Montana. El pronóstico a 6-10 días del Centro de Predicción Climática indica una probabilidad de moderada a alta de temperaturas por debajo de lo normal en la mitad oriental del oeste, las Grandes Llanuras, el sur, el Medio Oeste y el noreste. Se esperan temperaturas por encima de lo normal en el sureste y a lo largo de la costa del Pacífico, desde el norte de California hasta Washington. En cuanto a la precipitación, existe una probabilidad de baja a moderada de precipitaciones

superiores a lo normal en la mayor parte del territorio continental de Estados Unidos, excepto en el norte de California y el oeste de Oregón, donde se prevén precipitaciones inferiores a lo normal.

Autor(s)

Brad Rippey, U.S. Department of Agriculture

David Simeral, Western Regional Climate Center