

Resumen nacional de sequía para 23 diciembre, 2025

Resumen

Durante los últimos 7 días, una fuerte cresta anómala sobre las Aleutianas y una vaguada sobre el Golfo de Alaska promovieron un flujo de aire del norte a través de Alaska, lo que provocó temperaturas por debajo de lo normal y escasas nevadas. Más al este, una cresta inusualmente fuerte dominó la circulación atmosférica sobre los Estados Unidos continentales. Entre la vaguada del noreste del Pacífico y esta cresta, un fuerte flujo de aire del océano hacia la costa y la actividad de vórtices atmosféricos provocaron abundantes precipitaciones en el noroeste del Pacífico; sin embargo, las temperaturas superiores a lo normal mantuvieron la cota de nieve más alta de lo habitual y limitaron la acumulación de nieve a principios de temporada en las Cascadas, el norte de Sierra Nevada y el norte de las Montañas Rocosas. Se observaron pocas o ninguna precipitación en el suroeste y las Grandes Llanuras bajo la influencia de la cresta anómala, y las temperaturas muy superiores a lo normal agravaron la sequía en algunas zonas de las Montañas Rocosas, las Grandes Llanuras y el valle inferior y medio del Misisipi. En el este, una corriente de aire activa en el norte propició el desarrollo de varios sistemas de tormentas que trajeron precipitaciones generalizadas a partes del sur, los valles de Tennessee y Ohio y el noreste. El aumento de las temperaturas en la región provocó que gran parte de estas precipitaciones cayeran en forma de lluvia, derritiendo gran parte de la nieve acumulada durante la semana anterior. Estas precipitaciones supusieron algunas mejoras moderadas en la sequía y la sequedad anormal, aunque la reducción de la sequía de forma más generalizada se vio limitada por los suelos y arroyos congelados en Nueva Inglaterra y por las condiciones de las aguas subterráneas, que responden más lentamente a las precipitaciones en la región del Atlántico Medio. Las condiciones secas y las temperaturas superiores a lo normal provocaron un empeoramiento de la situación en gran parte de Florida.

Noreste

Una serie de sistemas de tormentas provocaron precipitaciones generalizadas en la región noreste, con la mayoría de las localidades recibiendo al menos 1,25 cm de precipitación líquida, y cantidades mayores desde la costa este de Delaware y Maryland hasta Nueva Jersey, el valle inferior del río Hudson y el sur de Nueva Inglaterra. El aumento de las temperaturas antes del frente fue más intenso permitiendo que gran parte de esta precipitación cayera en forma de lluvia, derritiendo una buena parte de la capa de nieve acumulada a finales de la semana anterior. Si bien la combinación de nuevas precipitaciones y el deshielo fue beneficiosa, la reducción de la sequía fue generalmente limitada. Esto se debe a varios factores. En Nueva Inglaterra, los suelos y los arroyos se han congelado en gran medida, lo que limita la posibilidad de que las nuevas precipitaciones modifiquen sustancialmente la humedad del suelo. En la región del Atlántico Medio, si bien las precipitaciones aumentaron la humedad de la capa superficial del suelo, fueron en gran medida insuficientes para mejorar las condiciones de las aguas subterráneas y el caudal de los ríos. Por lo tanto, las mejoras en la situación de sequía se limitaron a partes del este de Maryland, Delaware, el sureste de Pensilvania y el sur de Nueva Jersey, donde las precipitaciones superaron los 2,5 cm. También se observaron algunas mejoras en el centro-norte de Pensilvania y el sur de Nueva York, según los indicadores SPI. En

contraste, las condiciones de sequa severa (D2) se extendieron por el extremo occidental de Virginia Occidental y el oeste de Maryland debido al empeoramiento del caudal de los ríos y las condiciones de las aguas subterráneas.

Sureste

En todo el sureste de Estados Unidos, se registraron precipitaciones de ligeras a moderadas (de 0,25 a 1 pulgada, localmente más intensas) en gran parte de Alabama, algunas zonas del este del Panhandle de Florida, la región del Piedmont y los Apalaches del sur de Georgia y Carolina del Sur, y gran parte de Carolina del Norte y Virginia. Dado que las temperaturas se mantuvieron cerca de lo normal durante la semana, estas precipitaciones fueron en general insuficientes para aliviar la sequa, pero contribuyeron a evitar un mayor deterioro de la situación en las zonas afectadas. Se observaron leves mejoras en algunas áreas del sureste de Virginia, donde las acumulaciones superaron una pulgada, así como en una pequeña porción de la Costa Natural de Florida. Por el contrario, se registraron condiciones más secas en partes del norte de Georgia, el resto de Florida y la llanura costera de Georgia y Carolina del Sur. En estas regiones, se produjo un empeoramiento de la sequa, incluyendo las zonas de mayor altitud del norte de Georgia, el interior de Carolina del Sur, el extremo sureste de Georgia y algunas partes de la península de Florida.

Sur

Tras otra semana de precipitaciones inferiores a lo normal y con temperaturas superiores a la media, el sur de Estados Unidos experimentó un mayor empeoramiento de la sequa. Una pequeña zona del extremo sur de Texas registró precipitaciones más intensas, lo que provocó una reducción de las categorías D1 y D0, pero la sequa se extendió o intensificó en las llanuras del sur de Texas, la región de Hill Country y la zona de Piney Woods. La sequa también se intensificó a lo largo del valle del río Rojo, y el empeoramiento fue más generalizado en los dos tercios orientales de Oklahoma y Arkansas. En Arkansas, los observadores locales siguen informando de la sequa de lagos y estanques, mientras que en Oklahoma, las temperaturas récord, los fuertes vientos y las precipitaciones persistentemente inferiores a lo normal propiciaron la expansión de las condiciones D2 y D3. En Tennessee, las precipitaciones fueron más abundantes, con una franja de 2,5 cm o más en la parte central del estado, donde actualmente prevalecen las condiciones D0. A pesar de estas lluvias, los niveles de precipitación de los últimos 60 a 90 días se mantienen por debajo de lo normal, y los valores del Índice Estandarizado de Precipitación (SPI) siguen indicando condiciones de sequa. Por lo tanto, no se observaron mejoras en Tennessee.

Medio Oeste

En todo el Medio Oeste, los sistemas de tipo ciclónico trajeron nevadas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y Canadá, con algunas nevadas de efecto lago en Michigan. En el resto del valle superior del Mississippi, Iowa y el oeste de Misuri se observaron condiciones mayormente secas. Se registraron precipitaciones ligeras al este del río Mississippi, con

acumulaciones que aumentaron hacia el este. En general, solo se realizaron pequeños cambios en la clasificación de la sequa en la región. Una reevaluación del impacto de las precipitaciones anteriores condujo a reducciones de D1 y D0 en el noroeste de Iowa, y una zona localizada con 1,27 cm de precipitación tras las nevadas de principios de diciembre permitió algunas reducciones moderadas de D1 en el sureste de Iowa y el oeste de Illinois. También se produjo una pequeña reducción de D0 en el centro de Ohio, donde las acumulaciones superaron los 2,5 cm. Por el contrario, las condiciones más secas y las temperaturas superiores a lo normal provocaron cierto empeoramiento de la situación en el centro-sur de Misuri y el extremo sur de Illinois. No se realizaron cambios en la clasificación de la sequa en la región de los Grandes Lagos superiores, donde los arroyos y el suelo se han congelado en su mayor parte.

Altas Llanuras

La falta de nieve, las temperaturas muy superiores a lo normal y los periodos de fuertes vientos provocaron una degradación invernal inusual en la región de las Grandes Llanuras. La sequa D2 se extendió por el oeste de Nebraska, con expansiones de D1 y D0 en las zonas central y oriental del estado, donde las precipitaciones fueron generalmente inferiores a 0,2 pulgadas, y las temperaturas máximas alcanzaron los 70 grados Fahrenheit. Una pequeña área de D1 se extendió por el sureste de Kansas, y en Colorado, se introdujo la categoría D4 en los condados de Eagle y Pitkin. La sequa D0 se extendió por las llanuras de Wyoming, donde las temperaturas bajas, los fuertes vientos y la falta récord de nieve agravaron la situación. La clasificación de la sequa se mantuvo sin cambios en las Dakotas, donde los suelos y los arroyos se han congelado en gran medida durante el invierno.

Oeste

En todo el oeste de Estados Unidos, una serie de eventos de ros atmosféricos provocaron abundantes precipitaciones en el noroeste del Pacífico, con fuertes lluvias continuas en Washington y las Montañas Rocosas del norte. Las precipitaciones se extendieron posteriormente hacia el sur, cubriendo el oeste de Oregón y el norte de California, regiones que no habían recibido grandes cantidades de lluvia durante los eventos de ros atmosféricos a principios de mes. Si bien las repetidas precipitaciones intensas continúan aliviando la sequa persistente al oeste de la Cordillera de las Cascadas, la situación es más compleja en las zonas de mayor altitud. Las temperaturas durante este periodo se mantuvieron por encima de lo normal, lo que eleva la cota de nieve, impidiendo que las precipitaciones, muy superiores a la media, acumularan importantes capas de nieve en las Cascadas y el norte de Sierra Nevada. De hecho, los valores de equivalente de agua en la nieve (SWE) se mantienen por debajo del 50% del promedio en las Cascadas, el norte de Sierra Nevada, las Montañas Azules y la Cordillera Bitterroot, aunque las condiciones han comenzado a mejorar en el resto de las Montañas Rocosas del norte. Si bien la falta de nieve no representa una preocupación inmediata durante los meses de invierno, podrá generar problemas durante la temporada de deshielo de primavera y verano, por lo que se necesitan precipitaciones adicionales y temperaturas más bajas para recuperar las reservas de nieve durante esta temporada de lluvias. En base a estas consideraciones, se redujeron las categorías D1 y D0 a lo largo del flanco occidental de las

Cascadas y en pequeñas porciones del oeste intermontañoso, pero se mantuvieron las condiciones de sequía en las zonas de mayor altitud. Se redujo una pequeña área de categoría D0 en el norte de Montana, donde las recientes tormentas mejoraron los valores del índice de Precipitación Estandarizado (SPI) a 30 y 60 días.

Caribe

Durante los últimos 7 días, se registraron lluvias moderadas generalizadas en Puerto Rico y la región del Caribe septentrional, lo que fue suficiente para evitar que la sequía se intensificara de D0 a D1 en Puerto Rico, pero no para reducir la extensión de la zona afectada por la sequía D0. En la costa sur de Puerto Rico, las precipitaciones fueron escasas o nulas, por lo que persisten algunas zonas con sequía D0. Debido a las mejores condiciones previstas a medio plazo (de 30 a 90 días), no se introdujo la categoría D1 ni se amplió la zona afectada por la sequía D0 en estas áreas más secas.

Al comienzo de la semana de sequía (del miércoles 17 al martes 23 de diciembre de 2025), se registraron precipitaciones relativamente escasas (generalmente menos de un cuarto de pulgada) en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, con acumulaciones significativamente mayores (alrededor de 1 pulgada) en Puerto Rico. Los vientos del este fueron más fuertes en las zonas costeras expuestas, pero se mantuvieron débiles y variables en el interior. Estos vientos costeros intensificados estuvieron relacionados con la formación de un sistema de alta presión en la superficie sobre el Atlántico Norte. Después de un viernes mayormente seco y soleado, regresó la humedad a la región durante el fin de semana, integrada en un flujo del noreste, acompañada del paso de una débil vaguada en superficie el domingo por la noche. Se observaron condiciones ligeramente más secas hacia el final de la semana de sequía. Las estimaciones de precipitación basadas en satélite (SPoRT GPM IMERG) para las Islas Vírgenes de los Estados Unidos (hasta las 12:00 UTC del 23 de diciembre) fueron generalmente inferiores a media pulgada.

Las mediciones de precipitación en St. Croix (CoCoRaHS) durante la semana registraron un máximo de 0,96 pulgadas (5 días de datos) en VI-SC-25 (Christiansted 4.4 W) y un mínimo de 0,19 pulgadas (4 días de datos) en VI-SC-23 (Christiansted 6.5 W). Los valores intermedios, todos inferiores a media pulgada, incluyeron: 0,42 pulgadas en VI-SC-30 (Christiansted 1.7 SW), 0,40 pulgadas en VI-SC-10 (Christiansted 1.6 E), un tercio de pulgada tanto en VI-SC-20 (Frederiksted 1.7 ESE) como en VI-SC-29 (Frederiksted 2.5 NNE), y 0,30 pulgadas (6 días de datos) en VI-SC-24 (Christiansted 2.1 ENE). El nivel del agua en el pozo Adventure 28 del USGS comenzó y terminó la semana de sequía cerca de su valor mínimo de 18,65 pies por debajo del nivel del suelo, y alcanzó su punto máximo de 18,37 pies el 19 de diciembre a las 5 a. m. AST. En East Hill (estación 672560), los valores del índice de Precipitación Estandarizado (SPI) a 1, 3, 6, 9 y 12 meses fueron, respectivamente: -0,1, -0,91, -0,41, -0,10, -0,07. Esto concuerda con condiciones de normales a ligeramente secas. La clasificación de sequía se mantiene sin cambios con respecto a la semana anterior en D0(S).

Las observaciones de precipitación en St. John fueron generalmente similares a las de St. Croix esta semana, con valores que oscilaron entre un máximo de 0,77 pulgadas en Windswept Beach (VI-SJ-3) y un mínimo de 0,32 pulgadas en VI-SJ-10 (Cruz Bay 3.1 NNW). Se

registraron lluvias medibles (aunque en su mayoría ligeras) durante 25 de los últimos 27 días en Windswept Beach, donde un observador local comentó que las ranas estaban contentas y que la cisterna se mantenía llena. Algunas cantidades intermedias de precipitación incluyeron 0,58 pulgadas (6 días de datos) en VI-SJ-5 (Cruz Bay 1.6 E) y 0,34 pulgadas (6 días de datos) en VI-SJ-8 (Cruz Bay 7.4 E). El nivel del agua del pozo Susannaberg Dpw 3 comenzó alto (10,67 pies el 17 de diciembre a las 1:00 p. m. AST) y descendió con el tiempo hasta 10,93 pies el 23 de diciembre a las 10:15 p. m. AST. En Windswept Beach, los valores del índice de Precipitación Estandarizado (SPI) para 1, 3, 6, 9 y 12 meses fueron, respectivamente: 0,05, -0,57, 0,10, 0,21 y 0,37, lo que indica condiciones cercanas a la normalidad. Al igual que en St. Croix, la clasificación de sequía en St. John se mantiene sin cambios con respecto a la semana anterior, en D0(S).

En la isla de Santo Tomás, las precipitaciones registradas incluyeron tres cuartos de pulgada (solo 2 días de datos) en VI-ST-5 (Charlotte Amalie West 4.2 WNW), 0.44 pulgadas (6 días de datos) en VI-ST-15 (Charlotte Amalie West 1.3 N) y un cuarto de pulgada (5 días de datos) en VI-ST-13 (Charlotte Amalie West 1.2 NNW). El nivel del agua del pozo de la Escuela Primaria 3 comenzó alto, en 5.72 pies (17 de diciembre a las 11:15 a. m. AST) y disminuyó con el tiempo hasta alcanzar un valor mínimo de 6.48 pies (23 de diciembre a las 11:30 p. m. AST). Los valores del índice de Precipitación Estandarizado (SPI) no estuvieron disponibles en su mayoría esta semana para el Aeropuerto King (estación 11640), excepto el valor SPI de 1 mes de -0.84, lo que indica condiciones ligeramente secas. La clasificación de sequía en Santo Tomás permanece sin cambios en D0(S).

Pacífico

En gran parte de Alaska, la falta de nieve ha provocado dificultades en el transporte terrestre y un mayor riesgo de congelación del suelo a mayor profundidad de lo habitual. Los persistentes vientos del norte trajeron condiciones secas y más frías de lo normal al estado durante la última semana, lo que no contribuyó a mejorar la capa de nieve. Por lo tanto, se declararon zonas de sequía moderada (D0) en algunas partes del noroeste y suroeste de Alaska debido a la escasa capa de nieve, algo inusual para esta época del año.

Durante la semana pasada, se registraron lluvias beneficiosas en gran parte de Hawái, con las mayores acumulaciones en las islas del noroeste. Estas precipitaciones provocaron mejoras generalizadas de una categoría en la situación de sequía en Niihau, Kauai y Oahu. Sin embargo, la situación de sequía se mantuvo sin cambios en las islas del sureste, donde las condiciones de sequía están más arraigadas y las lluvias recientes no fueron suficientes para generar mejoras significativas.

Esta semana de sequía (del miércoles 17 al martes 23 de diciembre de 2025) en la región de las Islas del Pacífico de Estados Unidos (USAPI) se caracterizó por un patrón de circulación complejo con múltiples factores intervinientes. Estos incluyeron vaguadas de vientos alisios, zonas de convergencia de vientos alisios, influencias de la vaguada casi ecuatorial (NET) y fragmentos de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), fragmentos de líneas de cizalladura, la parte final de un amplio sistema frontal de latitudes medias y un aumento ocasional de la intensidad de los vientos alisios. Estos aumentos estuvieron asociados con el fortalecimiento de la alta

presin en superficie sobre Japn y la zona adyacente del Pacfico Norte occidental. Como consecuencia, se produjeron vientos racheados, oleaje intenso, pulsos de marejada del noreste y un aumento del oleaje a lo largo de las costas y arrecifes orientados al norte y al este de muchas islas de las USAPI. En Samoa Americana, al sur del ecuador, una vaguada y una zona de baja presin asociada provocaron fuertes lluvias y un aumento de la velocidad del viento en el territorio al final de la semana de sequa.

Las estimaciones de precipitacin basadas en satlites (SPoRT GPM IMERG) para la semana que finaliz el 23 de diciembre a las 12:00 UTC mostraron dos bandas de conveccin tropical orientadas de este a oeste. La banda ms extensa se ubicaba al sur, extendindose desde la Repblica de Palaos hacia el este, a travs del sur de los Estados Federados de Micronesia y el sur de la Repblica de las Islas Marshall, donde las cantidades de precipitacin oscilaron generalmente entre 0,5 y 4,0 pulgadas. La banda ms pequea se encontraba al norte, extendindose desde la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte hacia el este-noreste, en direccin a la Isla Wake. La mayor parte de esta precipitacin fue relativamente ligera (<0,75 pulgadas), aunque se registraron algunos puntos localizados con acumulaciones de 1 a 2 pulgadas. Los totales de lluvia para Samoa Americana fueron del orden de 0,5 a 1,0 pulgadas.

La parte norte de la regin de las Islas Marianas del Norte (CNMI) experimenta una sequa relativa (es decir, no alcanza el mnimo de 2,5 cm de lluvia necesarios para cubrir la mayora de las necesidades hdricas) durante la semana pasada, mientras que la parte sur registra precipitaciones relativamente abundantes. En el Aeropuerto Internacional de Saipn solo se registr una cantidad mnima de precipitacin (datos de 6 das), lo que marca la sptima semana consecutiva de sequa. Tinian no tuvo mucha mejor suerte, con solo 1,1 cm de lluvia (datos de 5 das). Ambas localidades mantienen su estado de sequa D0(S). Sin embargo, un poco ms al sur, el aeropuerto de Rota registr 2,6 cm de lluvia esta semana, lo que apenas supera el umbral mnimo. Esta cantidad, sumada a los meses relativamente lluviosos de junio a noviembre, justifica que la zona se mantenga libre de sequa. El territorio estadounidense de Guam recibe la mayor parte de las precipitaciones de esta semana, con 11 cm, cantidad suficiente para superar el umbral mnimo para todo un mes (10 cm). Guam se mantiene libre de sequa. Agat y Dedado recibieron 8 cm y 9,4 cm, respectivamente.

La Repblica de Palaos registra otra semana lluviosa (ms de 5 cm), con 2,84 pulgadas (7,2 cm) de precipitacin en Koror (segn datos de Xmacis2 durante 5 das) y 4,55 pulgadas (11,6 cm) en WSO Palau (Airai). En Koror, todos los meses, de enero a noviembre de 2025, superaron el umbral mnimo de 8 pulgadas (20,3 cm) necesario para cubrir la mayora de las necesidades de agua. Palaos continua libre de sequa.

En todos los Estados Federados de Micronesia (FSM), las estaciones con datos disponibles se mantienen libres de sequa esta semana. En la parte occidental de los FSM, las precipitaciones oscilaron entre un mximo de 1,68 pulgadas en Gilman y un mnimo de 0,63 pulgadas en la isla de Yap. Esta ltima ha registrado precipitaciones abundantes de mayo a noviembre de 2025, y aunque esta estacin reporta su cuarta semana consecutiva de sequa, la designacin de Yap sigue siendo de zona libre de sequa. Algunas estaciones con precipitaciones intermedias incluyen Woleai (1,25 pulgadas, an libre de sequa) y Rumung (0,69 pulgadas). No se dispuso de datos para Ulithi esta semana. En la zona central de los FSM, las precipitaciones oscilaron entre 4,26 pulgadas (6 das de datos) en Lukunoch y 0,84 pulgadas en Chuuk (6 das de datos).

Las precipitaciones intermedias incluyeron Nukuoro (1,56 pulgadas, 5 das de datos) y Kapingamarangi (1,07 pulgadas, 5 das de datos). Para todas estas estaciones, todos los meses de 2025, excepto uno o dos, registraron precipitaciones abundantes. No se dispuso de datos para Fananu esta semana. En la zona oriental de los FSM, Kosrae recibí la impresionante cantidad de 12,18 pulgadas de lluvia esta semana, seguida de Pohnpei (1,23 pulgadas, 5 das de datos) y Pingelap (0,99 pulgadas, solo 3 das de datos). Todos los meses de 2025 registraron precipitaciones abundantes en Pohnpei y Kosrae, incluido diciembre. Pingelap ha sido mucho ms seco, con solo los meses de junio, julio, agosto y septiembre superando el requisito mnimo de 8 pulgadas de lluvia.

Las cantidades de precipitacin en las Islas Marshall incluyeron 4,62 pulgadas en Mili, 4,14 pulgadas en Ailinglaplap, 3,63 pulgadas en Majuro, 3,13 pulgadas en Jaluit, 1,90 pulgadas en Kwajalein, 0,80 pulgadas en Wotje y tan solo 0,18 pulgadas en Utirik. Kwajalein y Utirik mantienen la designacin D0(S) (sequa leve), mientras que las dems localidades no presentan sequa.

Samoa Americana tambin mantuvo su estatus de libre de sequa esta semana. El aeropuerto de Pago Pago registr 1,71 pulgadas de precipitacin durante esta semana (con datos de 6 das), Siufaga Ridge registr 0,17 pulgadas (con datos de solo 2 das) y Toa Ridge registr 0,66 pulgadas de lluvia.

Mirando hacia el futuro

Durante los prximos das, la actividad de los ros atmosfricos continuar aportando abundante humedad al oeste, con fuertes lluvias costeras y nevadas en las montaas, concentrndose principalmente en California. Se pronostican fuertes precipitaciones que se extendern hacia el interior, llegando a la Gran Cuenca y a algunas zonas de las Montaas Rocosas. Ms adelante en la semana, a medida que la vaguada del Pacfico se desplace hacia la costa y se forme una cresta de alta presin sobre el noreste del Pacfico, se prev una pausa en la actividad de los ros atmosfricos hasta el final de la primera semana. Ms al este, se pronostica una cresta de alta presin persistente en el centro de Estados Unidos, lo que provocar condiciones mayormente secas y temperaturas muy superiores a lo normal en las Grandes Llanuras. En el este, una cresta de bloqueo que retrocede hacia Groenlandia desde Europa favorecer la formacin de frentes fro y el estancamiento de aire fro, adems de propiciar precipitaciones adicionales y tormentas invernales. El pronstico de precipitacin acumulada a 7 das del WPC muestra cantidades superiores a una pulgada en la mayor parte de la regin noreste, gran parte de la cual podra caer en forma de nieve o una mezcla invernal en la regin del Atlntico Medio. Se prevn condiciones mayormente secas en el sureste durante la primera semana, con posibles lluvias ligeras en el valle inferior del Mississippi. Durante la segunda semana, los pronsticos del CPC indican mayores probabilidades de precipitaciones superiores a lo normal en el tercio occidental de Estados Unidos, con las mayores probabilidades en el suroeste. Una ligera tendencia a precipitaciones superiores a lo normal se extiende a lo largo de la franja norte hasta la regin de los Grandes Lagos, mientras que se prevn precipitaciones inferiores al promedio en gran parte de la costa este. Una fuerte cresta de alta presin anmala favorece temperaturas superiores a lo normal en la mayor parte de Estados Unidos, aunque el bloqueo

podrá provocar temperaturas inferiores al promedio en el noreste. Se prevén precipitaciones superiores a lo normal en Hawái, mientras que se pronostican temperaturas inferiores a lo normal en Alaska, con condiciones más secas de lo normal en la franja sur del estado.

Autor(s)

Anthony Artusa, NOAA/NWS/NCEP/CPC

Adam Allgood, NOAA/NWS/NCEP/CPC