

Resumen nacional de sequía para 6 enero, 2026

Resumen

Durante la semana pasada, se registraron temperaturas superiores a lo normal en gran parte de la mitad occidental de Estados Unidos. Las zonas al oeste del río Misisipi experimentaron, en general, temperaturas cercanas o superiores a lo normal, con algunas regiones de las Montañas Rocosas del norte registrando temperaturas entre 15 y 20 F por encima de lo habitual para la época. Estas condiciones climáticas favorecieron la lluvia en lugar de la nieve, lo cual es crucial para el suministro de agua en invierno en el oeste del país, y muchas localidades continúan experimentando un inicio tardío de la temporada de nieve.

En contraste, las temperaturas inferiores a lo normal predominaron en la península de Florida, con desviaciones de 5 a 10 F por debajo de lo habitual en el sur del estado. Las temperaturas por debajo de lo normal también fueron generalizadas desde el Medio Oeste superior hasta el noreste y la región del Atlántico Medio, donde las desviaciones de 5 F o más por debajo de lo normal fueron comunes. Algunas zonas de Nueva Inglaterra registraron temperaturas particularmente bajas, con valores de 10 a 15 F por debajo de lo normal.

Fuera del oeste del país, las precipitaciones superiores a lo normal se limitaron a algunas zonas del sureste, Florida y la región del Alto Medio Oeste. Gran parte del oeste registró más del 100% de las precipitaciones normales durante la semana, y amplias zonas de California recibieron más del 200% de lo habitual.

Noreste

Gran parte de la región experimentó una semana seca, con la excepción de las zonas situadas a sotavento de los Grandes Lagos, donde las nevadas provocadas por el efecto lacustre fueron considerables. Algunas zonas del oeste de Nueva York recibieron varios metros de nieve debido a las fuertes nevadas que se generaron en los lagos Erie y Ontario. Casi toda la región registró temperaturas inferiores a lo normal, con las anomalías más bajas en Nueva Inglaterra, donde las temperaturas fueron entre 9 y 10 F por debajo de lo habitual.

En la mayor parte de la región no se observaron cambios en las condiciones de sequía. Se registraron mejoras en la sequía moderada y en las condiciones de sequedad anormal en el oeste de Nueva York. A lo largo de la costa de Maine, las recientes precipitaciones provocaron una mejora en la sequía extrema. La sequía moderada disminuyó en el norte de Pensilvania debido a un patrón climático más húmedo.

Por el contrario, las condiciones de sequía anormalmente secas se extendieron por el este de Massachusetts, mientras que la sequía moderada y severa se extendió por Nueva Jersey y la sequía moderada llegó hasta Long Island. La región del Atlántico Medio experimentó la mayor expansión de la sequía, con sequía severa extendiéndose por el centro de Maryland y gran parte del centro de Virginia. La sequía moderada también se extendió por las zonas costeras de Maryland y Virginia y hasta el sur de Delaware.

Sureste

Las temperaturas fueron generalmente superiores a lo normal en gran parte de la región, con desviaciones de 2 a 4 F por encima de lo habitual. Las excepciones incluyeron las zonas costeras de las Carolinas y gran parte de Florida, donde las temperaturas fueron de 2 a 4 F por debajo de lo normal, y el sur de Florida, donde las desviaciones alcanzaron de 4 a 6 F por debajo de lo normal.

La mayor parte del sureste del país se mantuvo seca, con algunas zonas de precipitaciones superiores a lo normal limitadas al noroeste de Florida y a áreas que se extienden desde el centro de Alabama hasta el centro de Georgia. La sequía severa se extendió por el noreste de Georgia, el oeste de Carolina del Sur y el oeste de Carolina del Norte, y se declaró sequía severa por primera vez en el centro de Carolina del Norte. La sequía moderada también se extendió tanto en Carolina del Norte como en Carolina del Sur.

En Florida, la sequía severa se extendió por el suroeste y el noreste del estado, mientras que la sequía moderada abarcó toda la región del sur de Florida. En Alabama, la sequía moderada y severa se extendió por las zonas central y sur, y las condiciones de sequedad anormal aumentaron a lo largo de la costa.

Sur

Casi toda la región estaba seca, con precipitaciones aisladas únicamente en Mississippi y el suroeste de Tennessee. Las temperaturas fueron superiores a lo normal en la mayoría de las zonas, con algunas partes del extremo norte de Texas y Oklahoma registrando temperaturas más de 12 F por encima de lo habitual.

Las condiciones de sequía empeoraron en todos los estados de la región. La sequía moderada se extendió por el norte y el sur de Mississippi. En el centro y el este de Tennessee se observó una expansión de la sequía moderada y severa, mientras que la sequía moderada aumentó en el oeste del estado. La sequía moderada y severa se extendió por gran parte de Luisiana y el sur y el oeste de Arkansas. La sequía severa se extendió por el noreste y el noroeste de Arkansas y llegó hasta el noreste de Oklahoma. La sequía severa y extrema se propagó desde el suroeste hasta el centro de Oklahoma, mientras que la sequía moderada continuó extendiéndose por el este de Oklahoma.

En todo Texas, la sequía moderada y las condiciones de sequedad anormal se extendieron por gran parte de la región de Panhandle, mientras que la sequía moderada y severa se intensificó en el este de Texas y en la zona costera del sureste del estado. Las condiciones de sequía continuaron empeorando en el extremo sur de Texas.

Medio Oeste

Las temperaturas fueron más bajas de lo normal en las zonas del norte y cercanas o superiores a lo normal más al sur. El oeste de Iowa y el suroeste de Minnesota experimentaron temperaturas entre 9 y 12 F por encima de lo normal. La mayor parte de la región se mantuvo seca, aunque se registraron precipitaciones superiores a lo normal en el norte y este de Minnesota, el centro de Wisconsin y tanto en la península superior como en el norte de la

pennsula inferior de Michigan.

A pesar de las precipitaciones localizadas, un invierno generalmente clido y seco ha permitido que la sequa contine extendindose. Las condiciones de sequedad anormal se extendieron por el sur de Kentucky y a lo largo de la frontera con Indiana, con un nuevo foco de sequa moderada en el sureste de Kentucky. Las condiciones de sequedad anormal tambien se extendieron por el sur de Indiana, mientras que la sequa severa y extrema se intensific en las zonas centrales del estado.

Se observaron ligeras mejoras en las condiciones de sequa moderada y sequedad anormal en el suroeste de Michigan. La sequa moderada y las condiciones de sequedad anormal mejoraron en el noroeste de Illinois, el este de Iowa y el sur de Wisconsin. Sin embargo, la sequa empeor en el centro y sur de Illinois, donde la sequa moderada y severa se extendi. La sequa moderada y severa tambien se extendi por gran parte del sur de Misuri, mientras que las condiciones de sequedad anormal aumentaron en el noroeste de Misuri y el suroeste de Iowa. Algunas zonas del centro-este de Minnesota experimentaron una mejora gracias a un comienzo de enero lluvioso.

Altas Llanuras

Las temperaturas, superiores a lo normal, predominaron en la regin, con desviaciones que superaron los 15 F por encima de lo habitual en algunas zonas del oeste de Nebraska, el oeste de Kansas, el noreste de Colorado, Wyoming y el sureste de Montana. Las precipitaciones fueron mnimas, concentrndose las mayores cantidades en el noreste de Dakota del Norte.

El invierno inusualmente clido y seco ha provocado que algunas zonas experimenten el inicio de invierno ms seco de su historia. Las condiciones de sequa anormal se extendieron por el sur de Nebraska y el noreste de Kansas, as como por el sureste de Kansas, donde tambien aument la sequa moderada. La sequa moderada y severa se extendi por el sureste de Wyoming, el oeste de Nebraska, el noreste de Colorado y el sureste de Colorado.

Oeste

Las mayores anomalas positivas de temperatura se registraron en el oeste, con zonas desde el centro de Montana hasta el oeste de Wyoming y el noroeste de Colorado experimentando temperaturas ms de 15 F por encima de lo normal. Estas condiciones clidas provocaron que la nieve se acumulara en altitudes ms elevadas y aumentaron las precipitaciones en las zonas bajas. Si bien muchas reas recibieron precipitaciones superiores a lo normal, la capa de nieve se mantiene en niveles crticamente bajos y persiste una sequa de nieve significativa en numerosas cordilleras, incluidas las Cascadas, las Montaas Azules de Oregn, la cordillera Bitterroot de Idaho y las Montaas Rocosas centrales de Colorado.

Fue una semana lluviosa en gran parte de la regin, con precipitaciones superiores a lo normal en casi toda California, as como en gran parte de Nevada y el oeste de Arizona. Tambin se registraron precipitaciones superiores a lo normal en el este de Washington y Oregn, Idaho, el oeste de Utah y Montana. La sequa severa y extrema disminuy en el norte de Montana, y la

sequa moderada mejor an ms en el suroeste del estado.

Las continuas precipitaciones provocaron una mejora en la sequa moderada y severa en Nevada, Arizona, el este de Oregón y Washington, y el extremo norte de Idaho. Las condiciones de sequa anormal se extendieron por el noreste de Nuevo México, mientras que la sequa extrema y excepcional se expandió por el centro de Colorado. La sequa extrema desapareció del suroeste de Wyoming, y la sequa moderada mejor en el oeste de Wyoming. En Washington, las condiciones de sequa anormal se ajustaron para reflejar las precipitaciones recientes, teniendo en cuenta también la persistente escasez de nieve en las Cascadas.

Caribe

En Puerto Rico, las condiciones de sequa anormal mejoraron esta semana en las zonas que recibieron mayor cantidad de lluvia y los indicadores mejoraron.

Esta semana, las precipitaciones en las Islas Vírgenes de Estados Unidos (USVI) fueron de ligeras a moderadas e intermitentes, lo cual es típico de la estación seca. Los datos de las estaciones meteorológicas costeras e insulares en Saint Thomas y Saint John muestran condiciones de sequa moderada, con lluvias ligeras o chubascos ocasionales. De manera similar, en St. Croix, la mayoría de las estaciones registraron menos de 3,8 centímetros de lluvia durante la semana, y la isla se mantuvo en condiciones de sequedad anormal.

En St. Croix se registraron lluvias moderadas, con acumulaciones medibles en algunas zonas. Esta semana se reportaron las siguientes cantidades de lluvia en las estaciones VI-SC-10 (Christiansted 1.6 E), VI-SC-20 (Frederiksted 1.7 ESE), VI-SC-23 (Christiansted 6.5 W), VI-SC-30 (Christiansted 1.7 SW), VI-SC-34 (Frederiksted 1.9 NE) y VI-SC-35 (Frederiksted 1.3 ENE), con valores que oscilaron entre 0.13 y 1.34 pulgadas. Los valores del índice de Precipitación Estandarizado (SPI) para East Hill y Christiansted Hamilton mostraron condiciones de sequa anormal a corto plazo. El nivel del agua en el pozo Adventure 28 (St. Croix, Islas Vírgenes de EE. UU.) era de 18.98 pies el 6 de enero de 2026, un aumento con respecto a la semana anterior, lo que indica que St. Croix continúa experimentando condiciones de sequa anormal.

En St. Thomas, las precipitaciones registradas en las estaciones VI-ST-13 (Charlotte Amalie, 1.2 NNW) y VI-ST-15 (Charlotte Amalie West, 1.3 N) fueron de 0.66 pulgadas y 0.13 pulgadas, respectivamente. El 6 de enero de 2026, el nivel del agua en el pozo de la Escuela Primaria 3 en St. Thomas se encontraba a 7.5 pies por debajo de la superficie, lo que indica condiciones de sequa moderada. De manera similar, St. John registró precipitaciones mínimas, con solo 0.05 pulgadas en la estación VI-SJ-5 (Cruz Bay 1.6 E). Al 6 de enero de 2026, el nivel del agua en el pozo Susannaberg DPW 3 (St. John, Islas Vírgenes de EE. UU.) se encontraba a 11.69 pies por debajo de la superficie, un nivel que ha continuado aumentando desde mediados de octubre de 2025, manteniendo a St. John en condiciones de sequa moderada.

Pacífico

En Alaska, las precipitaciones de esta semana fueron suficientes, por lo que no fue necesario realizar ningún cambio.

En Hawi, la sequa severa y extrema disminuy en la parte sureste de la Isla Grande.

Esta semana, la mayora de las regiones de las Islas Marshall experimentaron escasas o nulas precipitaciones al comenzar la estacin seca. En Ailinglapalap, Jaluit y Mili no se registraron lluvias. Wotje, Kwajalein, Majuro y Utirik registraron precipitaciones de 0,08, 0,05, 0,03 y 0,02 pulgadas, respectivamente. Como consecuencia de las condiciones hmedas de diciembre de 2025, Ailinglapalap, Jaluit, Majuro y Mili se clasifican como zonas libres de sequa, mientras que Kwajalein, Utirik y Wotje experimentan condiciones de sequedad anormales.

Los Estados Federados de Micronesia experimentan actualmente un clima favorable y condiciones secas, con solo algunas lluvias aisladas en ciertas zonas. En Pingelap no se registraron precipitaciones, con dos das de datos faltantes, y la isla continua en una situacin de sequa anormal. Adems, las islas de Kapingamarangi, Nukuoro, Kosrae, Pohnpei, Lukunor y la laguna de Chuuk registraron precipitaciones de 1,41, 0,6, 0,28, 0,27, 0,24 y 0,21 pulgadas, respectivamente. A pesar de estas cantidades de lluvia, ninguna de estas islas presenta sequa gracias a las prolongadas condiciones de humedad de las ltimas semanas. En contraste, se observaron fuertes lluvias en las islas de Yap y Woleai, que registraron 4,35 y 2,68 pulgadas de lluvia esta semana, respectivamente, lo que les ha permitido mantenerse libres de sequa.

Samoa Americana experiment condiciones climticas hmedas y fuertes lluvias esta semana, con 2,74 pulgadas de precipitacin registradas en Pago Pago. En Siufaga Ridge se registraron 2,07 pulgadas, mientras que en Toa Ridge cayeron 1,57 pulgadas de lluvia durante la semana. Como consecuencia, Samoa Americana se mantiene libre de sequa.

Esta semana, Palaos experiment un clima clido, hmedo y lluvioso. La Oficina del Servicio Meteorolgico en Airai report 0,9 pulgadas de lluvia, mientras que Koror registr 0,84 pulgadas, aunque faltan datos de cinco das. Las lluvias continuas han contribuido a que la isla se mantenga libre de sequa.

Esta semana, las Islas Marianas experimentaron un clima clido y constante, con condiciones que variaron entre mayormente soleado y parcialmente nublado, caractersticas de la estacin seca de la regin. Segn el informe semanal de precipitaciones, Guam registr 0,14 pulgadas, Rota 0,44 pulgadas y Saipan 0,77 pulgadas. Tinian tambin report 0,34 pulgadas de lluvia, aunque an faltan datos de cinco das. Gracias a las precipitaciones de las ltimas semanas, las Islas Marianas no presentan actualmente condiciones de sequa.

Mirando hacia el futuro

Durante los prximos cinco a siete das, el patrón meteorológico sobre el territorio continental de Estados Unidos se presenta activo, con una alta probabilidad de precipitaciones en muchas zonas. Se prev que las regiones desde las Grandes Llanuras Centrales hasta el Medio Oeste y la zona de los Grandes Lagos reciban hasta 2,5 centímetros de precipitacin. Más al sur, se espera que las zonas desde Luisiana hacia el noreste, hasta Kentucky, reciban la mayor cantidad de precipitacin, con varios centímetros acumulados. Desde el noroeste del Pacífico hasta las Montañas Rocosas y el suroeste, se anticipan precipitaciones generalizadas. Las zonas más secas se ubicarán en el norte de las Grandes Llanuras, California, el centro y sur de Texas, y desde las Carolinas hasta la península de Florida. Se espera que las temperaturas se

por encima de lo normal en gran parte del pas. Solo las zonas a lo largo del sur de Estados Unidos tendrn temperaturas cercanas o inferiores a lo normal. Las mayores anomalas trmicas se registrarn en el centro y norte de las Grandes Llanuras, con algunas zonas de Montana donde se prevn temperaturas entre 5 y 8 grados Celsius por encima de lo normal.

Los pronsticos para los prximos 6 a 10 das indican que se prevn temperaturas superiores a lo normal en casi todo Estados Unidos, con la excepcin del sureste y el sur de Texas. Las mayores probabilidades de temperaturas por encima de lo normal se concentran en la costa oeste, as como en las llanuras del norte y las Montaas Rocosas del norte. Las mayores probabilidades de precipitaciones inferiores a lo normal se presentan en el oeste de Estados Unidos y en las llanuras del sur. Se anticipan mayores probabilidades de precipitaciones superiores a lo normal en las llanuras centrales y del norte, Florida y a lo largo de la costa de las Carolinas, as como en Alaska y Hawi.

Autor(s)

Brian Fuchs, National Drought Mitigation Center

Tsegaye Tadesse, National Drought Mitigation Center