

Resumen nacional de sequía para 13 enero, 2026

Resumen

Fue una semana ms activa a nivel nacional, con precipitaciones significativas en las llanuras centrales, el medio oeste y el sureste. Partes de Misisipi y Alabama recibieron ms de 127 mm de lluvia. En las llanuras y el medio oeste, gran parte de la precipitacin cay en forma de lluvia en lugar de nieve debido a temperaturas inusualmente clidas. Algunas zonas del suroeste y el centro de las Montaas Rocosas tambin recibieron lluvia y nieve beneficiosas, lo que fren la intensificacin de la sequa y produjo mejoras localizadas. Las temperaturas fueron ms clidas de lo normal en la mayor parte del pas, con temperaturas cercanas o ligeramente inferiores a lo normal limitadas al oeste y al suroeste. Las mayores variaciones se produjeron en la parte alta del medio oeste y el norte de las llanuras, donde las temperaturas superaron los valores normales entre 15 y 20 F.

Noreste

Las temperaturas estuvieron muy por encima de lo normal, generalmente entre 9 y 12 F por encima del promedio, con las zonas costeras entre 6 y 9 F por encima de lo normal. Se produjeron precipitaciones por encima de lo normal en las partes norte y sur de la regin, mientras que desde Pensilvania hasta el sur de Nueva Inglaterra se mantuvo seco, recibiendo solo entre el 25 % y el 50 % de la precipitacin normal. Se observaron mejoras en la sequa moderada y las condiciones anormalmente secas en el oeste y centro de Nueva York. El norte de Pensilvania continu con un patrón ms hmedo, lo que permiti una mejora de la sequa moderada, mientras que las partes del sur se mantuvieron secas y vieron una expansin de la sequa moderada y severa. La sequa severa mejor en el norte de Nuevo Hampshire y Vermont. La sequa moderada se expandi en el este de Massachusetts, pero mejor en el centro, mientras que las condiciones anormalmente secas se expandieron en el sur de Connecticut. El sur de Virginia se mantuvo seco, con una expansin de la sequa moderada y severa.

Sureste

Se registraron precipitaciones significativas desde el sur de Misisipi hasta el oeste de Carolina del Norte, con reas a lo largo y al norte de este corredor recibiendo entre un 200 % y un 400 % de la precipitacin normal. Las temperaturas se situaron entre 9 F y 12 F por encima de lo normal en la mayor parte de la regin, con temperaturas entre 6 F y 9 F por encima de lo normal en el centro y sur de Florida. La sequa mejor desde el centro-oeste de Alabama hacia el noreste hasta el oeste de Carolina del Norte. Al este de esta zona, las condiciones de sequa empeoraron, con degradaciones en el centro y este de Carolina del Norte, gran parte de Carolina del Sur, el centro y sur de Georgia, el sureste de Alabama y el oeste del Panhandle de Florida. La sequa moderada y severa se extendi por el centro y sur de Florida, con una nueva zona de sequa severa en el extremo sur de Florida.

Sur

Las temperaturas estuvieron por encima de lo normal en casi toda la región, con variaciones de 9 a 12 F por encima de lo normal en el este y de 6 a 9 F por encima de lo normal en Texas y Oklahoma. El norte de Luisiana, Misisipi, el centro y el este de Tennessee y el sureste de Arkansas recibieron precipitaciones muy por encima de lo normal, y el sur de Misisipi registró entre un 200 % y un 400 % de lo normal. El centro y el sur de Texas, el este de Oklahoma y Arkansas se mantuvieron en gran parte secos. La sequía mejoró en Misisipi, el sur de Luisiana y el este de Tennessee, incluyendo mejoras en la sequía severa en el noroeste de Misisipi y el norte de Luisiana. Por el contrario, la sequía se expandió en gran parte de Arkansas y el este y sur de Texas. La sequía extrema se expandió en el sur de Texas, con una nueva área en el noreste de Texas. La sequía moderada y severa también se expandió en el este de Texas hacia Arkansas, mientras que las condiciones anormalmente secas aumentaron en el centro de Texas y el oeste de Oklahoma. La sequía severa se expandió desde el este de Arkansas hacia el oeste de Tennessee.

Medio Oeste

Las temperaturas estuvieron muy por encima de lo normal en toda la región, con un rango de 12 a 16 F por encima de lo normal en la mayoría de las áreas y de 8 a 12 F por encima de lo normal en el este. Las precipitaciones por encima de lo normal cayeron en gran parte de Iowa, el sur de Minnesota, Wisconsin, Michigan y el norte de Illinois y Missouri. Gran parte de la precipitación cayó en forma de lluvia, lo cual fue inusual para enero, y con los suelos en gran parte descongelados, la infiltración fue eficiente. Las condiciones de sequía mejoraron en una categoría en gran parte de Wisconsin y Michigan. La sequía moderada y severa mejoró en el centro de Illinois, mientras que la sequía moderada y las condiciones anormalmente secas mejoraron en el norte de Missouri y el sur de Iowa. La sequía moderada también se eliminó del este de Iowa. El sur de Missouri permaneció seco, con la sequía moderada y severa expandiéndose.

Altas Llanuras

Se registraron precipitaciones superiores a lo normal en el este de Colorado, Kansas y el sureste de Nebraska, principalmente en forma de lluvia e infiltración en el suelo debido a las altas temperaturas. Gran parte del resto de la región permaneció seca. Las temperaturas se situaron entre 10 y 15 F por encima de lo normal en la mayoría de las zonas, con temperaturas entre 15 y 20 F por encima de lo normal en partes de las Dakotas y el este de Montana. El sureste de Colorado fue la única zona con temperaturas cercanas a lo normal. Las condiciones de sequía anormalmente seca y moderada mejoraron en el sureste de Nebraska, el este de Kansas y partes del centro-sur de Colorado. La sequía se extendió por el este de Wyoming, el centro-oeste de Dakota del Sur y el noreste de Colorado.

Oeste

Se registraron precipitaciones superiores a lo normal en el sureste de Arizona, el oeste y centro de Nuevo México, partes de Colorado y el oeste de Washington. Las temperaturas

fueron variables: en California, Nevada, Utah, Arizona y Nuevo Mxico, las temperaturas fueron hasta 5 F inferiores a lo normal, mientras que en las zonas del norte se registraron entre 5 y 10 F superiores a lo normal y en partes del centro de Montana, entre 15 y 20 F superiores a lo normal. La mayora de los cambios en la sequa reflejaron una mejora, incluyendo sequa moderada y condiciones anormalmente secas en el oeste de Montana y el centro de Idaho, sequa severa en el oeste de Colorado y sequa de severa a extrema en el este de Arizona, el oeste de Nuevo Mxico, el este de Nevada y el oeste de Utah. Sin embargo, la sequa se extendi al suroeste de Idaho y al norte de Nevada, la sequa extrema y excepcional se expandi al centro de Colorado, y las condiciones anormalmente secas y moderadas se extendieron a gran parte del este de Wyoming.

Caribe

Para Puerto Rico, las condiciones anormalmente secas mejoraron esta semana en las reas que recibieron ms lluvia y los indicadores mejoraron.

Esta semana, las precipitaciones en las Islas Vrgenes Estadounidenses (USVI) fueron de ligeras a moderadas, principalmente debido a breves chubascos con vientos alisios. La regin se encuentra actualmente en la estacin seca, cuando las altas temperaturas subtropicales y los fuertes vientos alisios mantienen las precipitaciones bajas y esporadicas.

Santa Cruz experiment lluvias ligeras dispersas esta semana. Los totales reportados fueron 1,54 pulgadas en VI-SC-10 (Christiansted 1,6 E) y 1,58 pulgadas en VI-SC-20 (Frederiksted 1,7 ESE). VI-SC-30 (Christiansted 1,7 SO) recib 0,88 pulgadas, mientras que VI-SC-35 (Frederiksted 1,3 ENE) report 0,82 pulgadas. Adams, VI-SC-23 (Christiansted 6,5 O) registr 0,41 pulgadas, y VI-SC-34 (Frederiksted 1,9 NE) recib 0,57 pulgadas de lluvia. Los valores del ndice de Precipitacin Estandarizado (IPS) para East Hill durante los ltimos 1 a 12 meses oscilaron entre -0,1 y -1,13, lo que indica condiciones normales a excepcionalmente secas a corto plazo. En contraste, los valores del SPI de 3 a 9 meses para Christiansted Hamilton indican que la zona oeste de Santa Cruz est experimentando condiciones de sequa. Al 13 de enero de 2026, el nivel del agua en el pozo Adventure 28 en Santa Cruz, Islas Vrgenes Estadounidenses, se registr en 5,8 metros (19,04 pies). Esto representa un aumento con respecto a los 5,7 metros (18,98 pies) de la semana anterior. Adams, este nivel es ms alto que el del 23 de enero de 2025, cuando era de 5,8 metros (16,04 pies) en la misma fecha. Estas observaciones indican que Santa Cruz experimenta condiciones anormalmente secas.

Esta semana, el Aeropuerto Cyril E. King en St. Thomas registr 0.24 pulgadas de lluvia. El SPI de un mes para el aeropuerto, que fue de -1.72 al 8 de enero de 2026, indica que las condiciones son ms secas de lo normal. Adams, los totales de lluvia para VI-ST-13 (Charlotte Amalie, 1.2 NNO) y VI-ST-15 (Charlotte Amalie Oeste, 1.3 N) fueron de 0.73 pulgadas y 0.50 pulgadas, respectivamente, con un da de datos faltantes para este ltimo. La profundidad del nivel del agua debajo de la superficie terrestre en el pozo Grade School 3 en St. Thomas, Islas Vrgenes de los Estados Unidos, ha aumentado constantemente desde mediados de octubre de 2025. El 13 de enero de 2026, el nivel del agua alcanz los 7.66 pies, frente a los 7.50 pies de la semana pasada. Este aumento persistente en la profundidad del nivel del agua debajo de la superficie terrestre indica que la isla se encuentra en condiciones de sequa moderada.

De manera similar, St. John registró escasas precipitaciones, con solo 0,57 pulgadas en VI-SJ-3 (Playa Azotada por los Vientos). Adams, VI-SJ-5 (Baha Cruz 1.6 E) recibió solo 0,08 pulgadas esta semana. La profundidad del nivel del agua bajo la superficie terrestre en el pozo Grade School 3 en St. Thomas, Islas Vírgenes Estadounidenses, ha ido aumentando desde mediados de octubre. Al 13 de enero de 2026, el nivel del agua se registró en 7,66 pies, frente a los 7,50 pies de la semana pasada. Este aumento en la profundidad del agua indica que la isla está experimentando actualmente una sequía moderada.

Pacífico

En Alaska, las áreas anormalmente secas se expandieron en las partes norte y central del estado, con cierta reducción en la península Kenai, donde ha habido abundante nieve recientemente.

En Hawái, se registraron un par de días de lluvias moderadas en el este y sureste de la Isla Grande, desde la zona de Hilo hasta South Point, continuando con las abundantes precipitaciones provenientes de la depresión de Kona el fin de semana anterior. Gracias a estas lluvias continuas, la sequía moderada mejoró en South Point, en la Isla Grande. También se observó una mejora en la sequía moderada en el distrito de South Kohala de la Isla Grande (incluyendo Honokaia, Puukapu, Niihau y Waimea Town), donde la restricción hídrica se redujo del 25 % al 10 % gracias a las lluvias recientes que llenaron los embalses de Waikoloa a un nivel satisfactorio.

Esta semana, se observaron lluvias de ligeras a moderadas en la mayoría de las áreas de las Islas Marshall, excepto en Kwajalein, que experimentó un evento de lluvia más intenso. Kwajalein registró un total de 7,15 pulgadas de lluvia durante la semana, incluidas 4,97 pulgadas el 9 de enero de 2025. Como resultado, Kwajalein ha mejorado de condiciones anormalmente secas a estar libre de sequía. Majuro y Mili recibieron 1,87 pulgadas y 1,51 pulgadas de lluvia esta semana, respectivamente, y permanecen libres de condiciones de sequía. Aunque Ailinglapalap y Jaluit informaron lluvias mínimas (0,07 pulgadas y ninguna lluvia, respectivamente), ambas islas permanecen libres de sequía debido a las condiciones húmedas experimentadas en las semanas anteriores. Por el contrario, Wotje y Uti recibieron cantidades de lluvia de 0,63 y 0,57 pulgadas, respectivamente, que las mantienen en condiciones anormalmente secas a corto plazo.

Las precipitaciones en los Estados Federados de Micronesia (FSM) mostraron una variabilidad espacial significativa esta semana. La laguna de Chuuk registró 6,75 mm de lluvia, mientras que Pohnpei recibió 8,55 mm. Woleai registró 3,65 mm de lluvia debido a la persistente actividad convectiva. Los totales de precipitaciones para otras localidades son los siguientes: Kapingamarangi registró 6,65 mm, Kosrae 1,10 mm, Lukunor 1,85 mm (con un día de datos faltantes), Nukuoro 9,15 mm y Yap 1,90 mm. Por el contrario, Pingelap no registró precipitaciones (con tres días de datos faltantes), lo que continúa con condiciones anormalmente secas.

Samoa Americana se encuentra actualmente en su temporada tropical de lluvias, con precipitaciones casi normales esta semana. Pago Pago registró 5,5 cm de lluvia, mientras que

la cordillera Siufaga registró 2 cm y la cordillera Toa recibió 1,6 cm. Como resultado, Samoa Americana se mantiene libre de sequa.

Palaos experimentó lluvias torrenciales esta semana. La Oficina Meteorológica de Airai reportó 8,8 cm de lluvia, mientras que Koror registró 8,9 cm. Por lo tanto, la isla está libre de sequa.

Esta semana, las Islas Marianas experimentaron lluvias intermitentes, de ligeras a moderadas. Según el informe semanal de precipitaciones, Guam recibió 50 mm, Rota reportó 47 mm y Saipn registró 13 mm. Tinian reportó 46 mm de lluvia, aunque aún se esperan los datos de cuatro días. Dado que enero suele ser parte de la estación seca y dadas las recientes condiciones de lluvia, las Islas Marianas se encuentran actualmente libres de sequa.

Mirando hacia el futuro

Durante los próximos cinco a siete días, se prevé que gran parte de la mitad occidental de EE. UU. está seca, desde el oeste hasta las llanuras. Se prevé que las zonas más húmedas se encuentren en la región de los Grandes Lagos y el noreste. Al final del período, podrá haber algunas precipitaciones costeras en partes del sur y el este de Texas, así como en Luisiana. Se prevé que las temperaturas durante este tiempo sean muy superiores a lo normal en el oeste, con variaciones de 10 a 13 F por encima de lo normal desde Nevada hasta Utah y Wyoming. Las temperaturas más frías de lo normal serán comunes en la mitad oriental del país, con las mayores variaciones en la parte superior del Medio Oeste y los Grandes Lagos, con variaciones de 10 a 13 F de lo normal. Las temperaturas por debajo de lo normal migrarán hacia el sur, con partes del sureste y Florida entre 6 y 9 F por debajo de lo normal.

Las previsiones meteorológicas para los próximos 6 a 10 días indican la probabilidad de temperaturas superiores a lo normal en gran parte del suroeste y el sur de las llanuras. Las mayores probabilidades de temperaturas inferiores a lo normal se registrarán en la parte alta del medio oeste y el noreste. Desde el norte de las llanuras hasta el sureste, Florida y las zonas al este de aquí, se presentan las mayores probabilidades de temperaturas inferiores a lo normal. Se esperan precipitaciones inferiores a lo normal en Florida y las zonas costeras del noroeste del Pacífico. Las mayores probabilidades de precipitaciones superiores a lo normal se anticipan en el valle de Tennessee, así como en las Montañas Rocosas y el suroeste.

Autor(s)

Brian Fuchs, National Drought Mitigation Center

Tsegaye Tadesse, National Drought Mitigation Center