

Resumen nacional de sequía para 20 enero, 2026

Resumen

Los 48 estados contiguos de Estados Unidos finalmente experimentaron un patrón meteorológico más tranquilo, con una cresta de alta presión que se estableció en el oeste y una profunda vaguada que se desarrolló en el este. Dado que muchas partes del oeste de Estados Unidos registraron una acumulación de nieve inferior a la media para esta época del año, el cambio de patrón generó una creciente preocupación por el suministro de agua en el oeste para el próximo verano y los años venideros, a pesar de las abundantes precipitaciones en muchas zonas durante la primera mitad de la temporada de lluvias invernales. Aún así, los indicadores hidrológicos fueron mixtos: los 154 principales embalses interestatales de California contenían 25,9 millones de acres-pie de agua (123% del promedio histórico) al comienzo de 2026. Mientras tanto, el almacenamiento en la extensa cuenca del río Colorado, que abarca varios estados, se situaba en poco menos de 17,3 millones de acres-pie (53% del promedio), lo que refleja problemas a largo plazo relacionados, en parte, con las temperaturas crónicamente elevadas y una sequía de varias décadas en el suroeste. Más al este, las Grandes Llanuras sirvieron como zona de transición entre el clima templado y seco del oeste y las condiciones cada vez más frías del este. Las Grandes Llanuras experimentaron un clima seco, salvo por las nevadas arrastradas por el viento en el norte, así como una amenaza ocasional de incendios forestales. En otras zonas, desde el valle del Misisipi hacia el este, se registraron bajas temperaturas, acompañadas de lluvias y nevadas ocasionales. Algunas de las nevadas más intensas se produjeron en los estados de la región de los Grandes Lagos, especialmente en las zonas propensas a las tormentas. También nevó a lo largo y cerca de la costa atlántica, principalmente entre el 17 y el 18 de enero. A medida que el aire frío se afianzaba en el Medio Oeste y el Este, los cambios en la sequía que se habían producido rápidamente en las últimas semanas, ya fuera por sequías repentinas o por las intensas tormentas invernales, se atenuaron, quedando la sequía prácticamente "congelada" por las condiciones frías y mayormente secas. Durante la segunda mitad del período de monitoreo de la sequía, se observaron temperaturas inferiores a 0 F (-18 C) con frecuencia en el Medio Oeste superior y las regiones vecinas.

Noreste

Debido a las bajas temperaturas y las precipitaciones irregulares, se produjeron pocos cambios en la situación de sequía en el noreste del país. Se observaron algunas leves mejoras en la situación de sequía en las zonas del interior, mientras que en algunas partes de la costa del sur de Nueva Inglaterra se produjo un ligero empeoramiento o la aparición de sequía.

Sureste

Durante el período de monitoreo de la sequía, se registraron precipitaciones ligeras desde el norte de Florida hasta el sureste de Virginia, pero en la mayoría de las zonas la cantidad de lluvia fue inferior a una pulgada. Hace unas semanas, a principios de enero, la mayoría de los estados del sureste informaron que la humedad del suelo en las zonas agrícolas se calificaba

como muy baja o baja en al menos el 40% de la superficie, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Entre los impactos relacionados con la sequa se incluyen el deterioro de los pastizales y la escasez de agua superficial. Debido a la sequa y a las olas de fro esporádicas, algunos cultivos de siembra otoñal, como el trigo de invierno, han tenido dificultades para germinar y desarrollarse. Se declararon nuevas zonas de sequa extrema (D3) en partes de Alabama y Georgia, mientras que la sequa moderada a severa (D1 a D2) se extendió a varias áreas.

Sur

El empeoramiento de la sequa fue un tema recurrente, especialmente desde el este de Texas hasta Arkansas. Se registró una pequeña zona de sequa excepcional (D4) en el norte de Arkansas, en medio de un período de sequa devastador que ha dejado los pastizales en condiciones extremadamente precarias y ha provocado que muchas personas tengan un acceso limitado al agua superficial de estanques y arroyos. Hace varias semanas, a principios de enero, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos clasificó la humedad de la capa superficial del suelo de Arkansas como muy baja o baja en un 46%, y desde entonces ha predominado el tiempo seco. Desde el norte de Arkansas, una zona continua de sequa severa a extrema (D2 a D3) se extendió hacia el suroeste, hasta el noreste de Texas. Zonas dispersas de sequa D2 se extendieron a los estados vecinos, incluyendo Luisiana, Misisipi y Tennessee. Gran parte del sur de Texas, así como el sur, centro y este de Oklahoma, experimentan sequa moderada a extrema (D1 a D3).

Medio Oeste

A excepción de algunas precipitaciones ocasionales, incluyendo fuertes nevadas localizadas al este de los Grandes Lagos, el Medio Oeste experimentó un período más frío y mayormente seco. Los cambios fueron generalmente leves, con un ligero empeoramiento de la sequa desde el sur de Misuri hasta el sur de Indiana. A principios de enero, la humedad de la capa superficial del suelo era inferior al 40% en gran parte de Illinois y Misuri, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Mientras tanto, se observaron algunas mejoras leves en la región de los Grandes Lagos, tras las recientes precipitaciones intensas y las nevadas continuas.

Altas Llanuras

Se observó una expansión irregular de la sequedad y la sequa, principalmente en Nebraska, Wyoming y el sur de Dakota del Sur. Debido a los períodos de clima cálido y ventoso, Nebraska informó que a principios de enero la humedad de la capa superficial del suelo en todo el estado se calificó como muy baja o baja en un 68%, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. De manera similar, la humedad de la capa superficial del suelo en Wyoming se calificó como muy baja o baja en un 55%.

Oeste

Durante las últimas semanas, un silencio inquietante se ha apoderado del oeste de Estados Unidos. Con la capa de nieve ya por debajo del promedio en muchas cuencas hidrográficas occidentales debido a la predominancia de sistemas de tormentas cálidas este invierno, la mitad de la temporada de acumulación de nieve ha llegado con equivalencias de agua en la nieve que disminuyen cada día más respecto a lo normal. Entre las cuencas occidentales, solo las ubicadas en las Montañas Rocosas del norte y áreas vecinas reportan una capa de nieve generalizada cercana a lo normal. Para el 20 de enero, las equivalencias de agua en la nieve eran, en general, inferiores al 50% del promedio en Oregón (y partes de los estados adyacentes) y el suroeste. Si bien muchas áreas del oeste reportan precipitaciones acumuladas superiores al promedio para la temporada, el calor anómalo del invierno y la consiguiente falta de nieve podrían tener graves consecuencias futuras para la actividad de los incendios forestales y el suministro de agua en verano. Sin embargo, por ahora, más de la mitad de la región occidental de 11 estados, incluida toda California, está libre de sequa.

Caribe

No se produjeron cambios en la cobertura de sequa anormal (D0) en Puerto Rico, ya que las lluvias dispersas fueron insuficientes para lograr una mejora mayor.

Esta semana persistieron las condiciones de sequa en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, sin que se registraran precipitaciones superiores a una pulgada. En St. Croix se registraron lluvias ligeras y dispersas. Los totales reportados fueron de 0.20 pulgadas en VI-SC-10 (Christiansted 1.6 E) y 0.91 pulgadas en VI-SC-29 (Frederiksted 2.5 NNE). VI-SC-30 (Christiansted 1.7 SW) recibió 0.24 pulgadas, mientras que VI-SC-34 (Frederiksted 1.9 NE) reportó 0.72 pulgadas. Los valores del índice de Precipitación Estandarizado (SPI) para East Hill durante los últimos 1 a 12 meses oscilaron entre -0.71 y -1.17, lo que indica condiciones de normales a anormalmente secas a corto plazo. En contraste, los valores del SPI de 1 a 6 meses (-2.16, -5.14 y -4.02) para Christiansted Hamilton indican que las zonas occidentales de St. Croix están experimentando condiciones de sequa. Al 20 de enero de 2026, el nivel del agua en el pozo Adventure 28 en St. Croix, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, se registró en 19.21 pies. Esto representa un aumento con respecto a los 19.04 pies de la semana anterior. Además, este nivel es más de 3 pies superior al registrado en la misma fecha del año anterior, el 21 de enero de 2025, cuando era de 15.93 pies. Estas observaciones indican que St. Croix experimenta condiciones de sequa anormal (D0-S).

En St. John se registraron bajas precipitaciones esta semana, con solo 0.07 pulgadas en VI-SJ-3 (Windswept Beach). El promedio de precipitaciones en la isla, según los datos de CoCoRaHS, fue de 0.24 pulgadas, con VI-SJ-5 (Cruz Bay 1.6 E) y VI-SJ-8 (Cruz Bay 7.4 E) registrando 0.31 pulgadas esta semana, y VI-SJ-9 (Myall Point 0.1 S) y VI-SJ-10 (Cruz Bay 3.1 NNW) registrando 0.26 y 0.07 pulgadas, respectivamente. Los índices SPI a uno y tres meses en Windswept Beach eran de 2.32 y 1.73 al 15 de enero de 2026, lo que indica condiciones más secas de lo normal a corto plazo. El nivel fretico en el pozo Susannaberg Dpw 3, en St. John, Islas Vírgenes de EE. UU., ha estado descendiendo constantemente desde mediados de octubre de 2025. El 20 de enero de 2026, el nivel del agua alcanzó los 12.52 pies, un aumento

con respecto a los 12.11 pies de la semana anterior. Este descenso persistente del nivel fretico indica que la isla se encuentra en condiciones de sequa moderada a corto plazo (D1-S).

De manera similar, el aeropuerto Cyril E. King en St. Thomas registr 0,24 pulgadas de lluvia esta semana. Otras mediciones de precipitacin en la isla fueron de 0,34 pulgadas en VI-ST-13 (Charlotte Amalie 1.2 NNW) y 0,27 pulgadas en VI-ST-15 (Charlotte Amalie West 1.3 N). El nivel fretico en el pozo de la Escuela Primaria 3 en St. Thomas, Islas Vrgenes de EE. UU., ha estado aumentando desde mediados de octubre. El 20 de enero de 2026, el nivel del agua se registr en 8,02 pies, un aumento con respecto a los 7,66 pies de la semana anterior. Este aumento en el nivel del agua indica que la isla est experimentando actualmente una sequa moderada a corto plazo (D1-S).

Pacífico

Un sistema de tormentas que atraviesa Alaska trajo consigo un clima ms templado y precipitaciones generalizadas, lo que contribuy a reducir el tamao de una zona de sequa anormal en la parte centro-sur del estado.

Hawi experiment el paso de un frente fro, aunque las fuertes lluvias disminuyeron a chubascos dispersos a medida que el frente se desplazaba hacia el este y se debilitaba. Aun as, se elimin una pequea zona de sequa leve (D0) en el oeste de Oahu, donde el frente fro provoc algunas lluvias intensas. Por lo dems, la situacin de sequa en Hawi se mantuvo sin cambios.

Samoa Americana se mantuvo libre de sequa y sequedad anormal (D0-S). Las condiciones fueron variadas esta semana: Pago Pago y Tao Ridge registraron 1,76 y 3,71 pulgadas de lluvia respectivamente, mientras que Siufaga Ridge report solo 1,29 pulgadas.

Esta semana, Palaos se mantuvo libre de sequa o sequedad anormal (D0-S). La estacin de observacin de Koror COOP registr una precipitacin semanal total de 0,32 pulgadas, con una precipitacin mensual total de 6,13 pulgadas.

Las Islas Marianas del Norte, Tinian y Saipn, registraron totales semanales de 2,18 y 1,72 pulgadas de lluvia, respectivamente, mientras que las islas del sur, Rota y Guam, recibieron 0,64 y 0,87 pulgadas, respectivamente. Dado que enero forma parte de la estacin seca y que los totales de precipitacin mensuales superan las 2,6 pulgadas, las Islas Marianas se mantuvieron libres de sequa y sequedad anormal (D0-S) esta semana.

Esta semana, las condiciones meteorolgicas fueron mayormente hmedas en los Estados Federados de Micronesia, y todas las islas, excepto Pingelap (que continu con sequa anormal), estuvieron libres de sequa o sequedad anormal. Kosrae (4,06 pulgadas), Pohnpei (3,04 pulgadas), Lukunoch (4,60 pulgadas), Chuuk (4,29 pulgadas), Kapingamarangi (3,69 pulgadas), Woleai (4,98 pulgadas) y Nukuoro (5,12 pulgadas) registraron precipitaciones semanales superiores al umbral mnimo de 2 pulgadas necesario para cubrir las necesidades hdricas. Yap (0,76 pulgadas) y Pingelap (0,36 pulgadas) registraron precipitaciones inferiores a este umbral, aunque el total mensual de Yap fue de 6,65 pulgadas y el de Pingelap de 0,41 pulgadas. Los datos de Fananu y Ulithi fueron insuficientes para realizar evaluaciones esta semana.

Las condiciones meteorolgicas fueron variadas en la Repblica de las Islas Marshall esta

semana. En el sur, Ailinglapalap (2,7 pulgadas), Jaluit (3,37 pulgadas) y Mili (5,37 pulgadas) registraron ms de dos pulgadas de lluvia durante la semana. Majuro (1,67 pulgadas) no alcanz el mnimo de dos pulgadas necesario para cubrir las necesidades de agua esta semana, pero el total mensual es de 5,59 pulgadas, por lo que la isla se mantuvo libre de sequa o sequedad anormal. Si bien Kwajalein (0,06 pulgadas) registr solo cantidades mnimas de precipitacin, el total mensual es de 7,27 pulgadas. De manera similar, Wotje (0,06 pulgadas) y Utirik (0,0 pulgadas) registraron poca o ninguna precipitacin esta semana, pero los totales de precipitacin mensuales son inferiores a una pulgada (Wotje 0,79 pulgadas y Utirik 0,59 pulgadas), lo que provoc que ambas islas experimentaran una sequa moderada a corto plazo (D1-S).

Mirando hacia el futuro

Del 23 al 26 de enero, una extensa y potencialmente peligrosa tormenta invernal afectar desde el sur de las Montaaas Rocosas y las Grandes Llanuras hasta los estados del Atlntico medio y sur, excluyendo las zonas cercanas a la costa del Golfo de Mxico. Gran parte del sur del pas se enfrentar a mltiples fenmenos meteorolgicos adversos, incluyendo precipitaciones invernales (nieve, aguanieve o lluvia helada), fuertes vientos y temperaturas inusualmente bajas. El clima invernal podra extenderse al menos hasta el centro de Texas y el norte de Luisiana, Misisipi, Alabama y Georgia. Tras la tormenta, se prev que las temperaturas descendan a 10 F (-12 C) o menos a lo largo y al norte de una lnea que va desde el centro de Texas hasta el norte de Georgia, con especial preocupacin por las zonas que sufran cortes de electricidad debido a la cada de tendido elctrico por la acumulacin de hielo y nieve. Ms al norte, las temperaturas bajo cero sern comunes hasta el centro de las Grandes Llanuras y el valle del Ohio. Es probable que la tormenta tenga graves consecuencias para la agricultura, incluyendo un estrs considerable en el ganado debido a la exposicin al fro, el viento, las precipitaciones invernales o una combinacin de estos fenmenos extremos. Las temperaturas podran descender brevemente a -30 F (-34 C) o menos desde Dakota del Norte hasta la regin de los Grandes Lagos superiores.

El pronstico del Servicio Meteorolgico Nacional para los prximos 6 a 10 das (del 27 al 31 de enero) indica una alta probabilidad de temperaturas inferiores a lo normal en la mitad oriental de Estados Unidos, mientras que en el oeste prevalecer un clima ms clido de lo habitual. Por otro lado, se esperan precipitaciones normales o inferiores a lo normal en casi todo el pas, a excepcin de algunas zonas, como el sur de Florida y el sur y la costa de Texas, donde se prevn condiciones ms hmedas de lo normal.

Autor(s)

Brad Rippey, U.S. Department of Agriculture

Lindsay Johnson, National Drought Mitigation Center