

# Resumen nacional de sequía para 10 febrero, 2026

## Resumen

Los 48 estados continentales y Alaska solo experimentaron degradaciones esta semana. Se observó un fuerte gradiente de temperatura de este a oeste, con temperaturas inferiores a lo normal en gran parte del este y superiores a lo normal en el oeste. Otra semana de precipitaciones localizadas que no afectaron a grandes zonas del país provocó un aumento del déficit de precipitaciones. Las degradaciones también se extendieron por el oeste, desde el noroeste del Pacífico hasta las Montañas Rocosas del norte y centro, incluyendo partes de Oregón, Idaho, Montana, Wyoming y el oeste de Colorado. Aunque cayó algo de nieve en las montañas, la capa de nieve críticamente baja, con niveles equivalentes de agua de nieve por debajo del percentil 15, continúa dominando gran parte de la región y apoyando la expansión de la sequía. En las Altas Llanuras y el oeste del Medio Oeste, se registraron degradaciones de una clase tras otra semana mayormente seca. En el noreste, a pesar de las temperaturas más frías de lo normal, la continua falta de precipitaciones significativas contribuyó al empeoramiento de las condiciones en partes de Pensilvania y el sur de Nueva Inglaterra. En el sur, desde las llanuras meridionales orientales de Oklahoma y Texas hacia el este hasta el valle del Bajo Misisipi y el oeste de las Carolinas. A pesar de las precipitaciones dispersas en algunas localidades, los déficits de precipitación a corto y medio plazo siguen aumentando, debido a la sequía de los suelos y los bajos caudales que contribuyen a la intensificación. En el sur de Georgia y Florida, el peligro de incendios sigue en aumento, con zonas de Florida que registran valores del índice de sequía Keetch-Byram entre 500 y 700.

En Hawái, los fuertes vientos alisios trajeron fuertes precipitaciones y viento a las laderas barlovento de Molokai, Maui y la Isla Grande, donde cayeron entre 10 y 25 cm de lluvia en las elevaciones más bajas y nieve en las más altas, lo que favoreció mejoras de una clase en esas áreas.

## Noreste

Las precipitaciones fueron generalmente ligeras en toda la región, y muchas áreas recibieron cantidades por debajo de lo normal, salvo la nieve localizada por efecto lago. Los déficits de precipitación a corto plazo durante los últimos 30 a 60 días son de 2 a 6 pulgadas por debajo de lo normal en partes de Pensilvania, Nueva York y Nueva Inglaterra, especialmente en las áreas del sur y la costa. Las temperaturas promediaron de 5 a 15 grados por debajo de lo normal, lo que limitó el deshielo potencialmente beneficioso en el norte de Nueva York y el norte de Nueva Inglaterra. La sequía moderada (D1) se expandió en el este de Pensilvania y el centro de Nueva York. En Massachusetts, la sequía moderada (D1) se expandió hacia el oeste a través de partes centrales del estado y hacia áreas del sureste donde persisten los déficits de precipitación a largo plazo y el bajo nivel de agua subterránea. En el noreste de Connecticut, el norte de Rhode Island y partes adyacentes del centro-sur de Massachusetts, se introdujo una sequedad anormal (D0) para reflejar el flujo continuo de los arroyos, las preocupaciones sobre las aguas subterráneas y los déficits de precipitación en curso.

## **Sureste**

Las precipitaciones en el sureste fueron generalmente ligeras e irregulares durante la semana pasada. La mayoría de las áreas recibieron menos de 0,25 a 0,75 pulgadas. Grandes porciones de Alabama, Georgia, las Carolinas y el norte de Florida registraron menos del 25 por ciento de la precipitación normal para la semana. Bandas estrechas de lluvias más intensas trajeron totales localizados de 1 a 2 pulgadas en partes de la costa central del Golfo y partes de las Carolinas orientales. Las degradaciones en toda la región fueron impulsadas por los déficits de precipitación a corto y mediano plazo que continúan aumentando. La humedad del suelo se mantiene por debajo del percentil 10 en grandes porciones de Alabama, Georgia y las Carolinas, con algunas áreas por debajo del percentil 5. Los caudales de los arroyos en partes de Georgia, Carolina del Sur y Alabama se mantienen en un solo dígito, y los niveles de los embalses en partes de las Carolinas continúan funcionando por debajo de los promedios estacionales. La sequía moderada (D1) y la sequía severa (D2) se expandieron en partes de Alabama, Georgia y las Carolinas. La sequía extrema (D3) se extendió a partes de Georgia, el norte del estado de Carolina del Sur y porciones de Carolina del Norte donde hay déficits a largo plazo, caudales bajos y percentiles de humedad del suelo muy bajos.

En toda Florida, se produjeron degradaciones generalizadas debido a que las lluvias fueron dispersas y ligeras, con la mayoría de las áreas recibiendo menos de 0.5 pulgadas. La sequía extrema (D3) se expandió a través de partes del norte y sur de Florida, mientras que la sequía moderada (D1) y severa (D2) se expandió a través del Panhandle central. Los percentiles de humedad del suelo se mantienen por debajo del percentil 10 en gran parte del estado y por debajo del percentil 5 en partes del centro y sur de Florida. Los valores del índice de Sequía Keetch-Byram varían de 600 a más de 700 en varias áreas, lo que muestra un potencial de incendio de elevado a extremo. La actividad de incendios forestales aumentó durante la semana, y varios distritos de gestión del agua, incluido el Distrito de Gestión del Agua del Sur de Florida, han emitido avisos o advertencias de escasez de agua debido a la disminución de los niveles de agua subterránea y superficial.

## **Sur**

Las condiciones de sequía en el sur continuaron deteriorándose esta semana, ya que gran parte de la región recibió poca o ninguna precipitación significativa. La mayoría de las áreas registraron precipitaciones inferiores al 50 % de lo normal, y muchas localidades registraron precipitaciones inferiores al 25 % de lo normal. Algunas zonas del centro y noreste de Tennessee recibieron de 1,27 a 2,54 cm de precipitación, pero las cantidades fueron insuficientes para compensar los déficits de precipitación de 30 a 90 días. Se produjeron degradaciones en las llanuras del sur hasta el valle inferior del Misisipi, ya que los déficits de precipitación a corto y mediano plazo siguen aumentando en Luisiana, Arkansas y partes de Texas y Oklahoma, con muchas zonas de 5 a 15 cm por debajo de lo normal en los últimos meses. Los percentiles de humedad del suelo se mantienen por debajo de lo normal en gran parte de la región y son particularmente bajos en el centro de Luisiana, el sur de Arkansas y partes del oeste de Oklahoma y el sur de Texas. Los caudales de varias cuencas siguen estando por debajo de los promedios estacionales, con algunos pluviómetros en percentiles

bajos tras semanas de recarga limitada.

En el sur profundo de Texas, la sequa a largo plazo continua intensificandose. Del 14 de agosto de 2025 al 10 de febrero de 2026, Rio Grande City se clasifica como la quinta ciudad ms clida y la tercera ms seca registrada desde 1928, mientras que McCook se clasifica como la segunda ms clida y la sexta ms seca desde 1942, segn el NWS y la NOAA. Un sitio cercano de Texas Mesonet, cerca de Hebbronville, registr solo 9,6 cm en los ltimos 180 das, y otro sitio de Mesonet a lo largo de la frontera entre los condados de Starr y Jim Hogg registr 29,4 cm, con solo 8,4 cm de lluvia durante diciembre y enero combinados. Los dficits persistentes de precipitacin durante seis meses y el calor continuo intensificaron el estrs hidrolgico a largo plazo en la parte baja del Valle del Ro Grande.

## **Medio Oeste**

Fue otra semana seca en el Medio Oeste, con poca o ninguna precipitacin y temperaturas por debajo de lo normal. La capa de nieve continua en la zona norte y en partes de los Grandes Lagos, lo que mantiene los suelos congelados. Si bien la mayor parte del Medio Oeste se mantuvo sin cambios esta semana, se produjeron degradaciones generalizadas en partes de Illinois y Misuri, donde aumentaron los dficits de precipitacin de 3 a 6 meses, con bajos caudales y niveles de agua subternea por debajo de lo normal. En el centro y sur de Illinois, los niveles del nivel fretico se mantienen muy por debajo del percentil 10 en muchos sitios de monitoreo, y los arroyos fluyen cerca o por debajo de las normas estacionales. Dficits de precipitacin similares a corto y mediano plazo y la disminucin de los caudales apoyaron la expansin de la sequedad en partes de Misuri, incluidas las reas noroeste, centro-sur y sureste, con una intensificacin adicional cerca de la frontera entre Misuri y Arkansas, donde los dficits a largo plazo continan aumentando. Ms al norte y al oeste, se produjo una expansin localizada de la sequedad anormal (D0) en partes de Minnesota e Iowa, donde los sistemas meteorolgicos recientes en gran medida no se detectaron y los percentiles de humedad del suelo a corto plazo muestran sequedad.

## **Altas Llanuras**

Las Altas Llanuras vieron poca o ninguna precipitacin significativa esta semana, con la mayor parte de la regin recibiendo menos del 25 por ciento de lo normal y muchos lugares en o por debajo del 5 por ciento de la precipitacin normal. Cualquier nevada fue ligera y ofreci un beneficio mnimo de equivalente lquido. En el este de Wyoming y el este de Colorado, los dficits de precipitacin continan profundizndose con la disminucin de los percentiles de humedad del suelo, y las recientes temperaturas superiores a lo normal llevaron a la sequa donde la cubierta de nieve es limitada. Esto llev a la expansin de la sequa moderada (D1) y severa (D2) en partes del este de Wyoming y Colorado hacia el suroeste de Dakota del Sur, el Panhandle de Nebraska y las dunas de arena del oeste de Nebraska. De manera similar, los crecientes dficits de precipitacin a corto y mediano plazo, los percentiles de humedad del suelo por debajo de lo normal y la elevada demanda evaporativa llevaron a la introduccin de la sequa extrema (D3) en el Panhandle de Nebraska. El este de Nebraska tambin vio la expansin de la sequedad anormal (D0) ya que la falta de precipitacin ha llevado a condiciones de sequa.

En todo Kansas, las degradaciones ocurrieron principalmente en el noroeste, el sur y a lo largo de la frontera con Missouri en el este de Kansas después de otra semana seca que, como en el resto de la región, se sumó a los crecientes déficits de precipitaciones y al secado de la humedad del suelo.

## Oeste

Las precipitaciones en el oeste esta semana fueron escasas e irregulares. La mayoría de las zonas bajas de California, Nevada, Arizona, Utah y el oeste de Colorado recibieron poca o ninguna precipitación líquida medible, con totales de siete días generalmente inferiores a 0,25 a 0,50 pulgadas. Si bien cayó nieve en las montañas en partes del norte de las Montañas Rocosas y el noroeste del Pacífico, las acumulaciones fueron escasas e irregulares a nivel local. Los percentiles de la capa de nieve y el equivalente de agua de la nieve (EVA) se mantienen muy por debajo de lo normal en muchos sitios SNOTEL: gran parte de Oregón, Washington, Idaho, Montana, Wyoming y el oeste de Colorado muestran valores de EVA en el percentil 15 más bajo, con numerosos lugares en cifras de un solo dígito para esta poca del año.

Las temperaturas fueron superiores a lo normal en amplias zonas del interior del oeste, especialmente en la Gran Cuenca, el centro y este de Wyoming, y el norte de Colorado, donde las máximas diurnas superaron en ocasiones la media entre 5 y 15 grados. Estas temperaturas más cálidas limitaron la acumulación de nieve en algunas cuencas y contribuyeron a la desecación de la superficie donde la capa de nieve era escasa o inexistente.

En todo el noroeste del Pacífico, las precipitaciones aisladas ayudaron a mantener las condiciones existentes en partes del oeste de Washington, Oregón y el norte de California. Sin embargo, los bajos percentiles de SWE y la expansión de los déficits de precipitación a corto y mediano plazo llevaron a la expansión de la sequedad anormal (D0) y la sequía moderada localizada (D1) en Washington. A pesar de las precipitaciones de esta semana, las áreas de Montana aún experimentaron degradaciones donde los déficits de precipitación a corto y mediano plazo, los bajos percentiles de humedad del suelo y la escasa capa de nieve siguen siendo motivo de preocupación. En Utah, Nevada y el oeste de Colorado, los persistentes déficits de precipitación de 2 a 4 meses, combinados con la disminución de la humedad del suelo y percentiles muy bajos de SWE (sequía de nieve), llevaron a mayores degradaciones. Muchos sitios SNOTEL en las Montañas Rocosas centrales y la Gran Cuenca continúan reportando niveles por debajo del percentil 10 para la capa de nieve, y Colorado experimenta su peor capa de nieve registrada hasta la fecha, según Denver Water y 9NEWS.

## Caribe

Las condiciones de sequía en Puerto Rico se mantuvieron sin cambios esta semana. Otro frente frío atravesó la isla, trayendo lluvias beneficiosas a gran parte de Puerto Rico. Muchas localidades recibieron precipitaciones cercanas o superiores a lo normal, y los déficits de lluvia a corto plazo de los últimos 30 a 60 días se han eliminado en gran medida.

A pesar de las lluvias recientes, se mantuvieron dos zonas de sequedad anormal (D0). El Lago Cidra se mantiene en niveles de observación, y los pozos monitoreados por el USGS en partes

del sur de Puerto Rico siguen oscilando entre niveles de observacin y crticos.

En Santa Cruz, la mayora de las localidades volvieron a estar bastante hmedas esta semana. Segn las observaciones de CoCoRaHs, las precipitaciones oscilaron entre 1,67 cm en el centro-oeste de Santa Cruz y 8,79 cm en el este. En East Hill, se observaron 6,16 cm de lluvia. Las anomalas de precipitacin de los ltimos meses a un ao son mayoritariamente neutras o positivas. La profundidad del agua en el sitio de monitoreo del pozo no ha aumentado significativamente, aunque la reciente cada de los niveles del pozo parece haberse detenido en los ltimos 10 das aproximadamente. Dado el clima ms hmedo de las ltimas semanas y la compensacin de los dficits de lluvia a corto y largo plazo, las condiciones han mejorado a la normalidad en Santa Cruz. En San Juan, las precipitaciones reportadas oscilaron entre 3,7 y 6,59 cm. La profundidad del agua en el pozo Susannaberg aument un poco ms de 30 cm esta semana. Las anomalas de precipitacin de los ltimos meses a un ao estn ahora mayoritariamente cerca o por encima de lo normal. Gracias a la mejora del nivel del pozo y a la disminucin del dficit de lluvia, las condiciones en St. John han vuelto a la normalidad. En St. Thomas, las precipitaciones reportadas oscilaron entre 1,42 y 2,17 pulgadas esta semana. El mes pasado se registraron precipitaciones muy por encima de lo normal, aunque los ltimos tres meses siguen siendo ms secos de lo normal. El nivel del agua tambin ha aumentado entre 2 y 3 pies en el pozo de la Escuela Primaria 3 la semana pasada. Gracias a las recientes lluvias y a la mejora de las condiciones de las aguas subterrneas, pero con el dficit de lluvia que persiste al tercer mes, las condiciones en St. Thomas han mejorado hasta alcanzar una sequa anormal a corto plazo.

## **Pacífico**

Las condiciones empeoraron en algunas zonas del sur de Alaska esta semana. Se observ poca o ninguna nevada en partes del valle superior del ro Kuskokwim, donde las precipitaciones durante la semana pasada fueron mnimas, y en muchas localidades se registraron cantidades muy por debajo de lo normal. Como resultado, la sequa anormal (D0) se extendi hacia el noreste en el valle superior del ro Kuskokwim.

Ms al sur, se introdujo una pequea zona de sequa moderada (D1) al suroeste de McGrath. Los datos recientes de la anomala del equivalente de agua de nieve (EWA) de ERA5-Land muestran dficits continuos en esta zona, con una capa de nieve muy por debajo de las expectativas estacionales. Si bien las temperaturas fueron dispares en toda la regin, la ausencia de nevadas recientes, sumada a un EWA inferior a lo normal, contribuy a la degradacin prevista.

Hawái experimentó un periodo muy hmedo y ventoso esta semana, impulsado por fuertes vientos alisios persistentes que trajeron lluvia a lo largo de las laderas barlovento. Molokai, Maui y la Isla Grande registraron las precipitaciones ms altas, con precipitaciones generalizadas de entre 10 y 25 cm y cantidades aisladas cercanas a los 38 cm en las zonas ms bajas, segn el MRMS de la NOAA/NSSL. Además, se registraron fuertes nevadas en las zonas ms altas de la Isla Grande. Las precipitaciones superaron los 76 cm en Laupahoehoe, en la Isla Grande, y los 58 cm en Waikamoi, en Maui.

Como resultado, se lograron mejoras de una categoría en las zonas de barlovento de las islas,

donde las lluvias repetidas (y la nieve a gran altitud) propiciaron la recuperacin hidrolgica a corto plazo. Se reportaron impactos localizados debido a la saturacin de los suelos, incluyendo algunos deslizamientos de tierra e inundaciones, mientras que las zonas de sotavento se mantuvieron prcticamente sin cambios debido al continuo sombreado por las lluvias de los vientos alisios.

Samoa Americana se mantuvo libre de sequa o sequedad anormal esta semana. Pago Pago report al menos 3,31 pulgadas de lluvia esta semana, mientras que en la cresta Siufaga se registraron al menos 2,00 pulgadas y en la cresta Toa, 2,70 pulgadas.

Esta semana se reportaron al menos 40 mm de lluvia en Koror, con varios das de ausencia de datos. Palau se mantuvo sin sequa ni sequa anormal esta semana.

Las Islas Marianas se mantuvieron libres de sequa o sequedad anormal esta semana, ya que las cuatro islas monitoreadas recibieron suficiente lluvia. Guam report 9,75 mm de lluvia, Rota 4,89 mm, Tinian 5,88 mm y Saipn 4,71 mm.

Esta semana se desarroll una sequa anormal a corto plazo en Yap, donde cayeron 42 mm de lluvia, lo que marca la cuarta semana consecutiva con menos de 50 mm de lluvia. Sin embargo, dado que a principios de enero fue ms lluvioso, es probable que las condiciones an no se acerquen a una sequa moderada o ms severa. Woleai se mantuvo libre de sequa o sequa anormal esta semana, donde cayeron 26 mm de lluvia, tras los 76 mm de la semana pasada. Chuuk se mantuvo libre de sequa o sequa anormal, donde cayeron 62 mm de lluvia esta semana. Lukunor tambin se mantuvo libre de sequa o sequa anormal, donde cayeron 44 mm de lluvia esta semana. Dadas las ltimas tres semanas bastante secas en la zona, es probable que las condiciones se acerquen a una sequa anormal. Las condiciones se mantuvieron normales en Nukuoro, donde se reportaron 122 mm de lluvia esta semana. La sequa anormal a corto plazo continu en Kapingamarangi esta semana, aunque es probable que las condiciones hayan mejorado un poco debido a los 59 mm de lluvia cados all esta semana. Las condiciones normales continuaron en Pohnpei, donde se reportaron 119 mm de lluvia. La sequa moderada a corto plazo continu esta semana en Pingelap, donde solo se reportaron 1,1 mm de lluvia. Las condiciones en Kosrae se mantuvieron normales, con 7,9 mm de lluvia. No se registraron imgenes del Monitor de Sequa en Fananu ni en Ulithi debido a la falta de datos.

Las condiciones se mantuvieron normales en Kwajalein esta semana, donde se reportaron 4,6 cm de lluvia. Las condiciones tambin se mantuvieron normales en Ailinglaplap, donde cayeron 9 cm de lluvia esta semana despus de un par de semanas anteriores ms secas. En Jaluit, las condiciones se mantuvieron normales esta semana despus de caer 7,1 cm de lluvia. Las condiciones en Utirik se degradaron a una sequa severa de corta duracin, donde no se report lluvia esta semana. La sequa moderada de corta duracin tambin continu en Wotje, donde solo han cado 3,1 cm de lluvia en lo que va de febrero. Mili report 9,2 cm de lluvia esta semana, y las condiciones se mantuvieron normales all. Las condiciones tambin se mantuvieron normales en Majuro, donde cayeron 4,7 cm de lluvia esta semana.

## ***Mirando hacia el futuro***

Durante los próximos cinco a siete días (12-17 de febrero), se pronostica un patrón de precipitación activo y generalizado en gran parte del oeste y sur de los EE. UU. Los totales más fuertes se esperan desde el este de Texas hasta Arkansas, donde se pronostican cantidades generalizadas de 3 a 5 pulgadas, con totales localmente más altos posibles. Se esperan reas adicionales de 1 a 3 pulgadas en gran parte del valle inferior de Mississippi, la costa central del Golfo y en partes del sureste. Más al oeste, se pronostica precipitación generalizada en California, la Gran Cuenca y en las Montañas Rocosas centrales y del norte, donde se esperan totales de equivalente líquido de 1 a 3 pulgadas, con cantidades localmente más altas en terreno favorecido. Se pronostica precipitación más ligera pero aún significativa en partes del Medio Oeste y en partes del Atlántico Medio y el Noreste. Por el contrario, se espera que gran parte de las llanuras del norte permanezcan relativamente secas durante este período.

El pronóstico de temperaturas del Centro de Predicción Climática para los próximos 6 a 10 días (17-21 de febrero) favorece temperaturas superiores a lo normal en gran parte del centro y este de EE. UU., incluyendo las llanuras, el medio oeste, el valle de Ohio y el sureste. Las mayores probabilidades de temperaturas superiores a lo normal se concentran en las llanuras centrales y la parte baja del valle del Misisipi. En cambio, se prevén temperaturas inferiores a lo normal en gran parte de la costa oeste y partes de la Gran Cuenca. Alaska presenta temperaturas inferiores a lo normal en gran parte del territorio continental, mientras que Hawái también lo presenta.

El pronóstico de precipitación del CPC para los próximos 6 a 10 días (17-21 de febrero) indica precipitaciones superiores a lo normal en gran parte del oeste de Estados Unidos, incluyendo California, la Gran Cuenca y el norte y centro de las Montañas Rocosas. También se prevén precipitaciones superiores a lo normal en partes del norte de las Llanuras y el Alto Medio Oeste. En cambio, se prevén precipitaciones inferiores a lo normal en la franja sur, desde el sur de Texas hacia el este, atravesando la Costa del Golfo y llegando a Florida. Se prevé que gran parte del centro de Estados Unidos, incluyendo partes de los valles de Tennessee y Ohio, registre precipitaciones cercanas a lo normal durante este período.

## **Autor(s)**

Curtis Riganti, National Drought Mitigation Center

Lindsay Johnson, National Drought Mitigation Center