

# Resumen nacional de sequía para 17 febrero, 2026

## Resumen

Tras unas semanas clidas y secas, las fuertes precipitaciones regresaron a los estados de la costa oeste la semana pasada; sin embargo, las mayores cayeron en California, que est casi completamente libre de sequa. Al menos 1,5 pulgadas cayeron en gran parte del estado, incluyendo gran parte de la franja oeste, las zonas ms altas y los valles del norte. Cantidades mucho mayores cayeron en lugares aislados de mayor elevacin y orogrficamente favorecidos, con algunos puntos registrando cantidades cercanas a las 10 pulgadas (equivalente liquido). Se han acumulado varios pies de nieve en algunos puntos de la Sierra Nevada, pero en general la capa de nieve en esta zona se mantiene significativamente por debajo de lo normal. Otras reas desde el noroeste de California hacia el norte a travs de las Cascadas y puntos al oeste tambin registraron cantidades significativas de precipitacin, que van desde 0,5 hasta localmente 3,0 pulgadas. Cantidades similares estuvieron ms dispersas en el resto del interior del oeste, con los totales ms grandes confinados a las elevaciones ms altas. Hasta la maana del martes 17 de febrero, esta precipitacin no ha aumentado significativamente la capa de nieve en algunas reas con cantidades menores a lo normal, especficamente gran parte de las Cascadas, el centro-sur de Idaho, lugares dispersos en el oeste de Wyoming, gran parte del centro-oeste y suroeste de Colorado, secciones centrales de Utah y Nevada, y las Montaas Rocosas ms al sur.

Ms al este, se registraron precipitaciones moderadas de forma bastante generalizada en aproximadamente la cuarta parte sureste de los estados contiguos, al este de las Altas Llanuras y desde las Grandes Llanuras centrales, el valle inferior del Ohio y la regin del Atlntico medio hacia el sur. Se registraron precipitaciones ms intensas en zonas dispersas de las Grandes Llanuras centro-orientales y sudorientales, partes del valle inferior adyacente del Misisipi y algunas franjas estrechas del oeste del Panhandle de Florida y partes del norte de la pennsula. Al norte, se registraron precipitaciones ligeras dispersas con totales moderados aislados en el norte del estado de Nueva York y partes de Nueva Inglaterra. Otras zonas de las Altas Llanuras y la cuarta parte noreste de los estados contiguos registraron poca o ninguna precipitacin.

Se observaron algunas mejoras en las reas, ya sea debido a las precipitaciones de la semana pasada o a una reevaluacin de los efectos de tormentas anteriores. Especficamente, se observaron mejoras en el centro de Idaho, las Altas Llanuras del suroeste y partes de los valles de Tennessee, el bajo Ohio y el centro del Misisipi. Sin embargo, en general, se observ ms deterioro que mejora, incluyendo reas dispersas por la costa este, el bajo valle del Misisipi, el sur profundo, el alto medio oeste, el norte de las Altas Llanuras y el extremo sur de Texas. Hawi experiment mejoras en reas por segunda semana consecutiva, mientras que Alaska y la mayora de las zonas secas de Puerto Rico se mantuvieron sin cambios.

## Noreste

Pensilvania, el sur de Nueva Inglaterra y el noroeste de Maine registraron muy poca precipitacin, mientras que cantidades de ligeras a moderadas aisladas (hasta una pulgada)

humedecieron el norte del estado de Nueva York, el norte de Nueva Inglaterra y el este de Maine. En el extremo sur de la región, cayeron cantidades moderadas en Virginia Occidental y Maryland, con totales generalizados de 0,25 a 0,75 pulgadas. La precipitación fue insuficiente para justificar reas de mejora, por lo que la sequa en la Región Noreste en general se mantuvo igual con algunas reas de deterioro, particularmente en el centro y este de Pensilvania, la vecina Nueva Jersey y el sur de Nueva Inglaterra. Esto incluye la introducción de un rea de sequa extrema (D3) en el norte de Nueva Jersey. La precipitación total en los últimos 60 y 90 días es inferior a la mitad de lo normal en grandes franjas desde el Panhandle de Maryland hasta el sur y el centro-este de Pensilvania, junto con reas dispersas en Nueva Inglaterra y el sur de Nueva York.

## **Sureste**

En comparación con el noreste, las precipitaciones, de ligeras a moderadas, fueron mucho más generalizadas, especialmente desde el sur de Virginia hasta las Carolinas centrales, gran parte de Georgia y el norte de Florida, donde en muchos lugares se reportaron más de 0.5 pulgadas. Algunas reas de las Carolinas centrales y reas aisladas en el sur de los Apalaches, el centro de Georgia y la mitad norte de Florida reportaron de 1.5 a 2.0 pulgadas, pero debido a los déficits recientes, ninguna de estas reas recibió lo suficiente como para cambiar sustancialmente la intensidad de la sequa existente. En las reas más secas, especialmente la mitad sur de la península de Florida, la sequa se expandió e intensificó. El deterioro de una categoría se extendió al sur de los Apalaches y las colinas adyacentes, partes de las Carolinas orientales, el centro de Georgia y varias reas en toda Florida. Esto ha resultado en varias franjas extensas de sequa extrema (D3) desde el oeste de Carolina del Sur hacia el sur, con las reas más extensas extendiéndose desde el sur de Georgia hasta el centro de Florida y a través del sur de la península de Florida. Durante los últimos 3 meses, las precipitaciones totales fueron de 15 a 30 cm inferiores a lo normal en el suroeste de Carolina del Norte y reas adyacentes, con déficits de 10 a 20 cm comunes en el norte de Georgia y gran parte del resto de las Carolinas occidentales. Más al sur, en algunas zonas de la mitad sur de la península de Florida se reportaron menos de una cuarta parte de las cantidades normales durante los últimos 90 días.

## **Sur**

Fuertes precipitaciones (de 3 a 5 pulgadas localmente) cayeron en una franja a través del centro de Arkansas, mientras que se registraron de 1.5 a 3.0 pulgadas localmente desde el valle inferior del Río Rojo (sur) a través del nivel central de Arkansas hasta gran parte del oeste de Tennessee. Se observaron cantidades de moderadas a localmente fuertes en gran parte del lado oeste del valle inferior del Misisipi y partes del este de Texas. Se reportaron cantidades de varias décimas de pulgada a localmente alrededor de una pulgada en gran parte del centro y centro-norte de Texas, la mayor parte de Oklahoma al este del Panhandle, gran parte de Misisipi y el oeste de Alabama, y secciones del este de Tennessee. Poca o ninguna precipitación se reportó en los Panhandles de Texas y Oklahoma, el oeste de Texas y el sur profundo de Texas. Este patrón apoyó la mejora en la mitad occidental de Tennessee y reas más pequeñas de Arkansas y el noroeste de Misisipi, junto con puntos dispersos en el sur de

Oklahoma. El deterioro fue bastante común en las áreas que no recibieron la mayor parte de la precipitación de la semana, principalmente en el valle inferior del Misisipi, la región inmediata de ArkLaTex y el sur profundo de Texas. La intensificación de la sequía en esta última zona provocó la aparición de una sequía excepcional (D4) en partes de los condados de Jim Hogg y Brooks. La D4 ya existía en parte del interior del noreste de Arkansas y en los confines más meridionales del Big Bend de Texas. Mientras tanto, la sequía extrema (D3) se expandió para cubrir la mayor parte del centro-sur y el sur profundo de Texas, partes del centro-este de Luisiana y el área adyacente de Misisipi, partes del sur de Oklahoma y el noreste de Texas, la mayor parte del noreste de Arkansas y algunas áreas dispersas más pequeñas en el oeste de Arkansas y el noreste de Oklahoma. Durante los últimos 90 días, han caído menos de 5 cm de precipitación en el oeste de Oklahoma, el Panhandle de Texas y la franja suroeste de Texas, desde el Big Bend hasta gran parte del sur profundo de Texas.

## **Medio Oeste**

La semana pasada, las zonas central y norte del Medio Oeste estuvieron prácticamente sin precipitaciones, lo que provocó cierto deterioro en el Alto Medio Oeste, desde el norte de Illinois, pasando por Iowa, hasta el sur de Minnesota. Más al sur, cayeron precipitaciones de leves a moderadas (hasta 2,54 cm) en la parte media y baja del valle de Ohio y el adyacente valle del Misisipi, con precipitaciones totales más intensas (entre 3,81 y 7,62 cm, localmente) en el centro y sur de Misuri. Este patrón provocó mejoras en una franja que abarca desde el centro y sur de Misuri hasta el sur de Illinois y el oeste de Kentucky.

## **Altas Llanuras**

Precipitaciones moderadas a localmente fuertes cayeron en parte del este de Kansas, y cantidades dispersas, de ligeras a moderadas, cayeron en el resto de la franja sur de la Región. Sin embargo, más al norte, la escasez de precipitaciones provocó extensas áreas de degradación en gran parte de Wyoming y del centro al este de Montana, con un deterioro más limitado en partes de Nebraska y Dakota del Sur. Esto resultó en una sequía moderada o peor que cubrió una franja que abarca la mayor parte de Nebraska y áreas adyacentes hacia el oeste, atravesando la mayor parte de Wyoming y las secciones norte, central y oeste de Colorado. La sequía severa (D2) o peor se extendió desde el oeste de Nebraska, a través de la franja sur de Wyoming, hasta las partes norte y central de Colorado.

## **Oeste**

Las fuertes precipitaciones fueron bastante generalizadas en California, que actualmente está casi completamente desprovista de cualquier grado de sequedad o sequía. En otras partes, se introdujo un deterioro generalizado en el centro y este de Montana, dejando a la mayor parte del estado arraigado en una sequedad anormal a una sequía severa (D0 a D2), con un área de sequía extrema en partes del centro-norte de Montana. En otros lugares, solo se hicieron ajustes menores ya que cayeron precipitaciones de ligeras a moderadas en una gran parte de las áreas de sequedad y sequía, suficientes para evitar un deterioro generalizado, pero no

suficientes para justificar una mejora significativa. Solo algunas partes del centro y centro-sur de Nuevo Mxico mejoraron, principalmente por los efectos de las precipitaciones anteriores a la semana pasada. La sequa severa a extrema (D2-D3) ahora se extiende por la mayor parte de la mitad occidental de Nuevo Mxico, la zona adyacente de Arizona, el centro y norte de Utah, partes del norte y suroeste de Idaho y partes del noroeste del Pacfico al este de las Cascadas.

## **Caribe**

Se registraron lluvias moderadas a localmente fuertes en reas relativamente extensas del estado, pero solo la franja este del interior del rea D0 registr suficiente precipitacin para terminar con las condiciones D0. La mayora de las reas D0 se mantuvieron sin cambios con respecto a la semana pasada.

Despus de una semana hmeda, las condiciones se secaron en las Islas Virgenes de los Estados Unidos, y todas las islas informaron totales semanales de precipitacin por debajo de lo normal. En St. John, Rafe Boulon/Windswept Beach inform 0,59 pulgadas de lluvia. A pesar del total ms bajo, St. John permanece libre de sequa y sequedad anormal. Los niveles de agua subternea en el pozo Susannaberg DPW 3 estaban a 11,97 pies por debajo de la superficie terrestre el 17 de febrero. El anlisis muestra un descenso constante desde el 19 de octubre, cuando el nivel era de 7,56 pies, aunque ha habido una ligera recuperacin este mes en comparacin con los 12,97 pies informados el 2 de febrero. Durante el ltimo ao, el nivel del agua ha bajado aproximadamente 4,5 pies (de 7,46 pies el 17 de febrero de 2025). Casi todas las escalas de tiempo del SPI indican condiciones hmedas, especialmente el valor de 1 mes, aunque el SPI de 6 meses mostr cierta sequedad. No se reportaron precipitaciones mensurables en Santa Cruz (Aeropuerto Henry Rohlsen) esta semana, pero la isla permanece libre de sequa y sequedad anormal debido a las precipitaciones superiores a lo normal en las semanas anteriores. La profundidad del agua en el pozo Adventure 28 fue de 19,72 pies por debajo de la superficie terrestre el 17 de febrero. El anlisis de las aguas subterneas muestra una disminucin constante de 5,8 pies desde el 27 de mayo de 2025 (cuando el nivel era de 13,91 pies), y una cada de 3,3 pies en comparacin con esta misma poca el ao pasado (16,39 pies el 17 de febrero de 2025). Los valores del SPI de 1, 3 y 6 meses confirman las condiciones hmedas en la isla, mientras que las escalas de tiempo ms largas muestran seales ms secas. En Santo Toms, el Aeropuerto Cyril E. King report un total de lluvia de 0,73 pulgadas. La profundidad del agua en el pozo de la Escuela Primaria 3 fue de 1,98 m por debajo de la superficie terrestre el 17 de febrero. Esto representa una disminucin de 1,28 m respecto al mximo de 365 das de 62,4 m registrado el 19 de octubre de 2025. Sin embargo, es solo 20,3 m menor que el nivel del agua de hace un ao (1,78 m el 17 de febrero de 2025). Los valores del SPI fueron mixtos, mostrando condiciones ms hmedas en el periodo de un mes, pero condiciones secas en el de tres meses (no se dispona de otras escalas de tiempo). En consecuencia, Santo Toms permanece en sequedad anormal a corto plazo (D0-S) esta semana.

## **Pacífico**

Las condiciones en Alaska se mantuvieron sin cambios esta semana, con pequeñas áreas de sequía moderada observadas en parte del centro-oeste y el interior del suroeste de Alaska, mientras que D0 cubre áreas considerablemente más grandes desde la parte noroeste inferior del estado hasta localidades del centro-sur, incluida parte del área de Anchorage.

Las precipitaciones superaron las 3 pulgadas en algunas zonas de Oahu y en algunas zonas de barlovento y elevaciones más altas de otras zonas. Otras localidades registraron precipitaciones cercanas o ligeramente inferiores a lo normal, pero el exceso de precipitaciones que afectó a numerosas localidades la semana anterior provocó mejoras adicionales en algunas zonas del estado. En concreto, se introdujeron mejoras adicionales de categoría 1 en gran parte de la franja noreste de la Isla Grande, las zonas noreste y oeste de Maui, y en zonas más pequeñas del centro de Maui, el este de Molokai y el sur de Oahu. Esto incluye la eliminación de cualquier designación de sequía en pequeñas zonas del noreste de Maui y la Isla Grande, lo que marca la primera vez desde finales de marzo que una zona de Maui ha salido de la sequía, y la primera vez desde finales de agosto en la Isla Grande.

Esta semana, las condiciones fueron secas en Samoa Americana. Pago Pago reportó un total semanal de lluvia de 0,40 pulgadas, mientras que Toa Ridge y Siufaga Ridge reportaron 0,26 y 0,37 pulgadas, respectivamente, con varios días sin registrar.

Palau se mantuvo libre de sequía o sequedad anormal esta semana. El sitio web COOP de Koror reportó un total semanal de lluvia de 5,3 cm (con dos días de ausencia) y un total mensual de 16,9 cm hasta el 15 de febrero.

Esta semana, las condiciones fueron más secas de lo normal en las Islas Marianas. Rota, Guam, Tinian y Saipan registraron precipitaciones semanales totales de 2,1 cm, 1,4 cm, 1,1 cm y 2,3 cm, respectivamente. Si bien estas cantidades fueron inferiores al umbral mínimo de una pulgada para cubrir las necesidades hídricas de la isla, las Marianas se mantuvieron libres de sequía y sequedad anormal debido a las condiciones húmedas de las semanas anteriores.

Las condiciones fueron mixtas en los Estados Federados de Micronesia esta semana. Nukuoro y Pohnpei informaron cantidades semanales de lluvia de 5,24 pulgadas y 2,35 pulgadas, respectivamente, y ambas localidades se mantuvieron libres de sequía y sequedad anormal. Varias localidades, incluyendo Chuuk (1,15 pulgadas), Woleai (1,09 pulgadas), Kosrae (1,04 pulgadas) y Lukunoch (0,51 pulgadas), informaron totales de lluvia (cada una con 1 día faltante) por debajo del umbral mínimo de 2 pulgadas necesario para las necesidades de agua; sin embargo, estas localidades se mantuvieron libres de sequía y sequedad anormal debido a condiciones húmedas previas. Kapingamarangi informó 2,80 pulgadas esta semana, pero se mantuvo en sequedad anormal a corto plazo (D0-S) debido a los déficits de precipitación de las semanas secas anteriores. Pingelap informó solo 0,02 pulgadas de lluvia y permanece en sequía moderada a corto plazo (D1-S). Los datos de Fananu y Ulithi fueron insuficientes para hacer ninguna evaluación esta semana.

Condiciones secas prevalecieron en la mayor parte de la República de las Islas Marshall esta semana, ya que todas las islas informaron totales semanales de lluvia por debajo del umbral mínimo de dos pulgadas para las necesidades de agua. A pesar de los totales bajos (y con algunas ubicaciones que faltan un día de datos), Jaluit (1,19 pulgadas), Ailinglapalap (0,54 pulgadas), Kwajalein (0,28 pulgadas), Mili (0,16 pulgadas) y Majuro (sin lluvia reportada)

permanecieron libres de sequa y sequedad anormal debido a la precipitacin por encima de lo normal recibida en las semanas anteriores. Con base en la precipitacin reciente y los totales de lluvia de las semanas y meses anteriores, Utirik inform 1,18 pulgadas esta semana y permaneci en sequa severa de corta duracin (D2-S). Mientras tanto, las condiciones continuaron deteriorndose en Wotje, que inform solo 0,12 pulgadas para la semana y un total de lluvia mensual hasta la fecha de 1,34 pulgadas. Por estas razones, Wotje fue degradado a sequa severa de corta duracin (D2-S) esta semana.

### ***Mirando hacia el futuro***

Las precipitaciones ms intensas se pronostican en los prximos das a lo largo y cerca de parte de la Costa Oeste, con al menos 2 pulgadas esperadas en el noroeste de California, las Cascadas del sur y la Sierra Nevada central y septentrional. Pueden caer hasta 7 pulgadas en elevaciones altas aisladas, la mayora o la totalidad de las cuales seran nieve. Mientras tanto, se pronostican cantidades moderadas a intensas (0,5 a 2,0 pulgadas) en Washington y Oregn desde las Cascadas hacia el oeste. Se pronostican cantidades similares para el norte de los Grandes Lagos y la mayora de las ubicaciones desde el sur profundo hasta el centro de Nueva Inglaterra, con cantidades menores esperadas en gran parte del centro y norte de las Carolinas. Hay mucha incertidumbre en esta rea, dependiendo del desarrollo y la trayectoria de un sistema de tormentas de la Costa Este que podra afectar el Atlntico medio y el noreste inferior durante el fin de semana. Se anticipan totales de ligeros a moderados en gran parte del interior del oeste, incluyendo la Gran Cuenca, gran parte del norte del Oeste Intermontano y las elevaciones ms altas de las Montaas Rocosas. Se esperan varias dcimas de pulgada en la parte baja de los Grandes Lagos, la parte media y baja del valle del Ohio, y la ladera este del valle bajo del Misisipi. Se esperan escasas o nulas precipitaciones en las llanuras del norte y sur, el sur de Florida y el norte de Maine. Se esperan temperaturas superiores a lo normal desde el suroeste hasta la mayor parte de las llanuras, con temperaturas promedio de entre 5 y 11 F por encima de lo normal en muchas localidades. Por el contrario, se pronostican temperaturas inferiores a lo normal en las llanuras ms septentrionales, donde las mximas diarias podran promediar hasta 9 F por debajo de lo normal. Mientras tanto, se esperan anomalas promedio de 5 das de entre -2 y -5 F en el norte de California, as como en el valle del Ohio y en muchas localidades ms al este.

El pronstico de 6 a 10 das para el 24 al 28 de febrero muestra mayores probabilidades de precipitaciones por debajo de lo normal en gran parte de la franja sur de los EE. UU. contiguos, desde el extremo sur de las Montaas Rocosas hasta la costa central del Golfo y la mayor parte de Florida. Las probabilidades de sequedad anormal superan el 40 por ciento en la mayor parte de Texas y algunas reas adyacentes. Ms al norte, se favorecen, al menos nominalmente, precipitaciones ms intensas de lo normal desde el Atlntico medio, el sur de los Apalaches, las llanuras centrales y el desierto del suroeste hacia el norte hasta la frontera con Canad. Las probabilidades de un clima inusualmente inestable superan el 60 por ciento en el centro y norte de California, y superan el 50 por ciento en el centro de California hacia el norte en el oeste de Washington y Oregn, as como en la parte media y baja del valle de Ohio. En Alaska, se favorecen condiciones ms secas de lo normal en las partes occidentales del estado, mientras que es ms probable que haya cantidades excedentes en las reas orientales. En todo

Hawái, se favorecen marginalmente cantidades superiores a lo normal en todo el estado. Mientras tanto, se espera que el clima más cálido de lo normal predomine en los 48 estados contiguos, desde los Apalaches hasta el Oeste Intermontano, con probabilidades de temperaturas significativamente más altas de lo normal que superan el 80 % en el oeste de Texas. Las zonas con temperaturas ligeramente inferiores a lo normal se limitan a la costa oeste al oeste de las Cascadas y a gran parte de la península de Florida. La mayor parte de Alaska presenta probabilidades considerablemente mayores de un clima inusualmente frío, que superan el 70 % en el suroeste del estado. En contraste, las condiciones más cálidas de lo normal son algo más probables en Hawái, especialmente en Kauai, Oahu y el sur de la Isla Grande.

## **Autor(s)**

Richard Tinker, NOAA/NWS/NCEP/CPC

Rocky Bilotta, NOAA/NCEI