

Resumen nacional de sequía para 24 febrero, 2026

Resumen

El clima tormentoso y brevemente ms fro en California y otras partes del oeste ayud a mejorar la previamente escasa capa de nieve en las montaas, con un promedio de aproximadamente 6 pulgadas de equivalente de nieve en agua que se agreg a la Sierra Nevada. Sin embargo, los totales de nevadas de 4 a 8 pies en la Sierra Nevada tambin provocaron interrupciones en los viajes a travs de los pasos de montaa y contribuyeron a la avalancha ms mortal del pas, al noroeste del lago Tahoe, en 45 aos. Mientras tanto, la seccin media del pas enfrent varios das con un calor rcord y vientos racheados. Partes de las Altas Llanuras centrales y meridionales sufrieron una serie de incendios forestales, que comenzaron el 17 de febrero, con el ms grande, el incendio de Ranger Road, que consumi rpidamente ms de 280,000 acres de vegetacin curada en el noroeste de Oklahoma y el suroeste de Kansas. Los informes iniciales indicaron que tambin hubo prdidas de ganado y destruccin de propiedades. En contraste, varias rondas de tormentas afectaron el este de EE. UU., culminando en una ventisca de finales de invierno a lo largo de la costa atlntica central y norte los das 22 y 23 de febrero. La tormenta invernal deposit ms de 30 centmetros de nieve en las principales ciudades de la costa este, desde Filadelfia hasta Boston, con un rcord de 97,5 centmetros en Providence, Rhode Island, para una sola tormenta. Anteriormente, el 19 de febrero se produjo un brote de clima severo a principios de temporada, con hasta una docena de tornados reportados en Illinois e Indiana.

Noreste

En la franja sur del noreste, una tormenta invernal del 22 al 23 de febrero fue precedida por lluvias que aliviaron la sequa. La combinacin de estos eventos provoc mejoras de hasta una categora de sequa, ya que los totales de precipitacin en 7 das superaron los 5 cm en muchos lugares. Al norte de la ciudad de Nueva York, la nevada fue mucho ms polvorienta, con valores de equivalencia en agua en gran medida inferiores a 2,5 cm, a pesar de las fuertes acumulaciones. Adems, las fuertes precipitaciones no avanzaron mucho tierra adentro, lo que dej las condiciones de sequa en statu quo en gran parte del noreste.

Sureste

Solo Virginia experiment una mejora generalizada de la sequa, ya que la tormenta costera del 22 y 23 de febrero estuvo precedida por lluvias significativas. Sin embargo, ms al sur, las rachas de lluvia intensa solo proporcionaron una mejora localizada. Los chaparrones no afectaron a muchas zonas, lo que provoc un lento empeoramiento de las condiciones de sequa. Varios incendios forestales en el sureste se han declarado en los ltimos das, y para el 24 de febrero, el Incendio Nacional haba calcinado 25,000 acres en el condado de Collier, Florida, en la Reserva Nacional Big Cypress. Se han desarrollado focos de sequa extrema (D3) en todo el sureste, especialmente en el sur de Florida y el sur de Georgia/norte de Florida, pero extendindose hasta las Carolinas.

Sur

Las Altas Llanuras del sur sufrieron un día histórico de viento e incendios forestales el 17 de febrero, cuando se desató el incendio de Ranger Road en el condado de Beaver, Oklahoma. El incendio de Ranger Road pronto quemó más de 280,000 acres de pasto y maleza, expandiéndose al noroeste del condado de Harper, Oklahoma, y partes de tres condados en el suroeste de Kansas. Mientras tanto, el incendio de Lavender quemó más de 18,000 acres al noreste de Vega, Texas, y, según se informa, destruyó al menos 18 estructuras. El 17 de febrero, el día del incendio, las ráfagas máximas incluyeron 73 mph en Lubbock, Texas, y 67 mph en Guymon, Oklahoma. Debido al deterioro de las condiciones y la disminución de las reservas de humedad de la capa superficial del suelo, se introdujo una sequía moderada (D1) en el norte y oeste de Oklahoma y la franja norte de Texas. Más al este, también se observó un empeoramiento gradual de las condiciones de sequía desde la región occidental de la Costa del Golfo hasta el Delta del Misisipi, con la introducción de varias nuevas áreas de sequía extrema (D3) y la expansión de otras. La cobertura de la sequía excepcional (D4) aumentó ligeramente en el sur de Texas.

Medio Oeste

Siguiendo una tendencia reciente, la mejora de las condiciones de sequía en las cercanías de los Grandes Lagos contrasta con la sequía persistente más al sur y al oeste. En particular, la sequía extrema irregular (D3) persistió desde el sur de Misuri hasta el noroeste de Ohio. Algunas localidades del valle bajo de Ohio y áreas vecinas podrán completar pronto su invierno meteorológico más seco (periodo diciembre-febrero) registrado. Del 1 de diciembre al 24 de febrero, la precipitación en Paducah, Kentucky, totalizó 8,21 mm, apenas el 28 % de lo normal. Se observaron totales aún más bajos en lo que va de temporada en Springfield, Misuri (8,94 mm); Carbondale, Illinois (6,35 mm); Poplar Bluff, Misuri (6,22 mm); Joplin, Misuri (5,44 mm); Gape Girardeau, Misuri (5,22 mm); y West Plains, Misuri (4,44 mm).

Altas Llanuras

Se observó un deterioro gradual de la sequía en varias zonas, excepto Dakota del Norte, que permanece libre de ella. En Nebraska, un invierno mayormente seco y ventoso afectó negativamente al trigo de invierno, que a finales de enero se calificaba en tan solo un 24 % en condiciones buenas o excelentes, frente al 54 % a finales de noviembre de 2025. Las nevadas que cubrieron partes de Nebraska el 19 de febrero solo aliviaron temporalmente la sequía general. Más al sur, partes de Kansas y Colorado sufrieron fuertes vientos, incendios de pastizales y polvo, especialmente el 17 de febrero. Ese mismo día, las ráfagas de viento en Colorado alcanzaron los 127 km/h en Colorado Springs, los 116 km/h en Burlington y los 114 km/h en Pueblo. Al sur de Pueblo, en la I-25, se produjeron colisiones en cadena debido a la baja visibilidad en medio de la polvo, que provocaron cinco muertes e involucraron a aproximadamente tres docenas de vehículos.

Oeste

Hubo pocos cambios generales en el oeste, ya que la mayoría de las fuertes precipitaciones cayeron en reas, como el norte y el centro de California, que actualmente no experimentan sequa. Ms al interior, breves rfagas de precipitacin en reas afectadas por la sequa evitaron que las condiciones empeoraran, pero proporcionaron poco alivio general. En la cordillera Wasatch de Utah, Alta recibí 31.2 pulgadas de nieve en un periodo de 24 horas el 17 y 18 de febrero, pero probablemente terminar el mes con nevadas por debajo del promedio. La equivalencia de agua de nieve por debajo del promedio sigue siendo una preocupacin en gran parte del oeste, incluso en reas libres de sequa como Sierra Nevada. Segn el Departamento de Recursos Hdricos de California, el manto de nieve de Sierra Nevada contena una equivalencia de agua de nieve promedio de 16 pulgadas, aproximadamente 6 pulgadas ms que a principios de mes, pero menos de tres cuartas partes de lo normal para fines de febrero. En gran parte de Arizona, Nuevo Mxico y Oregón, los valores de equivalencia de agua de nieve fueron inferiores al 50 por ciento de lo normal.

Caribe

En Puerto Rico, cualquier actividad significativa de lluvias evit las reas existentes de sequedad anormal (D0), por lo que no hubo cambios.

Las precipitaciones variaron en las Islas Vrgenes de los Estados Unidos esta semana. Aunque las cantidades fueron bajas, febrero es histricamente uno de los meses ms secos del ao para el territorio. En St. John, Rafe Boulon/Windswept Beach report 0.10 pulgadas de lluvia, lo que elev el total mensual de febrero hasta la fecha a 3.30 pulgadas al 23 de febrero, muy por encima de la media mensual. A pesar del bajo total semanal, St. John permanece libre de sequa y sequedad anormal. Los niveles de agua subternea en el pozo Susannaberg DPW 3 estaban 12.32 pies por debajo de la superficie terrestre el 24 de febrero. El anlisis muestra un descenso constante desde el 19 de octubre, cuando el nivel era de 7.56 pies, aunque ha habido una ligera recuperacin a principios de este mes en comparacin con los 12.97 pies reportados el 2 de febrero. Durante el ltimo ao, el nivel del agua ha bajado aproximadamente 4.33 pies (de 7.99 pies el 24 de febrero de 2025). El SPI de 1 mes indic condiciones hmedas en la isla, mientras que los valores del SPI de 9 y 12 meses muestran humedad. Por el contrario, el de 3 y 6 meses muestra una ligera seal seca. No se reportaron precipitaciones mensurables en St. Croix (Aeropuerto Henry Rohlsen) esta semana, pero la isla permanece libre de sequa y sequedad anormal debido a otros indicadores, incluidos el ndice de salud de la vegetacin y los valores del SPI. St. Croix La profundidad del agua en el pozo Adventure 28 fue de 19.84 pies debajo de la superficie terrestre el 24 de febrero. El anlisis de aguas subterneas muestra una disminucin constante de 5.93 pies desde el 27 de mayo de 2025 (cuando el nivel era de 13.91 pies) y una cada de 3.04 pies en comparacin con esta poca el ao pasado (16.80 pies el 24 de febrero de 2025). Los valores del SPI de 1, 3 y 6 meses confirman las condiciones hmedas en la isla, mientras que las escalas de tiempo ms largas muestran seales ms secas. En St. Thomas, el Aeropuerto Cyril E. King report un total de lluvia de 0.05 pulgadas, con un total de febrero hasta la fecha de 2.94 pulgadas al 23 de febrero. Este total est muy por encima del normal de 1.90 pulgadas para el mes. La profundidad del agua en el pozo de la Escuela Primaria 3 fue de 6.81 pies debajo de la superficie terrestre el 24 de

febrero. Esto es 4.76 pies menos que el máximo de 365 días de 2.05 pies registrado el 19 de octubre de 2025; sin embargo, es solo 0.75 pies más bajo que el nivel del agua de hace un año (6.06 pies el 24 de febrero de 2025). Los valores de SPI fueron mixtos, mostrando condiciones húmedas en la escala de tiempo de 1 mes, pero condiciones ligeramente secas en la escala de tiempo de 3 meses (otras escalas de tiempo no estaban disponibles). Gracias a los totales de precipitación mensual, SPI de 1 mes y datos de VHI, la sequedad anormal a corto plazo (D0-S) se eliminó de St. Thomas esta semana.

Pacífico

El clima tormentoso en algunas partes de Alaska provocó la eliminación de dos zonas de sequía moderada (D1): una en el noroeste y otra en el suroeste. La cobertura de las zonas circundantes de Alaska con sequía anormal (D0) se redujo ligeramente. Aunque no se encuentra en una zona con D0, Fairbanks recibió 98,5 cm de nieve (con un equivalente en agua de 5,7 cm) durante los primeros 24 días de febrero. El febrero con más nieve en Fairbanks fue el de 1966, con 109,5 cm.

En Hawái, una tormenta invernal (la baja presión de Kona) se acercó lo suficiente al archipiélago como para provocar inundaciones en Oahu y lluvias dispersas, convirtiéndose en lluvias generalizadas en otras zonas. Del 20 al 22 de febrero, los totales de lluvia en cuarenta y ocho horas superaron los 50 cm en algunas zonas de Oahu. En las zonas de Oahu con sequía anormal (D0) y sequía moderada (D1), se introdujeron mejoras de una categoría. Aunque las lluvias intensas localizadas se extendieron por los condados de Maui y Hawái, la cobertura de lluvia no fue lo suficientemente extensa como para generar una mejora generalizada, salvo por una reducción de la cobertura D0 en las zonas barloventadas de Maui y Molokai.

Esta semana, la sequía persistió en Samoa Americana. Pago Pago registró un total semanal de precipitaciones de 1,53 pulgadas, mientras que Toa Ridge y Siufaga Ridge registraron 3,27 y 1,17 pulgadas, respectivamente. En Pago Pago, esta es la tercera semana consecutiva en la que las precipitaciones totales cayeron por debajo del umbral mínimo de 2 pulgadas necesario para cubrir las necesidades hídricas. Además, el total de precipitaciones acumulado mensual de 4,24 pulgadas (al 24 de febrero) está muy por debajo de las precipitaciones normales para este período (11,89 pulgadas). Por estas razones, Pago Pago se degradó a sequía anormal de corta duración (D0-S) esta semana.

Palau se mantuvo libre de sequía o sequedad anormal esta semana. El sitio COOP de Koror reportó un total semanal de lluvia de 2,61 pulgadas y un total mensual de 9,10 pulgadas hasta el 24 de febrero.

Esta semana, las condiciones fueron más húmedas de lo normal en la mayoría de las Islas Marianas. Saipan, Rota y Tinian registraron precipitaciones semanales totales de 10,2 cm, 8,3 cm y 4,8 cm, respectivamente, muy por encima del umbral mínimo de 2,5 cm para cubrir las necesidades hídricas de las islas. Guam recibió 1,9 cm. Si bien esta cifra fue inferior al umbral semanal, las precipitaciones totales acumuladas en lo que va del mes superan aproximadamente un 190 % lo normal en Guam. Las Marianas se mantuvieron libres de sequía y sequedad anormal esta semana.

condiciones fueron mixtas en los Estados Federados de Micronesia esta semana. Kosrae, Chuuk y Pohnpei informaron cantidades semanales de lluvia de 8,70, 2,81 y 2,60 pulgadas, respectivamente, y se mantuvieron libres de sequa y sequedad anormal. Nukuoro inform un total semanal de lluvia de 1,44 pulgadas. Aunque esto es por debajo del umbral mínimo de dos pulgadas necesario para las necesidades de agua, Nukuoro se mantuvo libre de sequa y sequedad anormal debido a las condiciones húmedas previas. La sequedad anormal a corto plazo (D0-S) se eliminó de Kapingamarangi después de recibir 3,59 pulgadas esta semana y debido a la humedad de las semanas anteriores. En Yap, la sequedad anormal a corto plazo persistió, con 1,97 pulgadas de lluvia reportadas esta semana. Las condiciones secas también persisten en Lukunoch, que informó un total semanal de lluvia de 1,72 pulgadas. Debido a varias semanas de precipitación por debajo del umbral mínimo semanal, se agregó sequa anormal a corto plazo (D0-S) a Lukunoch esta semana. Los datos de Pingelap, Woleai, Fananu y Ulithi fueron insuficientes para realizar evaluaciones esta semana.

Las cantidades de precipitación variaron en la República de las Islas Marshall esta semana. Ailinglapalap (con dos días faltantes) reportó 5,07 pulgadas y permanece libre de sequa y sequedad anormal. Varias localidades, incluyendo Kwajalein (1,47 pulgadas), Mili (1,60 pulgadas), Majuro (1,01 pulgadas con un día faltante) y Jaluit (0,82 pulgadas con un día faltante), reportaron totales de lluvia por debajo del umbral mínimo de dos pulgadas necesario para satisfacer las necesidades de agua; sin embargo, estas localidades permanecieron libres de sequa y sequedad anormal debido a condiciones previamente húmedas. Las condiciones secas persistieron en Wotje y Utrik, que reportaron totales semanales de lluvia de 0,67 pulgadas y 0,06 pulgadas, respectivamente. La sequa severa a corto plazo (D2-S) continúa en Wotje y Utrik debido a que varias semanas y meses consecutivos permanecen por debajo del umbral mínimo de dos pulgadas para las necesidades de agua.

Mirando hacia el futuro

Perturbaciones de rápida propagación y poco organizadas atravesarán el país durante los próximos 5 días. Algunas de las precipitaciones más intensas, localmente de 2,5 a 5 cm o más, deberán caer en el sureste, principalmente hasta el viernes. Las lluvias beneficiosas persistirán durante el fin de semana en la península de Florida. En contraste, el clima seco prevalecerá durante los próximos 5 días en el cuadrante suroeste del país, desde el sur de California hasta las Altas Llanuras del centro y sur. Un calor récord acompañará el clima seco, con temperaturas que habitualmente superarán los 32 °C en el sur de Texas y el desierto del suroeste. Más al norte, una nueva columna de humedad del Pacífico llegará el sábado al sur de Oregón y el norte de California. Esa humedad se desplazará hacia el este, provocando precipitaciones invernales para el domingo y el lunes desde las llanuras centrales hasta el Atlántico medio, incluyendo el valle de Ohio y las regiones vecinas.

El pronóstico del NWS para los próximos 6 a 10 días, del 3 al 7 de marzo, indica la probabilidad de un clima más cálido de lo normal en todo el país, con la excepción de temperaturas cercanas o inferiores a lo normal en algunas zonas de Nueva York y gran parte de Nueva Inglaterra. Mientras tanto, las precipitaciones cercanas o superiores a lo normal en la mayor parte del país deberán contrastar con condiciones más secas de lo normal en la costa de Carolina del Norte y

partes del Lejano Oeste, incluyendo California y la Gran Cuenca occidental.

Autor(s)

Richard Tinker, NOAA/NWS/NCEP/CPC

Rocky Bilotta, NOAA/NCEI