

Resumen nacional de sequía para 3 marzo, 2026

Resumen

Desde principios de diciembre de 2025, la sequa se expandi e intensific en el valle bajo del Misisipi y las Grandes Llanuras del Sur, algo tpico durante un invierno con La Nia. Las precipitaciones, muy necesarias a finales de febrero, produjeron pequeas mejoras en partes del sureste y tambien estabilizaron, al menos brevemente, el estado de sequa en esta regin. Se ha declarado una sequa generalizada, de severa a extrema, en gran parte de las Carolinas, Georgia, el sureste de Alabama y Florida. Una sequa a largo plazo continua afectando la regin del Atlntico Medio y partes del Noreste. El invierno inusualmente seco persisti en el Medio Oeste hasta finales de febrero, con degradaciones adicionales la semana pasada. Estas condiciones de sequa, que empeoran, se extienden al oeste hasta las Grandes Llanuras Centrales, junto con las Montaas Rocosas del centro y norte. La acumulacin de nieve por debajo de lo normal sigue siendo una gran preocupacin para el oeste de cara a la primavera. La cobertura de sequa disminuy en Hawi durante las ltimas semanas, mientras que Alaska y Puerto Rico se mantuvieron libres de sequa.

Noreste

Desde la tormenta del noreste del 22 y 23 de febrero, ha habido poca o ninguna precipitacin en el noreste. Un consenso sobre las mtricas meteorolgicas e hidrolgicas de sequa en diversas escalas de tiempo respalda la descripcin actual de Dx. Por lo tanto, la cobertura e intensidad de la sequa se mantuvieron estables la semana pasada. Los dficits de precipitacin a 12 y 24 meses superan los 20 y 40 cm, respectivamente, en partes del Atlntico Medio y Nueva Inglaterra. La sequa, de severa (D2) a extrema (D3), continua en partes de Nueva Inglaterra, el norte de Nueva Jersey y del este al sur de Pensilvania. Los caudales promedio de 28 das se mantienen bajos (por debajo del percentil 10) en gran parte del Atlntico Medio Norte.

Sureste

Las fuertes lluvias (de 1 a 3 pulgadas, localmente ms) resultaron en mejoras de 1 categoria en partes de Alabama, Georgia y la llanura costera de las Carolinas. A pesar de las fuertes lluvias localmente, solo se justificaron mejoras modestas para el sureste, ya que los dficits de precipitacin de 90 das superan las 6 pulgadas en gran parte de Alabama, Georgia y el norte del estado de Carolina del Sur. La sequa extrema (D3) se expandi por el sur de Georgia con una sequa severa (D2) que se extendi hacia el norte a travs de la mayor parte de Carolina del Norte y hacia el centro-sur de Virginia. En consonancia con un invierno de La Nia, la sequa ha empeorado en los ltimos meses con ms de dos tercios del Estado del Sol designados con sequa extrema (D3). Segn el Centro Nacional Interinstitucional de Incendios, un incendio forestal en la Reserva Nacional Big Cypress de Florida ha crecido a ms de 35,000 acres quemados a principios de marzo.

Sur

Las fuertes lluvias (de 2,5 a 7,6 cm, localmente ms) resultaron en una pequea mejora de categoria 1 en partes del noreste de Tennessee. En el valle bajo del Misisipi y las Grandes Llanuras del Sur, la sequa continu expandindose e intensificndose hasta finales de febrero y principios de marzo. El cambio ms importante de la semana pasada fue una degradacin generalizada de categoria 1 en Misisipi y tambin en el centro-norte de Oklahoma. Desde principios de diciembre, la precipitacin ha promediado menos del 50 % de lo normal en gran parte del valle bajo del Misisipi y las Grandes Llanuras del Sur. Los informes de impacto del centro-norte de Oklahoma incluyen malas condiciones para el trigo y escasez de agua superficial. Tambin se justific una expansin de la sequa moderada (D1) para el noreste de Nuevo Mxico. Adems de un invierno ms seco de lo normal, las temperaturas de 90 das han promediado de 1,1 a 2,7 C por encima de lo normal. La falta de precipitaciones invernales, combinada con periodos de temperaturas inusualmente clidas y vientos ms fuertes, condujo a una creciente cobertura de sequa severa (D2) a extrema (D3) desde el ro Misisipi hacia el oeste, a travs de Oklahoma y Texas.

Medio Oeste

La sequa continu expandindose e intensificndose en el valle de Ohio hasta principios de marzo, con precipitaciones promedio de 90 das inferiores a la mitad de lo normal en el oeste de Kentucky, el sureste de Misuri y gran parte de Indiana e Illinois. Paducah, Kentucky, y Carbondale, Illinois, experimentaron su invierno meteorolgico ms seco registrado (del 1 de diciembre de 2025 al 28 de febrero de 2026). La sequa, que inicialmente afect a las Grandes Llanuras Centrales, se ha extendido recientemente al noroeste de Iowa y al suroeste de Minnesota. A pesar de las precipitaciones generalizadas de entre 1,27 y 3,81 cm en el centro y sur de Misuri entre el 24 de febrero y el 2 de marzo, se esperaban pocos cambios en esas zonas.

Altas Llanuras

Aunque finales de invierno es una poca relativamente seca en las Grandes Llanuras Centrales, los periodos de temperaturas inusualmente clidas y vientos ms fuertes del mes pasado provocaron una sequa cada vez ms intensa en el noreste de Colorado y Nebraska. Las temperaturas promedio de 30 das superaron lo normal entre 6 y 10 grados F en las Grandes Llanuras. La semana pasada se registr una degradacin de categoria 1 en partes de Kansas y Dakota del Sur. Se mantiene una sequa generalizada de intensidad variable en gran parte de Colorado y Wyoming. Al 3 de marzo, el equivalente en agua de la nieve es inferior al 70 % de lo normal en las Montaas Rocosas Centrales.

Oeste

La precipitacin acumulada en lo que va del ao hidrolgico (del 1 de octubre de 2025 al 2 de marzo de 2026) fue, en promedio, inferior a lo normal en la Gran Cuenca, lo que provoc un ligero aumento de la cobertura moderada (D1) en el noreste de Nevada la semana pasada. Tras un febrero ms seco y clido de lo normal, algunas partes de Montana tambin fueron

degradadas a una categoría inferior. También se justificó una degradación de una categoría para algunas partes de Idaho, lo que refleja la precipitación inferior a lo normal y la baja capa de nieve del invierno pasado. Incluso en las zonas del oeste que han recibido precipitaciones superiores a lo normal desde principios del 1 de octubre, como el norte del oeste intermontano y las cascadas del norte de Washington, el equivalente en agua de nieve (EWS) se encuentra por debajo de lo normal. La baja capa de nieve en gran parte del oeste es una gran preocupación de cara a la primavera. Al 3 de marzo, el EWS era inferior al 50 % de lo normal desde las cascadas del noroeste del Pacífico hacia el sur, a través de la Gran Cuenca y la región de las Cuatro Esquinas. Aunque California permanece libre de sequa, el SWE es el 59 por ciento de lo normal en todo el estado según el Departamento de Recursos Hídricos de California.

Caribe

Solamente una pequeña área de sequedad anormal permanece designada para el sur de Puerto Rico y la mayoría de las áreas recibieron precipitaciones superiores a lo normal durante los últimos 30 a 120 días.

Las Islas Vírgenes Estadounidenses recibieron escasas precipitaciones la semana pasada, pero registraron precipitaciones superiores a lo normal para febrero, que suele ser una poca seca del año. Santo Tomás y San Juan recibieron menos de un tercio de pulgada la semana pasada, según los observadores meteorológicos. Santa Cruz recibió entre 0,11 y 0,59 pulgadas.

El índice de Salud Vegetal indica un leve estrés en Santa Cruz. Los niveles de agua en los pozos de las tres islas están disminuyendo. Todas las islas continúan sin sequa.

Pacífico

Debido a las fuertes nevadas de finales de febrero, se suspendió la sequa anormal (D0) en la península de Seward. Además, se redujo el D0 al oeste de Anchorage. Debido a las nevadas por debajo de lo normal, se amplió el D0 para incluir una mayor parte de la zona de Prince William Sound.

Las fuertes lluvias recientes contribuyeron a la eliminación de la sequa anormal (D0) en Oahu. Basándose, en parte, en los caudales promedio de 28 días, se observó una mejora de una categoría en las zonas barloventadas de Molokai y Maui. Es posible que se requieran mejoras adicionales la próxima semana tras un análisis más detallado de las fuertes lluvias de finales de febrero.

La República de Palaos recibió 4,7 y 5 cm de precipitación en Palau IAP y Koror, respectivamente. El suministro de agua deberá ser suficiente, ya que estas localidades necesitan 5 cm de lluvia por semana para cubrir sus necesidades mínimas.

Las Islas Marianas recibieron entre 1,63 pulgadas y 5 pulgadas o más durante la semana. Una pulgada es la cantidad semanal que estas islas necesitan para cubrir sus necesidades mínimas de agua. Guam reportó 5,42 pulgadas, Rota recibió 2,69 pulgadas y Tinian recolectó 2,31 pulgadas.

Los Estados Federados de Micronesia tuvieron una semana mixta. Lukunor y Yap se mantuvieron en D0 y recibieron menos de 5 cm de lluvia. En Woleai, la precipitación ha sido baja en las últimas semanas, por lo que el sitio entró en D0. Kapingamarangi y Kosrae recibieron menos de 5 cm, pero reportaron abundantes lluvias en semanas anteriores y deberán tener suficiente suministro de agua. Chuuk, Nukuoro y Pohnpei recibieron más de 5 cm.

Algunas de las Islas Marshall reportaron abundantes precipitaciones, mientras que otras islas tuvieron escasas. Utirik y Wotje se encuentran en D2 y acumularon solo 1,4 y 9 mm, respectivamente. Las precipitaciones en Kwajalein han sido escasas en las últimas semanas, por lo que se estableció en D0 esta semana tras recibir solo 3,1 mm de lluvia. Ailinglaplap, Jaluit, Majuro y Mili recibieron entre casi 7,6 y más de 15 cm de lluvia. El 28 de febrero, los embalses de Majuro almacenaron 147 millones de litros de agua.

Samoa Americana se mantuvo en D0 debido a que las precipitaciones han sido inferiores a lo normal. Pago Pago y otras localidades recibieron 2,6 cm o menos de lluvia cada una. Estas islas requieren 5 cm de lluvia por semana para cubrir sus necesidades mínimas de agua.

Mirando hacia el futuro

Se está produciendo un importante cambio de patrón que promoverá el seguimiento de múltiples sistemas de baja presión a través de las Grandes Llanuras y el Medio Oeste entre principios y mediados de marzo. El Centro de Predicciones Meteorológicas (válido del 5 al 9 de marzo) presenta una franja de fuertes precipitaciones (de 2,5 a 7,6 cm, localmente más) desde el este de Texas y el sureste de Oklahoma hacia el noreste, pasando por los valles del Bajo y Medio Misisipi y Ohio. Se pronostica que estas precipitaciones más intensas se extenderán a partes del noreste, pero se espera poca o ninguna precipitación desde el sur de Virginia hasta Florida. Se esperan nevadas muy necesarias en el norte y centro de las Montañas Rocosas, mientras que prevalecerá el clima seco en California y el suroeste. Se pronostican temperaturas muy superiores a lo normal en el sureste y centro de EE. UU., donde podrán romperse récords diarios de máximas del 5 al 9 de marzo.

El pronóstico del NWS para los próximos 6 a 10 días (válido del 10 al 14 de marzo) indica una mayor probabilidad de temperaturas superiores a lo normal en el este, el valle medio y bajo del Misisipi, las Grandes Llanuras del Sur, el suroeste y California. Las temperaturas inferiores a lo normal son más probables desde el noroeste del Pacífico hacia el este hasta las Grandes Llanuras del Norte. Se prevén temperaturas inferiores a lo normal en Alaska. El pronóstico para los próximos 6 a 10 días favorece precipitaciones superiores a lo normal desde el valle del Misisipi hasta la costa este. Las probabilidades de precipitaciones superiores a lo normal disminuyen al oeste de las Grandes Llanuras. También se prevén precipitaciones superiores a lo normal en el noroeste del Pacífico y el norte de las Montañas Rocosas. Se prevén precipitaciones cercanas a lo normal en Alaska, mientras que se pronostican grandes probabilidades de precipitaciones superiores a lo normal en Hawái.

Autor(s)

Brad Pugh, NOAA/CPC

Denise Gutzmer, National Drought Mitigation Center