

# Resumen nacional de sequía para 10 marzo, 2026

## Resumen

Tras un invierno ms seco de lo normal, un cambio de patrón a principios de marzo provoc precipitaciones intensas y generalizadas (de 2,5 a 7,6 cm, localmente ms) y una mejora de categoría 1 en partes de Ohio y del valle medio e inferior del Misisipi. Esta mejora de la sequa se extendi al este, hasta los Apalaches centrales y el noreste. Sin embargo, una sequa prolongada continua en gran parte del noreste. A pesar de las precipitaciones tan necesarias en partes del sureste y las Grandes Llanuras del sur, persiste una sequa de severa (D2) a extrema (D3) en muchas zonas. La baja capa de nieve y el inicio temprano del deshielo son una importante preocupacin por la sequa en el oeste. Al 10 de marzo, se declar una sequa de intensidad variable en partes de Hawai. Alaska y Puerto Rico permanecen libres de sequa.

## Noreste

Las precipitaciones generalizadas de 2,5 a 5 cm (1 a 2 pulgadas) provocaron una mejora de una categoría en partes del sureste de Nueva York, el norte de Nueva Jersey, Pensilvania y Virginia Occidental. A pesar de las recientes precipitaciones beneficiosas desde finales de febrero, persiste una sequa prolongada de intensidad variable en gran parte del noreste. Esta descripción de la sequa prolongada se sustenta en las métricas meteorológicas e hidrológicas de sequa. Por ejemplo, los caudales promedio de 28 días se mantienen bajos (por debajo del percentil 10) desde el Atlántico Norte Medio hasta Nueva Inglaterra. Cabe destacar que el impacto de la sequa se modific a largo plazo solo para gran parte del noreste, donde la sequa breve prácticamente ha cesado.

## Sureste

Se observaron pequeñas mejoras en la región sureste cerca de Mobile (alrededor de 5" de lluvia del 3 al 9 de marzo) y en el norte de Alabama. La sequa extrema (D3) se extendi al noreste de Georgia, ya que los déficits de precipitación de 90 a 120 días continúan aumentando y persisten los bajos caudales en las cabeceras superiores del río Chattahoochee. El aumento de los déficits de precipitación a corto plazo resultó en una degradación de categoría 1 en el suroeste de Virginia. En consonancia con un invierno de La Niña, la sequa ha empeorado en los últimos meses en Florida, con ms de dos tercios del Estado del Sol designados con sequa extrema (D3). Según el Centro Nacional Interinstitucional de Incendios, un incendio forestal en la Reserva Nacional Big Cypress de Florida ha quemado ms de 35,000 acres.

## Sur

A pesar de las fuertes lluvias locales en el valle del Bajo Misisipi, junto con el este de Oklahoma y Texas, solo se justificaron mejoras modestas, ya que una respuesta favorable entre los diversos indicadores no fue suficiente para justificar cambios ms generalizados de una semana. Sin embargo, se realizaron mejoras específicas de una categoría en partes del noroeste de Arkansas, el este de Oklahoma, el este de Texas y el valle del Bajo Misisipi, donde

las cantidades semanales de precipitación superaron las 2 pulgadas. En las áreas que se perdieron las lluvias beneficiosas, la sequa se intensificó en partes del centro-oeste de Oklahoma y el Panhandle de Oklahoma. La mayor parte de la Región Sur ha recibido menos de la mitad de su precipitación normal, con una desviación de temperatura de más de 6 grados F por encima de lo normal durante los últimos 90 días. Estas observaciones de precipitación y temperatura de 3 meses son consistentes con un patrón invernal de La Niña.

## **Medio Oeste**

Se observó una importante mejora de la sequa en la región del Medio Oeste, con un par de sistemas de baja presión y sus frentes asociados que atravesaron el centro de EE. UU. a principios de marzo. Se observó una mejora de categoría 1 en las zonas que recibieron 3,8 cm o más de precipitación entre el 3 y el 9 de marzo. Esto incluyó las zonas del centro y sur de Indiana, Illinois y Ohio, así como el centro-este y el sur de Misuri. Dada la poca del año, estas precipitaciones recientes fueron muy beneficiosas para la reposición de humedad del suelo. Se observó una interrupción abrupta de las precipitaciones más intensas (cerca del corredor de la I-70), con una sequa severa (D2) a extrema (D3) que continuó más al norte, en Illinois, Indiana y Ohio.

## **Altas Llanuras**

Una sequa generalizada de intensidad variable continúa en gran parte de las Grandes Llanuras Centrales y las Montañas Rocosas Centrales. La sequa se extendió la semana pasada a todo el suroeste de Colorado y se intensificó en las zonas noroeste del estado. La baja acumulación de nieve en las Montañas Rocosas Centrales, especialmente en Colorado, sigue siendo una gran preocupación de cara a la primavera. Al 10 de marzo, el equivalente en agua de nieve en las cuencas fluviales de Colorado se encuentra por debajo del 70 % del promedio de 1991-2020. Hubo un par de excepciones al empeoramiento de las condiciones. Una nevada húmeda (2,5 cm o más, equivalente líquido) contribuyó a la eliminación de la sequa extrema (D3) en partes del área metropolitana de Denver. Las fuertes lluvias (más de 3,8 cm) provocaron pequeñas mejoras de categoría 1 en el este de Kansas y el sureste de Nebraska.

## **Oeste**

El bajo manto de nieve en gran parte del Oeste es una preocupación importante de cara a la primavera. Al 10 de marzo, el equivalente de agua de nieve (SWE) es inferior al 40 por ciento de lo normal desde las Cascadas del Pacífico Noroeste hacia el sur a través de la Gran Cuenca y la región de las Cuatro Esquinas. Las temperaturas de 14 días, válidas del 25 de febrero al 10 de marzo, han promediado de 5 a grados F por encima de lo normal. Este final de febrero y comienzo de marzo más cálidos de lo normal ha provocado un inicio temprano del deshielo en partes del Oeste. Aunque California permanece libre de sequa, el SWE es del 53 por ciento de lo normal en todo el estado según el Departamento de Recursos Hídricos de California. En general, solo se hicieron cambios menores la semana pasada en la Región Oeste. Con base en el aumento de los déficits de precipitación de 60 días y para reflejar el bajo manto de nieve, se

agreg sequa anormal (D0) a partes del norte de California. La sequa se expandi al sureste de Utah mientras se intensificaba a sequa severa (D2) y extrema (D3) en las partes noreste y oeste del estado. La sequa moderada (D1) se extendi desde el centro norte hasta el noreste de Washington, junto con el centro de Oregón, debido a déficits de precipitaciones de 30 a 90 días y a la baja capa de nieve.

## **Caribe**

Solamente una pequeña rea de sequedad anormal permanece designada para el sur de Puerto Rico y la mayoría de las reas recibieron precipitaciones superiores a lo normal durante los últimos 30 a 120 días.

Las precipitaciones fueron escasas en las Islas Vírgenes Estadounidenses durante la última semana, pero superiores a lo normal en febrero, una poca típicamente seca del año. Santo Tomás y San Juan recibieron 0,66 mm cada uno, según los observadores meteorológicos. Santa Cruz recibió entre 4,8 y 7 mm.

El índice de Precipitación Estandarizado (IPE) mostró condiciones ligeramente secas en el período de un mes para el East End de St. John, con condiciones más húmedas en períodos más largos. Las condiciones fueron bastante normales en todos los períodos para el East Hill de St. Croix.

El índice de Salud de la Vegetación indica un leve estrés en Santa Cruz. Los niveles de agua en los pozos de las tres islas están bajando debido a la poca seca del año. Todas las islas continúan sin sequa.

## **Pacífico**

La sequa anormal continúa en algunas zonas de Alaska y, en general, se refleja en nevadas por debajo de lo normal. No se registraron cambios la semana pasada.

No se realizaron cambios la semana pasada y, a partir del 10 de marzo, hay distintos niveles de intensidad de sequa en la Isla Grande, Maui y Molokai.

La República de Palaos recibió 5,8 y 9,3 mm de precipitación en Palau IAP y Koror, respectivamente. El suministro de agua deberá ser suficiente, ya que estas localidades necesitan 5,0 mm de lluvia por semana para cubrir sus necesidades mínimas.

Las Islas Marianas recibieron más de 5 cm de lluvia durante la semana. Guam reportó 8,7 cm, Rota 8,9 cm y el Aeropuerto Internacional de Saipán 5,2 cm. 2,5 cm es la cantidad semanal que estas islas necesitan para cubrir sus necesidades mínimas de agua.

Los Estados Federados de Micronesia recibieron principalmente más de 5 cm de lluvia durante la semana. Lukunor recuperó su estado normal tras recibir 5,8 cm de precipitación. Woleai y Yap también recuperaron su estado normal tras recibir 15,5 y 5,3 cm de lluvia, respectivamente. Todas las demás localidades de los Estados Federados de Micronesia recibieron más de 5 cm, salvo Kapingamarangi y Nukuoro, que recibieron menos de 2,5 cm. Sin embargo, ambas localidades tuvieron precipitaciones adecuadas en las semanas anteriores.

Las precipitaciones en las Islas Marshall fueron variadas. Utiirik y Wotje permanecen en D2 y reportaron solo 0,12 y 0,10 pulgadas, respectivamente. Kwajalein registró 2,32 pulgadas y pasó de D0 a condiciones normales. Ailinglaplap, Jaluit y Mili recibieron más de 2 pulgadas de lluvia, mientras que Majuro registró 1,48 pulgadas.

Samoa Americana recibió suficiente lluvia para salir de la categoría D0 y volver a la normalidad. Pago Pago recibió 70 mm de lluvia, mientras que las cordilleras Siufaga y Toa recibieron 63 mm y 55 mm, respectivamente. Estas islas requieren 50 mm de lluvia a la semana para cubrir sus necesidades mínimas de agua.

### ***Mirando hacia el futuro***

Tras un frente frío, se pronostica que temperaturas mucho más frías se extenderán por el este de EE. UU. el 12 de marzo. Se espera que un segundo frente frío, aún más fuerte, avance hacia el este desde las Grandes Llanuras hasta la Costa Este para el 16 de marzo. Después de este fuerte frente frío de marzo, se pronostica que las temperaturas bajo cero se extenderán tan al sur como Oklahoma y el Panhandle de Texas. Según el Centro de Predicciones Meteorológicas, se pronostica que las cantidades de precipitación de 5 días del 12 al 16 de marzo superarán la pulgada, equivalente líquido, en los Grandes Lagos y Nueva Inglaterra. También se anticipan lluvias muy necesarias para Florida, afectada por la sequía. En otros lugares, se pronostica un clima más seco para el Valle de Ohio, el Valle Medio e Inferior del Misisipi y las Grandes Llanuras. A mediados de marzo, el clima seco estará acompañado por una mayor probabilidad de calor récord en California, la Gran Cuenca y el Suroeste. Una poderosa depresión de Kona traerá lluvias fuertes a excesivas a Hawái al menos hasta el 14 de marzo.

El pronóstico del NWS para los próximos 6 a 10 días (válido del 17 al 21 de marzo) se inclina hacia temperaturas por debajo de lo normal para el este, mientras que es probable que haya temperaturas por encima de lo normal desde la costa oeste hasta las Grandes Llanuras. Las probabilidades de temperaturas por encima de lo normal superan el 90 % en la mayor parte de California, la Gran Cuenca y el suroeste. A diferencia de las temperaturas más cálidas de lo normal en el oeste, es probable que Alaska sea más fría de lo normal. Se prevé que la mayoría de los 48 estados contiguos tengan precipitaciones por debajo de lo normal del 17 al 21 de marzo, con las mayores probabilidades de precipitación por debajo de lo normal (superiores al 50 %) pronosticadas en las Grandes Llanuras del centro al sur, el suroeste y gran parte de California. Se pronostica que el patrón húmedo persistirá en Hawái, con mayores probabilidades de precipitación por encima de lo normal.

### **Autor(s)**

Brad Pugh, NOAA/CPC

Denise Gutzmer, National Drought Mitigation Center