

Resumen nacional de sequía para 7 abril, 2026

Resumen

Durante esta semana del Monitor de Sequa de los EE. UU. (USDM), se observó un deterioro de las condiciones en las regiones del Oeste, el Sureste y el Atlántico Medio; por otro lado, las precipitaciones registradas durante la última semana propiciaron mejoras en las zonas afectadas por la sequa en el Sur, las Llanuras y el Medio Oeste. En el Medio Oeste, se produjeron mejoras generalizadas tras una nueva ronda de precipitaciones durante la semana pasada, lo que permitió eliminar del mapa las zonas de sequa en Iowa, Misuri, Illinois, Indiana y Ohio. En estas áreas, los acumulados de precipitación oscilaron entre 2 y 5 pulgadas. Del mismo modo, se registraron lluvias significativas en algunas zonas de Texas, Oklahoma y Luisiana, lo que dio lugar a mejoras puntuales. En el Oeste, predominaron las condiciones generalmente secas en gran parte de la región, si bien se observaron acumulados de precipitación modestos en áreas del Noroeste del Pacífico, el norte de California, el Oeste Intermontano y el Suroeste; los acumulados más elevados se registraron en California. A pesar de estas precipitaciones tan necesarias, las condiciones reflejadas en el mapa se deterioraron en Oregón, California, Nevada, Wyoming, Montana y Nuevo México. En las islas de Hawái, las condiciones han mejorado significativamente durante los últimos dos meses gracias a una serie de eventos de precipitación históricos observados en todo el archipiélago. En otras zonas, persistieron las condiciones secas en gran parte del Sureste y el Atlántico Medio, lo que provocó un deterioro de las condiciones desde Virginia hasta Florida.

Según el análisis más reciente sobre temperaturas y precipitaciones en los Estados Unidos, realizado por el Centro de Información Ambiental de la NOAA, marzo de 2026 fue el marzo más cálido registrado en los Estados Unidos contiguos (CONUS), con temperaturas promedio que alcanzaron los 9,4 F por encima del promedio del siglo XX. Durante ese mes, 1.432 condados registraron el día de marzo más cálido de su historia (desde 1950 hasta la actualidad). Además, el periodo comprendido entre abril de 2025 y marzo de 2026 constituyó el lapso de 12 meses más cálido registrado en el CONUS desde 1895. En cuanto a las precipitaciones, el periodo de enero a marzo fue el más seco registrado en el CONUS, superando el récord anterior establecido en 1910.

Al comenzar el mes de abril, las condiciones de la capa de nieve en las montañas se mantienen muy por debajo de lo normal, a pesar de las precipitaciones registradas esta semana en las zonas de mayor altitud de las cordilleras Cascades, Sierra y Rockies. Según la red de Telemetría de Nieve (SNOTEL) del Servicio de Conservación de Recursos Naturales (NRCS) con datos al 7 de abril, los valores del equivalente de agua en la nieve (SWE) a nivel regional (HUC de 2 dígitos), expresados como porcentaje de la mediana, son los siguientes: Noroeste del Pacífico 50%, Missouri 58%, Alto Colorado 26%, Gran Cuenca 18%, Bajo Colorado 17%, Río Grande 13% y Arkansas-White-Red 10%. En California, la capa de nieve a nivel estatal se sitúa en un 16% de lo normal (al 7 de abril), con un 27% en el sur de la Sierra, un 19% en la Sierra Central y un 5% en el norte de la Sierra.

Noreste

Esta semana se registraron mejoras continuas en reas de Pensilvania, Nueva York, Rhode Island, Massachusetts y Maine, como respuesta a las precipitaciones de esta semana y a la mejora general de las condiciones observada durante los ltimos 30 das. Durante el periodo de los ltimos 60 das, las precipitaciones se situaron entre valores cercanos a lo normal y superiores a lo normal (110200+ %) en Pensilvania, Nueva York, Connecticut, Rhode Island y el oeste de Massachusetts. Por el contrario, algunas zonas de Maine continan presentando dficits de precipitacin para este mismo periodo, con valores que oscilan entre 1 y 4 pulgadas. Las condiciones de la capa de nieve continan disminuyendo estacionalmente; el Centro Nacional Operativo de Teledeteccin Hidrolgica del Servicio Meteorolgico Nacional (NWS NOHRSC) informa de una cobertura de nieve del 61 % (en comparacin con el 91 % del mes pasado) para la regin del Noreste, con una profundidad media de 3,5 pulgadas y una profundidad mxima de 69 pulgadas. Durante la semana, las temperaturas se situaron por encima de lo normal en la mayor parte de la regin, observndose las mayores desviaciones (915 F) en la mitad sur de la misma.

Sureste

Durante la semana pasada, predominaron las condiciones secas en la mayor parte de la regin, a excepci3n de algunas acumulaciones aisladas de lluvia de intensidad leve a moderada (de 1 a 3 pulgadas) observadas en el sur de Florida, el suroeste de Georgia y el sur de Alabama. En el mapa, la sequa se expandi y se intensific en gran parte de la regin, incluyendo Virginia, las Carolinas, Georgia y Florida. En el sur de Georgia y el norte de Florida, las reas de Sequa Excepcional (D4) se expandieron como respuesta a la persistente sequedad, as como a las muy deficientes condiciones de humedad del suelo e hidrolgicas. Se estn reportando impactos en el norte de Florida, Georgia y Carolina del Sur, segn la herramienta *Conditions Monitoring Observer Reports* (CMOR) del Centro Nacional de Mitigaci3n de la Sequa (NDMC). Segn datos de la herramienta *Climate Perspectives* del Centro Regional del Clima del Sureste, los ltimos dos meses (del 7 de febrero al 7 de abril) han sido muy secos en diversas zonas de la regin, observndose una sequedad cercana a niveles rcord en las siguientes localidades: Gainesville, FL (la 2. ms seca; desviaci3n de -4.7 pulgadas); Tallahassee, FL (la 4. ms seca; -6.13 pulgadas); Savannah, GA (la 3. ms seca; -4.36 pulgadas); Montgomery, AL (la 2. ms seca; -4.34 pulgadas); North Charleston, SC (la 5. ms seca; -3.93 pulgadas); y Charlotte, NC (la 7. ms seca; -2.85 pulgadas). En cuanto a las temperaturas promedio de la semana, se observaron valores superiores a lo normal (de 5 a 15 F) en toda la regin, registrndose las mayores desviaciones en Virginia.

Sur

En el mapa de esta semana, se observaron mejoras en las zonas afectadas por la sequa en Texas, Oklahoma, Luisiana y Arkansas, mientras que algunas reas de Tennessee experimentaron un deterioro de las condiciones. En cuanto a las precipitaciones de la semana pasada, se registraron acumulaciones de lluvia de moderadas a intensas (con rangos de 3 a 6 pulgadas) en Texas, Oklahoma y zonas aisladas de Luisiana. En Arkansas, cayeron algunas lluvias beneficiosas en el extremo occidental del estado, lo que propici3 una mejora en las

condiciones del caudal de los arroyos. No obstante, persisten los suelos secos y los déficits significativos de precipitación en todo el estado; la herramienta CMOR del NDMC muestra numerosos informes de nuevos impactos registrados durante la última semana. Al analizar las clasificaciones climatológicas del último periodo de 60 días (del 7 de febrero al 7 de abril), se observó una sequedad de niveles récord o casi récord en la región, destacando Monticello, AR (el 4. periodo más seco; -5,7 pulgadas), y Monroe, LA (el 7. más seco; -6,69 pulgadas). En Texas, el informe **Water for Texas** (del 7 de abril) indica que los embalses de todo el estado se encuentran al 74 % de su capacidad; los embalses de la zona este presentan buenas condiciones, mientras que muchos de los situados en el oeste y el sur permanecen por debajo de sus niveles normales. Las temperaturas promedio de la semana se situaron por encima de lo normal en toda la región (con variaciones de 2 a más de 12 grados Fahrenheit).

Medio Oeste

En el mapa de esta semana, se registraron mejoras generalizadas en Minnesota, Iowa, Missouri, Wisconsin, Illinois, Indiana y Ohio, como respuesta a los efectos acumulativos de los eventos de precipitación ocurridos durante el último periodo de 30 días. Cabe destacar que se produjeron mejoras de múltiples categorías en las zonas septentrionales de Illinois, Indiana y Ohio, donde se observaron los mayores acumulados de precipitación (que oscilaron entre 2 y 5 pulgadas) durante la semana pasada. En Kentucky, la sequedad a corto plazo y el desarrollo de condiciones de sequía hidrológica provocaron una expansión e intensificación de la sequía. El NWS NOHRSC (Región de los Grandes Lagos del Norte) informa que el 42 % de la región se encuentra cubierta de nieve, con una profundidad media de 5.5 pulgadas y una profundidad máxima de 71 pulgadas. Las temperaturas se situaron por encima de lo normal en la mayor parte de la región, con anomalías que oscilaron entre 2 y 15 F. Al examinar las clasificaciones climatológicas correspondientes al último periodo de 30 días (del 7 de marzo al 7 de abril), numerosas localidades se situaron entre las más húmedas o casi las más húmedas de su registro histórico; entre ellas se encuentran Chicago, IL (la 2. más húmeda; +2.57 pulgadas); Lake Geneva, WI (la más húmeda del registro; +6.33 pulgadas); Lafayette, IN (la más húmeda del registro; +3.75 pulgadas); Toledo, OH (la más húmeda del registro; +4.43 pulgadas); y Saginaw, MI (la más húmeda del registro; +3.66 pulgadas).

Altas Llanuras

En el mapa de esta semana, las precipitaciones (de 1 a 4 pulgadas) registradas durante la última semana propiciaron mejoras puntuales en las zonas más orientales de Kansas y Nebraska. Por otro lado, las condiciones representadas en el mapa se deterioraron en áreas del centro y el oeste de Kansas, así como en el suroeste de Dakota del Sur. Durante la semana, las temperaturas promedio se situaron entre 4 y más de 10 F por debajo de lo normal en gran parte de la región, observándose las mayores desviaciones en las Dakotas. Al analizar las clasificaciones climatológicas del último periodo de 60 días (del 7 de marzo al 7 de abril), varias localidades se situaron entre las más secas de su registro histórico, incluyendo Dodge City, KS (la más seca de su historia; -1.51 pulgadas); Goodland, KS (la más seca de su historia; -1.05); y Manhattan, KS (la segunda más seca; -1.81 pulgadas). En cuanto a las condiciones hidrológicas,

el Servicio Geológico de los Estados Unidos informa de caudales fluviales de normales a muy por debajo de lo normal en el suroeste de Dakota del Sur, el sur de Nebraska y el centro y oeste de Kansas.

Oeste

Las condiciones continuaron deteriorándose en la región, registrándose un empeoramiento en el sur de Oregón, el norte de California, el suroeste de Montana, el noroeste de Wyoming y Nuevo México. A pesar de que esta semana se registraron algunas precipitaciones en las cadenas montañosas de la región, las condiciones de la capa de nieve siguen siendo extremadamente deficientes; la nieve remanente se limita principalmente a las elevaciones más altas. En Colorado, el NRCS informa que el equivalente en agua de la nieve (SWE) a nivel estatal se encuentra en su nivel más bajo de la historia. Históricamente, el pico mediano del SWE en Colorado se produce el 8 de abril; sin embargo, este año dicho pico se alcanzó el 8 de marzo. En el estado de Washington, el Departamento de Ecología emitió una declaración de emergencia por sequía a nivel estatal, dado que se prevé que el suministro de agua se sitúe muy por debajo de los niveles normales. En la cuenca del río Colorado, el lago Powell se encuentra al 24 % de su capacidad, mientras que el lago Mead está al 33 %, según la Oficina de Recuperación de los Estados Unidos (U.S. Bureau of Reclamation). En diversas zonas del Lejano Oeste, se observaron condiciones de gran aridez durante el último periodo de 30 días (del 7 de marzo al 7 de abril), registrándose niveles de sequía históricos o casi históricos en las siguientes localidades: Eugene, OR (10. periodo más seco; -2,57 pulgadas); Medford, OR (9. más seco; -1,38 pulgadas); Crescent City, CA (2. más seco; -5,58 pulgadas); Mount Shasta, CA (el más seco de la historia; -5,35 pulgadas); San Francisco, CA (5. más seco; -2,34 pulgadas); Santa Cruz (el más seco de la historia; -3,13 pulgadas); Monterey, CA (3. más seco; -2,8 pulgadas) y San Diego, CA (el más seco de la historia; -1,24 pulgadas).

Caribe

No se realizaron cambios esta semana en Puerto Rico.

Hacia el comienzo de la actual semana de sequía (del miércoles 1 de abril al martes 7 de abril), un fuerte sistema de alta presión sobre el Atlántico occidental mantuvo vientos alisios ventosos en toda la región. Por lo general, se registraron vientos de 15 a 20 mph, con ráfagas de 25 a 30 mph o superiores. Las peligrosas corrientes de resaca representaron un riesgo para las playas orientadas hacia el norte y el este. Con el transcurso del tiempo, una franja de valores de agua precipitable (PW) superiores a lo normal el percentil climatológico 75 para esta época del año se sitúa cerca de 1.7 pulgadas se desplazó desde el noreste y se extendió por las islas. A medida que la humedad se intensificaba y se establecía con mayor firmeza sobre el área, los chubascos pasajeros se volvieron más frecuentes. La ausencia de una capa de inversión de los alisios bien definida, sumada a la presencia cercana de una vaguada en niveles altos de la atmósfera, favoreció la formación de chubascos y actividad tormentosa aislada. Durante la parte media y final de la semana de sequía, un amplio sistema de alta presión en superficie sobre el Atlántico central y oriental dio lugar a vientos de componente sur a sudeste. El aumento de la humedad en niveles bajos, proveniente del Caribe, se extendió sobre las Islas Vírgenes de los EE. UU. y

el cercano Puerto Rico, elevando los valores de PW hasta situarse cerca de las 2.0 pulgadas. Hacia el final del periodo, regresaron a la región valores del índice de calor superiores a lo normal. Las imágenes satelitales IMERG basadas en datos de SPoRT proporcionaron estimaciones de las precipitaciones para la semana de sequa, indicando que la mayoría de las áreas recibieron menos de una pulgada de lluvia.

Se observaron condiciones relativamente secas en todas las Islas Vírgenes de los EE. UU. durante esta última semana de sequa, cerca del punto máximo de la temporada seca climatológica. No se consideró necesario realizar ajustes en ninguna de las representaciones de la sequa.

Los montos de precipitación registrados en St. Croix durante la semana pasada oscilaron entre 0.17 pulgadas (con 2 días de datos faltantes) en VI-SC-35 (Frederiksted 1.3 ENE) y 1.54 pulgadas en VI-SC-20 (Frederiksted 1.7 ESE). Los valores intermedios de lluvia (en orden ascendente) fueron: 0.24 pulgadas (2 días faltantes) en VI-SC-24 (Christiansted 2.1 ENE), 0.26 pulgadas en VI-SC-34 (Frederiksted 1.9 NE), 0.34 pulgadas (2 días faltantes) en VI-SC-29 (Frederiksted 2.5 NNE), 0.39 pulgadas en VI-SC-23 (Christiansted 6.5 O), 0.49 pulgadas (1 día faltante) en VI-SC-25 (Christiansted 4.4 O), 0.51 pulgadas en VI-SC-30 (Christiansted 1.7 SO), 0.58 pulgadas en 11624 (Aeropuerto Rohlsen), 0.62 pulgadas (1 día faltante) en VI-SC-10 (Christiansted 1.6 E) y 0.65 pulgadas en 672560 (East Hill). Los valores del índice Estandarizado de Precipitación (SPI) en East Hill para periodos de 1, 3, 6, 9 y 12 meses son: +1.03, +1.64, -0.27, +0.11 y +0.03, lo que indica que no existen preocupaciones por sequa en este momento. Los niveles de agua en el pozo Adventure 28 han oscilado entre un máximo de 20.46 pies a principios del 1 de abril y un mínimo de 20.71 pies a finales del 7 de abril.

Los registros de precipitación en St. John, ordenados de forma ascendente, incluyeron 0.32 pulgadas en el punto 672551 (East End), 0.71 pulgadas en VI-SJ-3 (Windswept Beach), 1.13 pulgadas en VI-SJ-5 (Cruz Bay 1.6 E) y 1.23 pulgadas en VI-SJ-10 (Cruz Bay 3.1 NNW). Históricamente, marzo es el mes más seco del año en Windswept Beach, con un valor medio de precipitación de 1.75 pulgadas para el periodo 1984-2025; la acumulación registrada este mes de marzo fue de 2.25 pulgadas. En febrero, la precipitación total en Windswept Beach fue de 3.37 pulgadas. Los niveles de agua en el pozo Susannaberg Dpw 3 alcanzaron su punto máximo de 13.48 pies a primeras horas del 1 de abril, para luego descender gradualmente hasta los 13.73 pies el 5 de abril, con una ligera recuperación hacia el final del periodo.

Las precipitaciones en St. Thomas registraron 0.51 pulgadas en la estación 11640 (Aeropuerto King), 0.70 pulgadas en la VI-ST-13 (Charlotte Amalie 1.2 NNW) y 0.90 pulgadas en la VI-ST-15 (Charlotte Amalie West 1.3 N). Los valores del SPI (índice de Precipitación Estandarizado) a 1, 3 y 6 meses en el Aeropuerto King fueron de +0.55, +0.56 y -1.14, lo cual indica que se justifica realizar evaluaciones adicionales y una reevaluación de los parámetros durante las próximas semanas. Los niveles de agua en el pozo Grade School 3 alcanzaron su punto máximo de 5.92 pies al inicio del 1 de abril, seguido de un descenso constante hasta situarse en 6.92 pies hacia el final del día 7 de abril.

Pacífico

No se realizaron cambios esta semana en Alaska.

las islas hawaianas, el impacto acumulativo de varios eventos tormentosos significativos ha eliminado la sequa en todo el archipilago, a excepci3n de algunas zonas de la Isla Grande que a3n presentan ciertos d3ficits persistentes a largo plazo, as como reas de sequedad que se manifiestan en los ndices de salud de la vegetaci3n basados en im3genes satelitales.

Al comienzo de la semana de sequa, la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte (CNMI) experiment3 el paso de un fragmento de lnea de cizalladura y lluvias dispersas. Varios d3as despu3s, una alta presi3n en superficie se desplaz3 desde la costa de Jap3n, lo que intensific3 el gradiente de presi3n con la Vaguada Cercana al Ecuador (NET), provocando un aumento tanto en el oleaje oce3nico como en los vientos. Las corrientes de resaca representaron un motivo de preocupaci3n para las playas orientadas hacia el norte y el este. La segunda mitad de la semana de sequa estuvo asociada con un patr3n estacional de vientos alisios, acompa3ado de una considerable cobertura nubosa y lluvias dispersas. Sobre la regi3n occidental de los Estados Federados de Micronesia (w-FSM), la cercana NET mostr3 la presencia de una circulaci3n incrustada a principios de la semana de sequa, mientras que Palaos se situaba cerca de una zona de convergencia generada por dicha circulaci3n y los vientos predominantes del noreste. Se observaron condiciones m3s secas en Yap y Palaos. Los remanentes de la perturbaci3n tropical 99W pasaron sobre Weno (la capital de Chuuk). En Chuuk se produjo un cambio hacia un clima h3medo, ya que una oleada de vientos alisios provoc3 un aumento tanto en las lluvias como en las tormentas el3ctricas. M3s avanzada la semana de sequa, las dos caractersticas principales para la regi3n de w-FSM fueron la NET y la aproximaci3n de la perturbaci3n Invest 90W. Al sur del eje de la NET, se observaron en las im3genes satelitales lluvias de dispersas a numerosas. En cuanto a Palaos y Yap, persisti3 sobre la regi3n un patr3n seco de vientos alisios, con la excepci3n de una vaguada en aproximaci3n que, seg3n las previsiones, solo producir3 algunas lluvias aisladas. En la regi3n oriental de los FSM (e-FSM), se localiz3 una perturbaci3n tropical cerca de Kiribati hacia el inicio de la semana de sequa, la cual gener3 fuertes precipitaciones y vientos racheados mientras se desplazaba por la zona. La combinaci3n de esta perturbaci3n y la NET gener3 condiciones meteorol3gicas inestables en la regi3n. Una intensificaci3n de la convecci3n en la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), al interactuar con la NET y con la perturbaci3n incrustada en esta ltima aguas abajo, provoc3 periodos de lluvias intensas, tormentas el3ctricas y vientos de fuertes a casi huracanados en Pohnpei y Kosrae, extendi3ndose tambi3n m3s hacia el este, hasta Majuro, parte de la Rep3blica de las Islas Marshall (RMI). En el Pac3fico Sur, el cicl3n tropical (TC) Vaianu se mantuvo situado muy al oeste y al sur de la Samoa Americana, generando escasos o nulos impactos directos antes de que concluyera la semana de sequa.

Las estimaciones de precipitaci3n basadas en sat3lites (provenientes de SPoRT GPM/IMERG) para los ltimos 7 d3as con cierre a las 12:00 UTC del 7 de abril revelan un patr3n que, en trminos generales, favorece los mayores acumulados de precipitaci3n (de 1 a 4 pulgadas) sobre las zonas central y oriental del dominio de las USAPI, al norte del ecuador. Gran parte de esta precipitaci3n se concentr3 en bandas lineales o cuasilineales, especialmente sobre el sur y el este de las RMI. En las proximidades de Pohnpei se observaron n3cleos de convecci3n m3s aislada y de menor escala. Asimismo, se constat3 que gran parte de las CNMI y del oeste de los FSM (incluido Palaos) recibieron menos de media pulgada de precipitaci3n durante la semana.

En el Estado Libre Asociado de las Islas Marianas del Norte (CNMI), los vol3menes de lluvia

fueron relativamente escasos durante esta ltima semana de sequa, oscilando entre 0,07 pulgadas en Agat y 0,68 pulgadas en el Aeropuerto Internacional de Saipn. Los tres meses anteriores han sido hmedos en Saipn (superando el requisito hdrico mnimo de 4 pulgadas), registrndose 13,72 pulgadas tan solo en el mes de marzo. El aeropuerto de Rota registr 0,19 pulgadas de lluvia esta semana, habiendo resultado hmedo cada uno de los meses comprendidos entre junio de 2025 y marzo de 2026. El total de 15,94 pulgadas registrado en marzo es casi cuatro veces superior al requisito hdrico mensual mnimo de 4 pulgadas. Dededo registr 0,21 pulgadas durante la semana, si bien faltan datos correspondientes a dos das. Guam report 0,34 pulgadas de lluvia durante esta ltima semana de sequa; cabe destacar que las cinco semanas anteriores resultaron hmedas, al igual que cada uno de los meses transcurridos entre junio de 2025 y marzo de 2026. Guam recib 14,90 pulgadas de lluvia en marzo. En Tinian no se dispuso de datos suficientes esta semana para realizar un anlisis fiable. Si bien esta ha sido una semana seca para el CNMI, el volumen de precipitaciones recibido en los meses precedentes (incluido marzo de 2026) ha sido ms que suficiente para justificar el mantenimiento de las condiciones actuales de ausencia de sequa.

La Repblica de Palaos experimenta una semana muy seca, con tan solo 0,15 pulgadas de precipitacin registradas en Koror (con 2 das de datos faltantes) y 0,23 pulgadas en Airai (WSO Palaos). Los totales mensuales de marzo de 2026 fueron de 11,20 y 12,62 pulgadas, respectivamente, cifras que superaron con holgura el requisito hdrico mnimo de 8 pulgadas. A pesar de esta semana tan seca en Palaos, los meses anteriores (incluido marzo) han sido hmedos. Persisten las condiciones libres de sequa.

En todos los Estados Federados de Micronesia (EFM), los volmenes de precipitacin oscilaron entre 0,09 pulgadas en Ulithi y 10,81 pulgadas en Pohnpei. Entre los valores intermedios se registraron 0,17 pulgadas (con 1 da de datos faltantes) en Rumung, 0,29 pulgadas en North Fanif, 0,37 pulgadas (con 1 da faltante) en Gilman, 0,55 pulgadas (con 1 da faltante) en la isla de Yap, 1,19 pulgadas en Lukunoch, 1,22 pulgadas (con 1 da faltante) en Kosrae, 1,28 pulgadas en Kapingamarangi, 1,38 pulgadas en Nukuoro y 6,72 pulgadas en Chuuk. Solo Chuuk y Pohnpei superaron esta semana el requisito mnimo semanal de 2 pulgadas necesario para cubrir la mayor parte de las necesidades hdricas. Fananu, Pingelap y Woleai no informaron volmenes de precipitacin esta semana y, por consiguiente, quedaron excluidos de los anlisis. Una estacin que requiere seguimiento es Lukunoch, clasificada actualmente como D0(S). En los tres meses anteriores enero, febrero y marzo de 2026 se registraron totales de precipitacin de 6,73 pulgadas, 5,95 pulgadas y 6,11 pulgadas, respectivamente; todos ellos quedaron por debajo del umbral mnimo de 8 pulgadas.

En la Repblica de las Islas Marshall (RMI), los valores de precipitacin registrados oscilaron entre 0,60 pulgadas en Jaluit (aunque con 4 das de datos faltantes) y 3,57 pulgadas en Majuro. Entre los valores intermedios se incluyeron 0,70 pulgadas en Utirik, 1,62 pulgadas en Wotje, 1,79 pulgadas en Mili, 2,41 pulgadas en Kwajalein y 2,74 pulgadas en Ailinglaplap. Por consiguiente, en Kwajalein, Ailinglaplap y Majuro se cumplieron los requisitos hdricos semanales mnimos de al menos 2 pulgadas. En cuanto al mes de marzo de 2026, los valores de precipitacin incluyeron 3,49 pulgadas en Wotje (seco), 6,49 pulgadas en Kwajalein (seco), 7,70 pulgadas en Utirik (seco), 16,17 pulgadas en Ailinglaplap (hmedo) y la impresionante cifra de 20,30 pulgadas en Mili (hmedo). Con base en los datos de las Estaciones Meteorolgicas

Automatizadas (AWS), se aplicó una mejora de una categoría en la clasificación de la sequía tanto en Utiarik (que pasa a ser D2-S) como en Wotje (que pasa a ser D1-S).

En el Pacífico Sur, las precipitaciones registradas en la Samoa Americana durante la última semana de sequía incluyeron 0,61 pulgadas (con un día de datos faltantes) en Toa Ridge, 0,79 pulgadas en el Aeropuerto de Pago Pago y 1,95 pulgadas (con un día de datos faltantes) en Siufaga Ridge. Aunque Siufaga Ridge estuvo cerca de alcanzar el umbral mínimo semanal de 2 pulgadas, las tres ubicaciones se quedaron cortas esta semana y fueron clasificadas como secas. Durante la semana anterior a la pasada, Pago Pago reportó 6,20 pulgadas (clasificado como húmedo), y el total del mes de marzo fue de 11,96 pulgadas (húmedo). En cuanto a marzo, Siufaga Ridge registró 7,22 pulgadas de lluvia (seco) y Toa Ridge registró 7,65 pulgadas (seco). No se consideró necesario realizar cambios esta semana en la representación de la sequía para la Samoa Americana.

Mirando hacia el futuro

El Pronóstico Cuantitativo de Precipitación a 7 días del Centro de Predicción Meteorológica del NWS prevé acumulaciones de precipitación que, por lo general, oscilarán entre 1 y 4 pulgadas en las zonas orientales de las Llanuras del Sur, el Medio Oeste y el Noreste; los totales más elevados (localmente de 3 a 4 pulgadas) se concentrarán a lo largo de un corredor que se extiende desde el este de Oklahoma y Arkansas, pasando por el valle medio del Misisipi, hasta las zonas orientales del Medio Oeste Superior. En el Sureste y la región del Atlántico Medio, se esperan condiciones muy secas, con escasa o nula precipitación en la mayoría de las áreas. Se prevé que los totales más altos de la región se registren en zonas aisladas del este de Florida, donde las acumulaciones podrán alcanzar entre 2 y 3 pulgadas. En las Altas Llanuras, se esperan acumulaciones de precipitación de ligeras a moderadas, con rangos de entre 0.25 y 1.5 pulgadas; los totales más significativos se concentrarán en el extremo oriental de la región. En el Oeste, se prevén acumulaciones de precipitación líquida de moderadas a intensas en diversas zonas de California particularmente a lo largo de la Sierra Nevada central y septentrional, así como en las cordilleras costeras, al igual que en sectores de las Montañas Rocosas centrales y septentrionales; por su parte, en algunas zonas del Noroeste del Pacífico se esperan totales de ligeros a moderados. Se prevé que prevalezcan condiciones secas en gran parte del Suroeste, incluyendo zonas de los desiertos del sureste de California, el sur de Nevada, Arizona y Nuevo México.

El pronóstico de temperaturas a 6-10 días del NWS (válido del 14 al 18 de abril de 2026) prevé temperaturas superiores a lo normal en casi la totalidad de los Estados Unidos contiguos, con las probabilidades más altas concentradas en la mitad oriental del país, incluyendo el Medio Oeste, el Sureste, la región del Atlántico Medio y el Noreste. Las temperaturas inferiores a lo normal se limitan a las zonas situadas a lo largo de la región fronteriza más amplia entre Estados Unidos y Canadá, en las Llanuras del Norte y el Alto Medio Oeste; por su parte, se esperan temperaturas cercanas a lo normal en algunas partes del Noroeste del Pacífico.

En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico a 6-10 días prevé valores superiores a lo normal en el Lejano Oeste, el norte de las Montañas Rocosas, Nuevo México, Texas, el Sur (en su extremo oriental), partes de las Llanuras centrales y meridionales, el Medio Oeste y el Noreste. Se

esperan precipitaciones cercanas a lo normal en el Oeste Intermontano, el Suroeste Desrtico, reas del Sur, la regin del Atlntico Medio y la costa de Nueva Inglaterra. Se favorecen precipitaciones inferiores a lo normal en el Sureste y en partes del Atlntico Medio.

Autor(s)

Anthony Artusa, NOAA/NWS/NCEP/CPC

David Simeral, Western Regional Climate Center