

Resumen nacional de sequía para 14 abril, 2026

Resumen

Gran parte del país continuó experimentando temperaturas superiores a lo normal durante el mes de abril. Durante la última semana, las temperaturas más cálidas se registraron en el sur del Medio Oeste y se extendieron hacia las Llanuras Centrales, donde las desviaciones respecto a la norma fueron de 9 °F o superiores. California y algunas zonas del Sureste, extendiéndose hacia la región del Atlántico Medio, registraron temperaturas cercanas a lo normal o ligeramente por debajo de la media. La sequía ha persistido en el Sureste, en algunas partes del Sur, en el Noreste y en gran parte de las Altas Llanuras. Las mayores precipitaciones se produjeron en la Gran Cuenca, el norte de California, el centro y el oeste de Texas, el noreste de Kansas y en gran parte de Michigan y Wisconsin, regiones donde se desarrollaron tormentas primaverales en el marco de un patrón meteorológico activo, centrado principalmente en el Medio Oeste.

Noreste

Las temperaturas en la región mostraron variaciones esta semana. Las zonas occidentales se situaron entre 2 y 4 grados por encima de lo normal, con algunos focos de desviaciones mayores en Nueva York y Pensilvania. Las áreas costeras registraron valores cercanos a la normalidad o ligeramente por debajo de ella. El norte de Nueva Inglaterra fue la zona más húmeda de la región; algunas partes de Nueva York, Vermont, Nuevo Hampshire y Maine registraron entre el 100 % y el 150 % de la precipitación habitual para la semana. Más al sur, las precipitaciones disminuyeron, predominando las condiciones secas en el sur de Nueva Jersey, Virginia y Virginia Occidental.

La sequía moderada se extendió por la mayor parte del sur de Nueva Jersey, el este de Pensilvania y el norte de Delaware. En Virginia, la sequía moderada y la severa se expandieron; esta última avanzó hacia el norte, adentrándose en el sur de Maryland. En Virginia Occidental, las condiciones de sequedad anormal se extendieron por gran parte del estado, mientras que la sequía moderada se expandió por las zonas del sur y del este. En el norte de Vermont, New Hampshire y el extremo noroeste de Maine — zonas que recibieron la mayor cantidad de precipitaciones—, las condiciones de sequedad anormal y de sequía moderada experimentaron una mejoría. Se observaron mejoras similares en el extremo oriental de Massachusetts.

Sureste

Gran parte de la región registró temperaturas de casi normales a ligeramente por debajo de lo normal esta semana. La zona occidental constituyó la excepción, con temperaturas entre 3 y 6 grados por encima de lo normal. Las temperaturas más frescas se registraron a lo largo de la costa atlántica de Florida, donde varios episodios de lluvia contribuyeron a reducir los valores térmicos. Fuera de Florida, la región se mantuvo seca, y la mayoría de las zonas registraron escasa o nula precipitación esta semana.

La zona costera del este de Florida y gran parte del sur del estado registraron precipitaciones superiores a lo normal, con algunas áreas localizadas que superaron las 6 pulgadas. La persistente sequedad en toda la región provocó un deterioro generalizado de las condiciones de sequía. Casi la totalidad del estado de Alabama experimentó un empeoramiento de una categoría, con una sequía extrema extendiéndose por el sureste y una sequía severa afectando a gran parte del estado.

En Georgia, la sequía excepcional se extendió hacia el este, mientras que la sequía extrema en las zonas del norte se desplazó ligeramente hacia el sur. En las Carolinas, la sequía severa se propagó por gran parte del este de Carolina del Sur, al tiempo que la sequía extrema se expandió en el extremo sureste. La sequía extrema también se extendió a lo largo de la frontera entre Carolina del Norte y Carolina del Sur, así como en el oeste y el noreste de Carolina del Norte. Florida recibió suficientes precipitaciones para evitar un deterioro esta semana, a pesar de registrar niveles de lluvia inferiores a lo normal en algunas zonas. Se observaron mejoras a lo largo de la costa atlántica y en algunas partes del centro de Florida.

Medio Oeste

Un patrón meteorológico activo provocó lluvias significativas en muchas zonas, mientras que las localidades situadas fuera de la trayectoria de la tormenta permanecieron mayormente secas. Las áreas que se extienden desde el oeste de Misuri hasta el sur de Iowa, Wisconsin, el norte de Illinois y el norte de Michigan registraron entre el 200 % y el 400 % de la precipitación normal para la semana. Por el contrario, las zonas que van desde el sureste de Misuri hasta el centro de Illinois, y que se adentran en Ohio y Kentucky, recibieron menos del 25 % de la precipitación normal. El norte de Iowa y el norte de Minnesota también resultaron más secos de lo normal.

Las temperaturas se situaron por encima de lo normal en la mayor parte de la región; solo el norte de Michigan y Minnesota registraron valores cercanos a la normalidad o ligeramente por debajo de ella. En algunas zonas de Illinois, Missouri y el oeste de Indiana, las temperaturas superaron los valores normales entre 9 y 12 grados. Las condiciones secas y cálidas propiciaron la expansión de condiciones de sequedad anormal a través del sur de Indiana y el norte de Kentucky. La sequía moderada se extendió por gran parte del este y el norte de Kentucky, mientras que la sequía extrema se expandió sobre el «tacón» de Missouri y hacia el extremo occidental de Kentucky.

En el norte de Misuri, el este de Illinois y el sur y el oeste de Iowa, las condiciones de sequía moderada y sequedad anormal mejoraron esta semana, respaldadas por indicadores a corto plazo.

Altas Llanuras

Las temperaturas se situaron, en su mayor parte, por encima de lo normal; únicamente el este de Dakota del Norte y el noreste de Dakota del Sur registraron valores cercanos a lo normal o por debajo de este. Las mayores desviaciones se produjeron en el centro de Kansas, donde las temperaturas superaron lo normal entre 12 y 15 grados. Asimismo, se observaron precipitaciones superiores a lo normal en el suroeste y el norte de Dakota del Norte.

Kansas experimentó la actividad meteorológica más intensa; las zonas del suroeste y del este del estado, así como el sureste de Nebraska, registraron precipitaciones superiores a lo normal. Algunas áreas del noreste de Kansas recibieron más del 400 % de las precipitaciones habituales. Estas lluvias propiciaron una mejora en las condiciones de sequía anormal y sequía moderada en el sureste de Nebraska y el noreste de Kansas. Algunas zonas del este de Nebraska y del centro-sur de Kansas también experimentaron mejoras.

La sequía extrema se extendió por el suroeste de Nebraska y el noroeste de Kansas, mientras que la sequía severa se extendió por el suroeste de Kansas. Las llanuras del este de Colorado experimentaron una degradación de casi una categoría completa, con la expansión de la sequía moderada, severa y extrema.

Sur

Las precipitaciones fueron variadas en toda la región. Oklahoma y gran parte del centro y el oeste de Texas recibieron más del 150 % de las precipitaciones normales. Más hacia el este, el este de Arkansas y Luisiana registraron precipitaciones ligeras, mientras que las zonas situadas más al oeste —incluido Tennessee— permanecieron mayormente secas.

Las temperaturas se situaron por encima de lo normal en gran parte de la región; solo el sur de Texas, el sur de Luisiana y el este de Misisipi registraron valores cercanos a lo normal o por debajo de este. Las mayores desviaciones se produjeron en el oeste de Oklahoma y en el Panhandle de Texas, donde las temperaturas superaron lo normal entre 12 y 15 grados.

La sequía se extendió e intensificó en gran parte de Tennessee; la sequía moderada y severa se expandió por todo el estado, y surgió una nueva zona de sequía extrema en

el noroeste. En Mississippi, la sequía moderada y severa se extendió por las zonas este y sur, mientras que la sequía extrema se expandió en el noroeste. Arkansas permaneció seco, con una expansión de la sequía extrema y excepcional tanto en las zonas del norte como en las del sur.

Luisiana experimentó una expansión de la sequía extrema en gran parte del sur, así como en las zonas central y norte. La sequía moderada y severa también se extendió por las zonas meridionales del estado. Oklahoma se mantuvo prácticamente inalterado, con solo una leve expansión de la sequía severa en la región del Panhandle.

Las mejoras más significativas se produjeron en Texas, donde gran parte de las zonas central, sur y sureste del estado experimentaron una mejora de una categoría completa en las condiciones de sequía. Sin embargo, la sequía severa se extendió por algunas partes del Panhandle.

Oeste

Temperaturas superiores a lo normal predominaron en la región durante la semana pasada. Las desviaciones se situaron entre 6 y 8 grados por encima de lo normal en la mayor parte de Utah, Colorado y Wyoming. Solo el área de Sierra Nevada y el norte de California registraron valores cercanos a lo normal o ligeramente por debajo de este.

La precipitación fue mixta; algunas zonas del norte de California, el norte de Nevada, el este de Oregón, el sur de Utah, el este y el oeste de Nuevo México, el suroeste de Idaho y el este de Washington registraron precipitaciones superiores a lo normal.

La falta de acumulación de nieve continuará afectando a la región en los próximos meses. El deshielo más temprano de lo normal, los totales estacionales por debajo de la media y el aumento de la precipitación líquida están contribuyendo a los impactos hidrológicos.

Los cambios de esta semana incluyeron mejoras en la sequía moderada en el noreste de California y una expansión de la sequía moderada y severa en el sur de Arizona. Desde el sur de Idaho hasta el norte de Nevada se observó una expansión de la sequía severa, extrema y excepcional, mientras que la sequía severa se extendió por el este y el norte de Nuevo México.

Caribe

No hubo cambios en Puerto Rico esta semana.

Hasta el final del periodo, había sido una semana relativamente seca en todas las Islas Vírgenes de los EE. UU., con la caída de unas pocas décimas de pulgada de lluvia en la mayoría de las localidades. Algunas zonas podrían haber estado al borde de una sequedad a corto plazo; sin embargo, a finales de la semana cayeron lluvias de moderadas a intensas en la mayor parte de la región. La mayoría de las localidades reportaron entre 1.0 y 2.5 pulgadas de lluvia en las últimas 24 a 48 horas, aunque algunas partes de St. Croix recibieron un poco menos de una pulgada. Aun así, estos volúmenes elevaron los totales acumulados de abril —hasta la fecha— a niveles cercanos o superiores a lo normal y, dado que no se observó sequedad previa, esto resulta suficiente para descartar cualquier designación de sequedad o sequía en este momento.

Pacífico

No se produjeron cambios en Alaska esta semana.

En Hawái, las condiciones más húmedas recientes permitieron una reducción adicional de las condiciones anormalmente secas en las zonas centrales de la Isla Grande.

Las precipitaciones, de intensas a excesivas, registradas durante los últimos meses se vieron exacerbadas por el supertifón Sinlaku, el cual avanzó lentamente a través de las Marianas hasta el 15 de abril. El centro del tifón se desplazó por el norte de las Marianas, cerca de Saipán; no obstante, las ráfagas de viento superaron la fuerza de huracán en toda la cadena de islas. Saipán reportó ráfagas de viento que alcanzaron las 130 mph, mientras que Guam —situada muy al sur del centro del tifón— registró una ráfaga de 87 mph. Las lluvias fueron intensas, especialmente en el extremo sur del archipiélago, cerca de Guam, donde se reportaron acumulaciones de más de un pie de agua hasta media tarde del 15 de abril. Saipán reportó 5.73 pulgadas de lluvia hasta el 14 de abril, mientras la tormenta aún estaba activa. Estos volúmenes elevaron los totales acumulados entre el 1 de marzo y el 15 de abril a niveles cercanos o superiores al récord histórico para dicho periodo. Guam registró 28.46 pulgadas durante este mes y medio (cuando lo normal es 4.36 pulgadas), y Saipán midió 20.59 pulgadas (frente a una normal de 3.15 pulgadas). Saipán reportó un acumulado de 41.46 pulgadas en lo que va del año (siendo la normal de 9.30 pulgadas), y Guam ha recibido más de 50 pulgadas de lluvia desde diciembre de 2025 (cuando lo normal es menos de 20 pulgadas). Huelga decir que no se observa sequedad ni condiciones de sequía en ningún punto de las Marianas, y existe una probabilidad ínfima de que tales condiciones se desarrollen en un futuro cercano.

En Palaos, el mes de abril ha tenido un comienzo seco; los registros acumulados en Koror entre el 1 y el 13 de abril suman poco más de media pulgada (faltan los informes correspondientes a dos días). Sin embargo, los dos meses anteriores fueron, al menos en cierta medida, más húmedos de lo normal: febrero registró casi 11 pulgadas y marzo, una cantidad ligeramente superior. Estos volúmenes resultaron más que

suficientes para satisfacer la demanda de agua, por lo que esta semana no se observa ninguna situación de sequedad ni de sequía; no obstante, será necesario vigilar la situación si el mes de abril continúa siendo muy seco.

El mes de abril también ha tenido un comienzo muy seco en las zonas occidentales de los Estados Federados de Micronesia (EFM). En Yap cayeron menos de media pulgada de lluvia hasta el día 13 (apenas un 15 por ciento de lo normal), y en Ulithi se registraron menos de 0,9 pulgadas (por debajo del 40 por ciento de lo normal). No obstante, los tres primeros meses del año registraron niveles de precipitación cercanos a la normalidad o superiores a ella, por lo que en este momento no se observa ninguna sequedad o sequía de impacto. Yap reportó más de 10,5 pulgadas de lluvia en enero (un 145 por ciento de lo normal), seguidas de 6,71 pulgadas en febrero (un 112 por ciento de lo normal) y 6,92 pulgadas en marzo (más del 130 por ciento de lo normal).

En la zona central de los FSM, desde Chuuk hacia el sur hasta Kapingamaringi, Lukunor permanece anormalmente seco esta semana (D0), mientras que no se observa sequedad ni sequía en ningún otro lugar. Lukunor registró entre el 60 y el 75 por ciento de los valores normales durante cada uno de los tres primeros meses de 2026 y, en lo que va de abril, se han reportado 3,58 pulgadas, lo que representa poco menos del 70 por ciento de lo normal. En lo que va del año, Lukunor reporta 22,37 pulgadas de lluvia, en comparación con el promedio normal de alrededor de 34,6 pulgadas, lo cual respalda la designación D0. Esta cifra es ligeramente inferior a la necesaria para satisfacer la demanda a largo plazo, aunque hasta la fecha no se han reportado escaseces graves de agua (además, faltan datos correspondientes a varios días). Hacia el sur, Nukuoro y Kapingamaringi han reportado menos de la mitad de las precipitaciones normales en lo que va de abril (3,56 y 2,48 pulgadas, respectivamente). Sin embargo, Kapingamaringi registró precipitaciones más que suficientes para satisfacer la demanda durante los tres primeros meses del año (más de 28 pulgadas). En Nukuoro, el mes de marzo (8,49 pulgadas) resultó considerablemente más seco de lo normal, aunque lo suficientemente húmedo como para cubrir la demanda. Esto se produjo tras haber recibido casi 20 pulgadas de lluvia en febrero, por lo que no se han emitido designaciones de sequedad ni de sequía para estas dos localidades. Al norte de Lukunor, el clima ha sido mucho más húmedo en Chuuk, donde no existe ninguna designación de sequía o sequedad. Los totales de abril hasta la fecha se acercan a las 14 pulgadas (más del doble de lo normal), cifra que se suma a las cerca de 11 pulgadas —o más— registradas en cada uno de los tres meses anteriores de 2026.

Pohnpei es el único lugar que ha reportado precipitaciones de manera constante recientemente, y el mes de abril ha resultado ser sumamente lluvioso en la zona. Cayeron casi 14 pulgadas de lluvia durante la semana, lo que elevó el acumulado mensual —hasta la fecha— a cerca de 25 pulgadas, sin haberse alcanzado siquiera la mitad del mes. Como consecuencia, no se ha determinado ninguna situación de sequedad ni de sequía, y tampoco se prevé que surja alguna en un futuro cercano.

La República de las Islas Marshall (RMI), situada en el noreste, fue la única zona dentro del conjunto de las Islas del Pacífico Afiliadas a los EE. UU. (USAPI) que reportó

condiciones de sequía la semana pasada (6 de abril). Utirik se encontraba en una situación de sequía severa (D2), mientras que en Wotje se registró una sequía moderada (D1). Sin embargo, las precipitaciones han aumentado drásticamente desde finales de marzo, y esta tendencia se mantuvo a lo largo de la semana pasada. Entre el 22 de marzo y el 13 de abril, se reportaron 16,70 pulgadas de lluvia en Utirik; de este total, 8,27 pulgadas cayeron durante la segunda mitad de la semana pasada. Wotje registró cantidades menores (7,57 pulgadas) desde el 20 de marzo, incluyendo casi 3 pulgadas durante la semana pasada. Estas cantidades han mejorado drásticamente las condiciones en las últimas tres semanas, por lo que esta semana ambas localidades han sido clasificadas como «anormalmente secas» (D0). Esto representa una mejora de dos categorías en el caso de Utirik. Hacia el oeste, Kwajalein ha recibido precipitaciones más constantes durante los últimos meses, y actualmente la región no se ve afectada por condiciones de sequedad o sequía. Las poco menos de 2,5 pulgadas registradas la semana pasada elevaron el acumulado del mes de abril (hasta la fecha) a cerca de 4,9 pulgadas, y el acumulado anual (en lo que va del año) a más de 23,5 pulgadas; esta última cifra supera considerablemente el promedio normal de aproximadamente 16,5 pulgadas para dicho periodo.

Más al sur, las zonas central y meridional de las Islas Marshall (Ailinglapalap, Jaluit, Majuro y Mili) se encuentran libres de sequedad y sequía. La semana pasada, los totales de precipitaciones oscilaron entre 1,23 pulgadas en Ailinglapalap y 2,38 pulgadas en Mili. Los totales de abril hasta la fecha se sitúan cerca o por encima de lo normal en Ailinglapalap (3,97 pulgadas; 136 por ciento de lo normal) y Majuro (4,86 pulgadas; 116 por ciento de lo normal), mientras que los acumulados de los últimos 30 días superaron las 18 pulgadas en Mili. Esto se produjo tras unas abundantes precipitaciones entre febrero y marzo en Ailinglapalap (27,85 pulgadas; aproximadamente 2,5 veces lo normal) y unas precipitaciones cercanas a lo normal entre enero y marzo en Majuro. Jaluit fue el único lugar que registró precipitaciones por debajo de lo normal en abril hasta la fecha (2,71 pulgadas; 57 por ciento de lo normal), tras haber recibido cantidades cercanas a lo normal la semana anterior. No obstante, esto sucedió después de que los totales de febrero y marzo superaran las 20 pulgadas.

En lo que va del año, Samoa Americana ha experimentado una alternancia de periodos secos y húmedos. Actualmente no se justifica ninguna designación de sequedad o sequía; no obstante, el mes de abril ha sido bastante seco hasta la fecha (1,9 pulgadas, menos del 40 por ciento de lo normal), y los registros de febrero también resultaron desfavorablemente bajos (5,1 pulgadas, alrededor del 40 por ciento de lo normal). Entre ambos periodos, sin embargo, marzo trajo consigo precipitaciones cercanas a la normalidad —apenas por debajo de un pie—, y a principios de año, en enero, se registraron casi 28 pulgadas de lluvia (casi el doble de lo normal).

Mirando hacia el futuro

Durante los próximos 5 a 7 días, se espera que las precipitaciones sean más destacadas en las Llanuras del Sur, el Medio Oeste y el Noreste. Es probable que las precipitaciones más intensas se concentren desde el este de Kansas hacia Misuri, y se extiendan hacia el norte, abarcando el este de Iowa, el norte de Illinois y la región de los Grandes Lagos.

Se esperan precipitaciones adicionales desde el noroeste del Pacífico hasta el norte de las Rocosas y las Grandes Llanuras. Es probable que la sequedad persista en gran parte del suroeste y el sureste.

Se prevé que las temperaturas se sitúen por encima de lo normal desde el norte de las Montañas Rocosas hasta las Grandes Llanuras, registrándose las mayores desviaciones en el oeste de Nebraska, el este de Colorado y el centro de Montana (de 10 a 13 grados por encima de lo normal). Se anticipan temperaturas inferiores a lo normal en gran parte del centro de Texas (de 5 a 9 grados por debajo de lo normal), mientras que se esperan condiciones más cálidas de lo habitual en la región del Atlántico Medio (de 5 a 7 grados por encima de lo normal).

Los pronósticos para el periodo de 6 a 10 días indican que las zonas con mayores probabilidades de experimentar temperaturas por debajo de lo normal se encuentran en el Suroeste —especialmente en Arizona, el sur de Nevada y California—, así como en Nueva Inglaterra, siendo las probabilidades más altas en Arizona y Maine. Existe una alta probabilidad de temperaturas por encima de lo normal en gran parte del Medio Oeste y de las Llanuras, extendiéndose hacia el Sur y el Sureste; las probabilidades más elevadas se concentran en Kansas, Misuri, Arkansas y Oklahoma, abarcando también el sur de Nebraska y de Iowa. Se prevé que las probabilidades de precipitación sean cercanas a lo normal en el sur de Florida y en las zonas meridionales de Nuevo México y Arizona. Asimismo, se espera una precipitación cercana a lo normal en el Noroeste del Pacífico, en la parte superior del Medio Oeste y en las Llanuras del Norte. En el Noreste, se observará una combinación de probabilidades de precipitación que oscilarán entre lo cercano a lo normal y lo inferior a lo normal. En la mayor parte del resto del país, existe una probabilidad superior a lo normal de registrar precipitaciones por encima de los valores habituales, siendo las probabilidades más altas en una franja que se extiende desde el norte de Luisiana hasta Indiana.

Autor(s)

Brian Fuchs, National Drought Mitigation Center

Richard Tinker, NOAA/NWS/NCEP/CPC