

Resumen nacional de sequía para 21 abril, 2026

Resumen

La semana se caracterizó por una franja de precipitaciones superiores a lo normal que se extendió desde el sur de Texas hasta el este de Oklahoma, Misuri, Illinois, Michigan y el sur de Wisconsin. Muchas zonas dentro de esta franja recibieron más del 150 % de las precipitaciones habituales, y algunas localidades superaron el 400 % durante la semana. Desde el valle del Ohio hacia el sur, adentrándose en el sureste, las condiciones se mantuvieron bastante secas, registrándose escasas o nulas precipitaciones en la mayor parte de la región.

El Oeste también se mantuvo mayormente seco; solo las zonas costeras de California y algunas partes del Noroeste del Pacífico registraron precipitaciones superiores a lo normal. Las zonas septentrionales del Noreste recibieron lluvias, y algunas áreas —desde el oeste de Nueva York hasta Maine— registraron un 200 % o más de las precipitaciones habituales.

Las temperaturas se mantuvieron entre valores cercanos a lo normal y ligeramente por debajo de lo normal en todo el Oeste, con desviaciones de hasta 5 °F por debajo de lo normal en algunas zonas. Partes de las Llanuras Centrales, el Medio Oeste, el Noreste y la región del Atlántico Medio experimentaron temperaturas superiores a lo normal, con desviaciones de entre 5 y 10 °F por encima de lo normal. En el Sureste, las temperaturas se situaron entre valores cercanos a lo normal y ligeramente por encima de lo normal, con condiciones más frescas en el Panhandle de Florida.

Noreste

Las temperaturas fueron más cálidas de lo normal en casi toda la región, a excepción del extremo norte de Maine. La mayoría de las zonas registraron valores entre 4 y 8 °F por encima de lo normal durante la semana. Se produjeron lluvias, aunque estas se limitaron en gran medida a las zonas del norte —desde el oeste de Pensilvania y Nueva York, pasando por el norte de Vermont y New Hampshire, hasta llegar a Maine—, donde muchas localidades registraron un 150 % o más de la precipitación normal.

Este patrón más húmedo propició mejoras en las condiciones de sequía anormal y moderada en el norte de Vermont, New Hampshire y Maine. La sequía severa fue eliminada en el norte de Maine y reducida en el sur del estado.

En las zonas meridionales de la región, la sequía moderada se extendió por el norte de Nueva Jersey y el este de Pensilvania. La sequía severa se intensificó en el sureste de Pensilvania y el este de Maryland, a medida que persistían las condiciones de sequedad. En Virginia, la sequía severa se expandió hacia las áreas del sur y del oeste, desarrollándose una sequía extrema a lo largo de la frontera meridional con Carolina del Norte. La mayor parte de Virginia Occidental experimentó un deterioro de las condiciones; actualmente, casi la totalidad del estado se encuentra bajo una sequía de moderada a severa.

Sureste

Fue una semana muy seca, en la que solo algunas zonas del norte de Alabama, el oeste de Virginia y Carolina del Norte registraron precipitaciones. Las temperaturas se situaron cerca de los valores normales —o ligeramente por encima de ellos— en las zonas del sur, mientras que en las zonas del norte estuvieron 5 °F o más por encima de lo normal. Algunas partes del sur de Alabama y del Panhandle de Florida se mantuvieron ligeramente por debajo de lo normal.

Ante los fuertes indicios de sequía en escalas temporales de corto a medio plazo —y, en algunos casos, de mayor duración—, la sequía se extendió y se intensificó. En las Carolinas, la sequía severa y extrema se expandió por las zonas occidentales, así como a lo largo del sur de Carolina del Norte hasta el norte de Carolina del Sur.

La sequía de moderada a extrema se extendió por el oeste y el sur de Georgia, así como por el Panhandle de Florida. La sequía excepcional se expandió en el sur de Georgia y el norte de Florida a medida que los impactos se volvieron más generalizados, especialmente en la agricultura.

La mayor parte de Alabama experimentó una degradación de una categoría completa, a excepción de las zonas del norte y del sureste. Todo el estado experimenta ahora algún nivel de sequía, y una sequía extrema abarca gran parte del sur.

Medio Oeste

Las temperaturas se situaron, en su mayor parte, por encima de lo normal, con desviaciones de entre 5 y 10 °F en gran parte de la región. El Alto Medio Oeste —y, en particular, el extremo norte de Minnesota— registró temperaturas cercanas a lo normal o ligeramente por debajo de este.

Las precipitaciones variaron considerablemente. El sur de Wisconsin y Michigan recibieron más del 300 % de las lluvias normales. El sur de Indiana, el centro y el sur de Ohio, Kentucky, el noroeste de Iowa, el norte de Wisconsin y gran parte de Minnesota resultaron más secos.

Se registraron mejoras en Ohio, Indiana e Illinois gracias a las lluvias recientes, lo que alivió la sequía moderada y las condiciones anormalmente secas. El sur de Iowa también experimentó mejoras. El sur de Misuri recibió las precipitaciones necesarias, aunque las mejoras fueron limitadas debido a la persistente sequedad a largo plazo.

El norte de Minnesota y Wisconsin experimentó mejoras en las condiciones, pasando de una sequía anormal a una sequía severa; no obstante, persisten los indicios de sequía a largo plazo.

Se produjo un deterioro en el sur de Illinois, Indiana y Ohio, donde se extendieron las condiciones de sequía anormalmente seca y moderada. Kentucky experimentó un mayor deterioro, encontrándose ahora todo el estado bajo condiciones de sequía. La sequía moderada y severa se extendió por las zonas occidentales y centrales. El periodo comprendido entre noviembre de 2025 y marzo de 2026 se sitúa como el quinto periodo de cinco meses más seco registrado en la división climática occidental de Kentucky. El suroeste de Minnesota también experimentó una ligera expansión de la sequía, de moderada a severa.

Altas Llanuras

La región se mantuvo mayormente seca, con precipitaciones aisladas en el extremo sureste de Nebraska, el norte y sureste de Kansas, y pequeñas zonas de Colorado y Dakota del Norte. Las temperaturas se situaron, por lo general, por encima de lo normal, registrándose las desviaciones más cálidas en el sureste de Nebraska y el este de Kansas.

La sequedad y una primavera cálida provocaron una degradación generalizada. Una sequía extrema se extendió por el centro y el oeste de Nebraska, llegando hasta el noroeste de Kansas. La sequía severa se expandió por el centro y el suroeste de Kansas, registrándose una nueva sequía extrema en el extremo suroeste del estado.

La degradación continuó a través de las llanuras de Wyoming y Colorado, con una expansión de la sequía de moderada a extrema. También se estableció una sequía extrema en el sur de Dakota del Sur.

Se produjeron algunas mejoras en el sureste de Kansas, donde la sequía moderada y las condiciones anormalmente secas disminuyeron debido a las lluvias recientes.

Sur

Las temperaturas se situaron por encima de lo normal en las zonas del norte y del este, con desviaciones de entre 2 y 6 °F. En Texas, las temperaturas pasaron a situarse por debajo de lo normal en las zonas del sur y del oeste, con desviaciones de entre 2 y 6 °F por debajo de la norma.

Las precipitaciones más intensas se registraron desde el centro hasta el sur de Texas, extendiéndose hacia el centro y el este de Oklahoma, donde los acumulados alcanzaron entre el 150 % y el 400 % de lo normal. En otras zonas, las condiciones fueron mayormente secas, incluyendo los Panhandles de Texas y Oklahoma, así como gran parte de Arkansas, Luisiana, Misisipi y Tennessee.

En aquellas zonas de Texas y Oklahoma donde las precipitaciones fueron suficientes, las condiciones de sequía mejoraron o desaparecieron. Sin embargo, la sequía se intensificó en todo Mississippi, donde casi la totalidad del estado experimentó una degradación de una categoría completa y ahora se encuentra, en su totalidad, bajo condiciones de sequía.

La sequía extrema se extendió por el este de Arkansas y el norte y sur de Luisiana, mientras que la sequía moderada aumentó en el sur de Luisiana. La sequía severa y extrema se expandió por el oeste de Tennessee, al tiempo que la sequía moderada se incrementó en el este. Ahora, la totalidad del estado de Tennessee también se encuentra bajo condiciones de sequía.

Oeste

La precipitación fue mixta. Partes del centro y norte de California, el oeste de Oregón y Washington, gran parte de Idaho y áreas aisladas de Montana, Utah y Colorado registraron precipitaciones superiores a lo normal. Sin embargo, la mayor parte de la región se mantuvo

más seca de lo normal.

Las temperaturas fueron, en general, más frescas de lo normal; el norte de Nevada experimentó desviaciones de hasta 6 °F por debajo de lo habitual. El sur de California y Arizona registraron las condiciones más cálidas, con temperaturas de hasta 6 °F por encima de lo normal.

Las condiciones de sequía empeoraron en gran parte de Nevada, con una expansión de la sequedad anormal hacia la sequía severa. La sequía severa se extendió hacia el noroeste de Utah, mientras que la sequía de moderada a severa aumentó en el oeste y el sur de Arizona. La sequía severa también se expandió en el oeste de Wyoming, y se introdujo la sequía extrema en el suroeste de Montana.

Oregón y Washington experimentaron una ligera expansión de las condiciones de sequía anormal a moderada, con un pequeño aumento de la sequía severa en el suroeste de Oregón. El sur de California también experimentó una expansión de las condiciones de sequía anormal.

Los impactos se están volviendo más evidentes a medida que la capa de nieve se ha derretido en gran medida, y la escorrentía temprana podría contribuir a futuros problemas de suministro de agua.

Caribe

No se realizaron cambios en Puerto Rico. El área de San Juan comienza a mostrar indicios de sequedad, aunque las lluvias recientes han mantenido condiciones de humedad generalizadas.

A principios de la semana de sequía (del miércoles 15 al martes 21 de abril), una vaguada de niveles medios a altos y un sistema de alta presión en superficie sobre el Atlántico Norte constituyeron los elementos dominantes en toda la región. Su interacción propició un patrón húmedo, inestable y ventoso, con chubascos y tormentas eléctricas localizados. Durante la última parte del periodo, prevaleció un patrón más seco y estable.

En St. Croix, los montos de precipitación de la semana oscilaron entre 0.33 pulgadas en el Aeropuerto Rohlsen y 1.70 pulgadas en VI-SC-30 (Christiansted 1.7 SW; falta 1 día de datos). Los valores intermedios de lluvia, en orden ascendente, son: 0.80 pulgadas en East Hill, 0.81 pulgadas en VI-SC-20 (Frederiksted 1.7 ESE), 0.93 pulgadas en VI-SC-29 (Frederiksted 2.5 NNE; faltan 2 días), 0.94 pulgadas en VI-SC-34 (Frederiksted 1.9 NE), 0.97 pulgadas en VI-SC-24 (Christiansted 2.1 ENE; faltan 2 días), 1.01 pulgadas en VI-SC-35 (Frederiksted 1.3 ENE; falta 1 día), 1.22 pulgadas en VI-SC-32 (faltan 2 días), 1.24 pulgadas en VI-SC-25 (Christiansted 4.4 W; faltan 2 días), 1.29 pulgadas en VI-SC-10 (Christiansted 1.6 E) y 1.69 pulgadas en VI-SC-23 (Christiansted 6.5 W; falta 1 día). Hubo una estación que reportó solo 0.16 pulgadas de precipitación, pero, al faltar 5 días de datos, no se incluyó en la lista (VI-SC-9 (Christiansted 4.1 ESE)). En cuanto al Índice Estandarizado de Precipitación (SPI), los valores de 1, 3, 6, 9 y 12 meses para East Hill son, respectivamente: 0.78, 1.49, -0.2, 0.27 y -0.16; mientras que Rohlsen reportó valores de SPI de 1 y 3 meses de 0.21 y -1.1, respectivamente. El pozo Adventure 28 comenzó a unos 20,75 pies por debajo de la superficie del terreno,

lentamente con el tiempo y finalizó cerca de los 20,49 pies.

En cuanto a St. John, las mediciones de precipitación correspondientes a la semana de sequía registraron 0.42 pulgadas en VI-SJ-10 (Cruz Bay 3.1 NNW) y 1.32 pulgadas de lluvia en VI-SJ-5 (Cruz Bay 1.6 E). La lluvia más intensa se produjo en VI-SJ-3 (Windswept Beach), donde se midieron 1.59 pulgadas. En lo que va del mes de abril, han caído 3.43 pulgadas de lluvia, sumándose a las 2.25 pulgadas acumuladas durante marzo. Un observador señala: «un abril bastante húmedo... muy por encima de nuestro promedio. Todo se está reverdeciendo». Los valores del SPI para periodos de 1, 3, 6, 9 y 12 meses son, para esta semana: 1.39, 1.66, -0.15, 0.6 y 0.19, respectivamente. La zona de East End no presentó informes. El nivel del pozo Susannaberg Dpw 3 comenzó cerca de los 13.13 pies y se mantuvo bastante estable antes de ascender; posteriormente, descendió con relativa rapidez hasta situarse muy cerca de su punto de partida, en los 13.12 pies, hacia el final del periodo.

En St. Thomas, los montos de precipitación oscilaron entre 0.27 pulgadas en VI-ST-15 (Charlotte Amalie West 1.3 N) y 0.61 pulgadas en VI-ST-13 (Charlotte Amalie 1.2 NNW). El Aeropuerto Cyril King registró 0.29 pulgadas de lluvia durante esta última semana de sequía, con valores del SPI a 1, 3 y 6 meses de 0.48, 0.83 y -0.75, respectivamente. El nivel del agua en el pozo Grade School 3 comenzó cerca de los 4.55 pies, seguido de un ligero ascenso. Muy avanzada la noche del 19 de abril, el nivel del agua experimentó un repunte brusco hasta los 4.15 pies; posteriormente alcanzó un máximo de 4.12 pies para luego descender nuevamente hasta los 4.45 pies al final de la semana.

Debido a los valores del SPI, a la precipitación recibida y al hecho de que nos encontramos en las etapas iniciales de la temporada de lluvias, todas las islas permanecen en D-nada.

Pacífico

En Alaska, las áreas anormalmente secas se redujeron tras las recientes precipitaciones.

No se realizaron cambios en Hawái.

Durante la semana de sequía comprendida entre el miércoles 15 y el martes 21 de abril, el fenómeno meteorológico predominante fue el primer tifón —y posteriormente supertifón— de la temporada de ciclones tropicales del Pacífico Occidental septentrional: Sinlaku. El Commonwealth de las Islas Marianas del Norte (CNMI), Guam y el estado de Chuuk fueron los lugares más afectados por esta tormenta. Sinlaku alcanzó la categoría de supertifón el 12 de abril. Los informes preliminares (que aún requieren verificación) sugieren que las velocidades máximas de vientos sostenidos de un minuto asociadas a esta tempestad alcanzaron los 160 nudos, con una presión central que descendió hasta los 890 hPa. Poco después, Sinlaku se «debilitó» hasta convertirse en un tifón equivalente a categoría 4 debido a un prolongado ciclo de reemplazo de la pared del ojo, perdiendo así su estatus de supertifón. No obstante, este potentísimo tifón tocó tierra en el lado norte de Tinian, quedando Saipán situada dentro del nuevo ojo, ahora de un tamaño mucho mayor. El lento desplazamiento del tifón no hizo más que agravar la devastación, provocando lluvias torrenciales con las consiguientes inundaciones repentinas, un periodo prolongado de vientos sumamente destructivos, cortes en el suministro eléctrico y mareas de tormenta. Los cortes de electricidad trajeron consigo la

de utilizar los sistemas de refrigeración, dejando a los residentes a merced de unas temperaturas extremadamente cálidas. Las necesidades humanitarias, tanto para el socorro inmediato como para la recuperación a largo plazo, están aumentando rápidamente; los residentes requieren acceso a agua potable, alimentos básicos, productos de higiene y combustible. Para más detalles, consulte este artículo del Ejército de Salvación (<https://www.salvationarmyusa.org/stories/typhoon-sinlaku-disaster-response/>). En cuanto a la República de Palaos y los estados occidentales y centrales de los Estados Federados de Micronesia (EFM), esta semana se experimentaron condiciones mucho más secas, ya que una masa de aire seco fue arrastrada hacia estas zonas —situadas en el flanco sur de Sinlaku— a medida que este se desplazaba hacia el noroeste y el norte. En estas áreas, las condiciones marinas y del oleaje constituyeron la principal preocupación durante la semana. Por su parte, en el este de los EFM y en la República de las Islas Marshall (RMI), predominó un patrón meteorológico generalmente inestable durante gran parte de esta semana de sequía, con numerosas lluvias y tormentas eléctricas dispersas. Este fenómeno estuvo relacionado con la interacción de un fragmento de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) con una vaguada de vientos alisios. A medida que Sinlaku se retiraba lentamente de las CNMI, el fragmento de la ZCIT pudo desplazarse hacia el oeste, trayendo consigo algunas lluvias a Kosrae y Chuuk. Sobre el Pacífico Sur, una vaguada de onda corta se aproximó a las islas Samoa desde el norte-noreste. Se observaron algunas lluvias y un breve periodo de actividad tormentosa, seguido de una mejora en las condiciones. Un sistema de alta presión en superficie, anclado al sureste de la región, generó vientos moderados del este con lluvias intercaladas a lo largo de la mitad de la semana.

Estimación de precipitación basada en satélites (hasta las 12:00 UTC del 20/4): Al norte del ecuador, una extensa y alargada región de precipitaciones intensas se centró sobre las CNMI, asociada al ciclón Sinlaku, con acumulados generalizados de entre 2 y 4 pulgadas (y localmente de 4 a 8 pulgadas). Apenas se observaron precipitaciones sobre Palaos, así como en las zonas occidental y central de los FSM. La actividad de chubascos generó principalmente acumulados de entre 0,5 y 2 pulgadas en las RMI, al sur y al este de Kwajalein. Al sur del ecuador, la Samoa Americana recibió precipitaciones de ligeras a moderadas durante la semana, con acumulados generalmente inferiores a tres cuartos de pulgada.

Mirando hacia el futuro

Durante los próximos 5 a 7 días, se esperan las mayores probabilidades de precipitación desde las Llanuras centrales hacia el Sur, el Medio Oeste y partes del Atlántico Medio. El Noroeste del Pacífico y el norte de las Montañas Rocosas también podrían experimentar precipitaciones generalizadas.

Se espera que las temperaturas se sitúen por encima de lo normal en las Llanuras del Sur, el Sur y el Sureste, con desviaciones de 9 a 11 °F en el norte de Texas y Oklahoma, y de 5 a 7 °F en el resto de las zonas. Se pronostican temperaturas inferiores a lo normal para las Llanuras del Norte, el norte de las Montañas Rocosas y California, con desviaciones de 9 a 12 °F por debajo de lo normal en Dakota del Norte y Montana, y de 6 a 9 °F por debajo de lo normal en California.

El pronóstico para los próximos 6 a 10 días indica las mayores probabilidades de temperaturas inferiores a lo normal en las Llanuras y el Medio Oeste, con el mayor potencial concentrado en las Altas Llanuras y la parte superior del Medio Oeste. Las mayores probabilidades de temperaturas superiores a lo normal se sitúan en el Noroeste del Pacífico y a lo largo de la costa sur del Golfo. La mayor probabilidad de precipitaciones superiores a lo normal abarca gran parte del centro y sur de los Estados Unidos, con las mayores posibilidades en el Suroeste. Por su parte, se espera que el norte de los Estados Unidos, a lo largo de la frontera con Canadá, presente las mayores probabilidades de precipitaciones inferiores a lo normal.

Autor(s)

Brian Fuchs, National Drought Mitigation Center

Anthony Artusa, NOAA/NWS/NCEP/CPC