

Resumen nacional de sequía para 28 abril, 2026

Resumen

Las lluvias continuaron eludiendo las Altas Llanuras centrales y meridionales, dejando los pastizales, las dehesas y el trigo de invierno con una necesidad desesperada de humedad. Más al este, sin embargo, los chubascos y las tormentas eléctricas continuaron aliviando la sequía en las Llanuras orientales, extendiéndose hacia el Medio Sur y el Delta del Misisipi. Algunas de las lluvias más intensas, acompañadas de tormentas eléctricas localmente severas, cayeron desde el este de Kansas hasta el Bajo Medio Oeste. El resto del Medio Oeste también recibió cierta precipitación, aunque algunas de las zonas más húmedas de la región —en los estados de los Grandes Lagos— tuvieron un respiro de las lluvias excesivas que habían provocado focos de inundaciones récord a principios de mes. En contraste, gran parte de Nueva Inglaterra y las zonas septentrionales de Nueva York se mantuvieron frescas y secas. En otras partes, predominó un clima inestable y lluvioso en el Oeste —principalmente al norte de una línea que va desde el centro de California hasta las Rocosas centrales—, lo que aumentó la humedad del suelo superficial, trajo nieve a las zonas de gran altitud y redujo la demanda de riego. No obstante, ninguna de estas precipitaciones modificó sustancialmente el panorama, mayormente sombrío, del suministro de agua en el Oeste para lo que resta de la primavera y de cara al verano de 2026.

Noreste

Ante la presencia de un patrón climático fresco y mayormente seco, muchas zonas experimentaron un estancamiento de las condiciones o un deterioro gradual de las mismas. Cabe destacar que la sequedad anormal (D0) y la sequía moderada (D1) se extendieron por el sur de Nueva Inglaterra y las áreas adyacentes. Una excepción a este deterioro se observó en algunas partes del norte y el este de Maine, donde la mejora de los niveles de agua subterránea propició un cambio de la categoría D1 a la D0.

Sureste

En las últimas semanas, el sureste se ha convertido en el «epicentro» de una de las peores sequías del país. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la humedad de la capa superficial del suelo en las regiones agrícolas de Georgia y Carolina del Sur fue calificada, a nivel estatal, como «muy escasa» a «escasa» en un 97% el 26 de abril. En esa misma fecha, la humedad de la capa superficial del suelo se situaba entre «muy escasa» y «escasa» en un 88% en Virginia, y en un 81% en Carolina del Norte. Los incendios forestales continuaron activos en diversas zonas del sureste; los dos de mayor magnitud han arrasado, de forma conjunta, más de 50.000 acres de vegetación en el sur de Georgia. Cabe destacar que el devastador incendio de la autopista 82, en el condado de Brantley (Georgia), no solo ha calcinado más de 22.000 acres, sino que también ha destruido más de 100 viviendas. Esta semana se observó nuevamente un deterioro generalizado de la sequía en el sureste, lo que incluyó una mayor expansión de todas las categorías, abarcando desde la sequía «extrema» hasta la «excepcional» (niveles D3 a D4).

Sur

Hacia el final del periodo de monitoreo de la sequía, se registraron lluvias significativas en diversas zonas del Sur, lo que propició una reducción generalizada en la intensidad de la sequía. Algunas de las precipitaciones más intensas cayeron desde las regiones orientales de Oklahoma y Texas hasta partes de Arkansas, Misisipi y el norte de Luisiana. No obstante, será necesaria más lluvia para asegurar una recuperación total de la sequía, dado que muchas de las áreas más afectadas habían caído, en las últimas semanas, en categorías de sequía extrema a excepcional (D3 a D4). Mientras tanto, las zonas occidentales del Sur —incluyendo el oeste de Oklahoma y el oeste de Texas— permanecieron críticamente secas, lo que derivó en condiciones deficientes para los pastizales, las dehesas y el trigo de invierno, así como en una amenaza de incendios forestales crónicamente elevada. A nivel estatal, el 26 de abril se calificó el estado del trigo de invierno en Texas como "muy malo" a "malo" en un 56%, cifra que alcanzó el 45% en Oklahoma.

Medio Oeste

Las fuertes precipitaciones en las zonas occidental y meridional de la región propiciaron nuevas reducciones en la extensión de la sequía. De hecho, algunas partes de los estados de la región de los Grandes Lagos han registrado un exceso considerable de humedad en las últimas semanas; el 26 de abril, el Departamento de Agricultura de los EE. UU. calificó el nivel de humedad del suelo superficial en las zonas agrícolas de Wisconsin como un 48 % por encima de lo normal, cifra que alcanzó el 42 % en Michigan. El promedio de los últimos cinco años para el ritmo de siembra de remolacha azucarera en Michigan, a fecha del 26 de abril, se sitúa en el 51 %; sin embargo, debido al exceso de humedad registrado este año, para esa misma fecha solo se había sembrado el 3 % del cultivo.

Altas Llanuras

Las precipitaciones brindaron cierto alivio ante la sequía en algunas zonas, incluidas partes del sur de Dakota del Sur y sectores orientales de Nebraska y Kansas. No obstante, para el 26 de abril, la humedad de la capa superficial del suelo —según informó el Departamento de Agricultura de los EE. UU.— fue calificada como "muy escasa" a "escasa" en al menos un 40% en todos los estados de la región, a excepción de Dakota del Norte, encabezando la lista el estado de Colorado (con un 95%). El trigo de invierno continuó viéndose afectado debido a la sequía y a las recientes heladas; el 26 de abril, el 65% de la cosecha de Nebraska fue calificada en condiciones de "muy malas" a "malas", situación que se replicó en el 54% de la cosecha de Colorado y en el 41% de la de Kansas. La sequía continuó empeorando, en términos generales, en el este de Colorado y en los sectores occidentales de Kansas y Nebraska.

Oeste

Cualquier cambio en el Oeste fue, en su mayor parte, menor y de carácter mixto, dado que predominó un clima más fresco y se produjeron precipitaciones dispersas. En la mayoría de las zonas, las precipitaciones en el Oeste no modificaron las sombrías perspectivas de suministro de agua, puesto que gran parte de la capa de nieve de las montañas ya se ha derretido, a excepción de la zona norte de las Montañas Rocosas. Ya a finales de abril, el temor a una crisis en la generación de energía hidroeléctrica en la cuenca del río Colorado llevó al Departamento del Interior a comenzar a enviar agua desde el embalse de Flaming Gorge, aguas abajo, hacia el lago Powell, con el fin de ayudar a elevar los niveles de agua. El Departamento del Interior también indicó que el agua destinada habitualmente al lago Mead —situado más aguas abajo— sería retenida en el lago Powell. A pesar de la falta general de impacto en los suministros del Oeste, cualquier precipitación fue recibida con gran agrado, debido a sus efectos positivos, tales como el aumento de la humedad en la capa superficial del suelo y la reducción de la demanda de riego. De hecho, recientemente ha caído suficiente precipitación como para justificar una leve reducción en la intensidad de la sequía en algunas zonas, incluidas partes del oeste de Colorado, el noreste de Oregón y el sureste de Washington.

Caribe

En Puerto Rico, no se observó ni sequedad ni sequía en ningún lugar del Estado Libre Asociado por sexta semana consecutiva.

Cada una de las islas se mantiene libre de sequía y aridez esta semana. Las estaciones de CoCoRaHS en toda la isla de St. Croix registraron entre 0.11 y 1.02 pulgadas esta semana. La isla de St. John registró entre 0.37 y 0.66 pulgadas de lluvia esta semana. La estación de Windswept Beach registró 0.63 pulgadas de lluvia esta semana. La isla de St. Thomas recibió 0.41 pulgadas de lluvia esta semana, según los registros de las estaciones de CoCoRaHS. El pozo Adventure 28 registró una profundidad del agua de 20.54 pies a fecha de esta semana. Esto supone un descenso de 0.04 pies en comparación con la semana pasada y de 3.36 pies en comparación con el año anterior. El pozo Susannaberg DPW 3 registró una profundidad del agua de 13.2 pies a fecha de esta semana. Esto representa un descenso de 0.11 pies en comparación con la semana pasada y de 3.43 pies en comparación con el año anterior. El pozo Grade School 3 presenta una profundidad del agua de 5.92 pies a fecha de esta semana. Esto es 2.48 pies menos que la semana pasada y 1.07 pies menos en comparación con el año anterior.

Pacífico

En Alaska, dos áreas de sequedad anormal (D0) permanecieron intactas. Sin embargo, el borde noroeste del área D0 meridional de Alaska se redujo ligeramente en medio de precipitaciones generalizadas.

En Hawái, se produjo una reducción adicional en la cobertura de sequedad anómala (D0) y sequía moderada (D1) en la Isla Grande, a medida que los impactos relacionados con la sequía continuaban remitiendo tras un periodo de tormentas extremas durante marzo y

principios de abril.

Las lluvias fueron abundantes en toda la República de las Islas Marshall (RMI). Las islas de Jaluit, Mili y Utirik recibieron precipitaciones adecuadas, registrando 3,76, 5,05 y 2,28 pulgadas de lluvia esta semana. Otros lugares, como Ailingalapalap, Kwajalein, Majuro y Wotje, recibieron 1,34, 1,28, 1,71 y 1,6 pulgadas, respectivamente. No obstante, cada isla permanece libre de sequía y aridez.

La sequedad anormal se ha extendido a varias islas de los Estados Federados de Micronesia (EFM). Ulithi y Yap experimentarán una degradación de una categoría, pasando a la condición de sequedad anormal. Una combinación de precipitaciones insuficientes y la presencia de pastizales secos contribuyó a esta degradación. Tanto Ulithi como Yap recibieron 1,13 y 1,5 pulgadas de lluvia esta semana, respectivamente. Woleai permanece libre de sequía y sequedad; no obstante, dado que recibió tan solo 0,61 pulgadas de lluvia, esta isla podría sufrir una degradación de una categoría si las precipitaciones insuficientes persisten la próxima semana. Lukunor se mantiene en estado de sequedad anormal, habiendo recibido únicamente 0,09 pulgadas de lluvia esta semana. Otras islas de los EFM recibieron lluvias abundantes. Kapingamarangi, Kosrae y Nukuoro registraron 3,71; 7,8 y 2,85 pulgadas de lluvia esta semana. La laguna de Chuuk recibió 1,24 pulgadas de lluvia esta semana, pero se mantendrá libre de sequía y sequedad durante este periodo.

La República de Palaos experimentará una degradación de una categoría, pasando a una condición de sequedad anormal. Los totales mensuales de precipitación en toda la isla se sitúan en los niveles más bajos registrados para el mes de abril. Koror ha recibido 0,36 pulgadas de lluvia esta semana y acumula 1,73 pulgadas en lo que va del mes. Asimismo, la Oficina de Servicios Meteorológicos (WSO) en Palaos recibió 0,3 pulgadas de lluvia esta semana y registra un total de 1,15 pulgadas para el mes.

Las Islas Marianas continúan experimentando los efectos del tifón que pasó a mediados de mes. Debido a esto, los registros de precipitación están ausentes o son bajos, y podrían presentar problemas de exposición. En consecuencia, cada una de las islas mantendrá las categorías de la semana anterior y permanecerá libre de sequía y condiciones de aridez. La Samoa Americana experimentó una semana seca; Pago Pago recibió 0,77 pulgadas de lluvia. Además, Siufaga y Toa Ridge recibieron 0,97 y 0,43 pulgadas de lluvia esta semana, respectivamente. La Samoa Americana permanecerá libre de sequía y condiciones de aridez.

Mirando hacia el futuro

Durante los próximos días, la actividad meteorológica en el sur del país debería generar acumulaciones de lluvia de entre 1 y 4 pulgadas, abarcando desde gran parte de Texas hasta los estados del Atlántico sur. No obstante, algunas tormentas eléctricas en el sur podrían producir granizo de gran tamaño, vientos dañinos y tornados aislados. La humedad presentará un límite norte bien definido, esperándose escasa o nula precipitación durante los próximos cinco días en las llanuras del norte y centro, así como en el Medio Oeste. Un clima generalmente seco también prevalecerá en el oeste, a excepción de nevadas tardías en las zonas central y sur de las Montañas Rocosas. En otras regiones, se intensificará un patrón de temperaturas frescas en la franja central del país; se prevé la posibilidad de heladas y

temperaturas bajo cero hasta el fin de semana en la mitad noroeste de las llanuras, extendiéndose hacia el norte del Medio Oeste. Para la mañana del sábado, las heladas dispersas podrían extenderse hacia el sur, alcanzando el valle del río Ohio y la zona sur de las Altas Llanuras.

El pronóstico del NWS para el periodo de 6 a 10 días (del 5 al 9 de mayo) indica una probabilidad de condiciones más frescas de lo normal en la mayoría de las áreas al este de las Montañas Rocosas, mientras que el clima más cálido de lo normal se limitará a una zona que se extiende desde la costa del Pacífico hasta el norte de las Rocosas, abarcando la Gran Cuenca y el norte de la región Intermontana occidental. Por otra parte, las precipitaciones — cercanas a lo normal o por debajo de este nivel— que se esperan desde el Noroeste del Pacífico hasta el Alto Medio Oeste contrastarán con la probabilidad de condiciones más húmedas de lo normal en el resto de los 48 estados contiguos.

Autor(s)

Brad Rippey, U.S. Department of Agriculture

Daniel Whitesel, National Drought Mitigation Center