

Resumen nacional de sequía para 5 mayo, 2026

Resumen

Lluvias generalizadas y abundantes cayeron sobre Texas y el «Deep South» (el sur profundo), aportando una muy necesaria inyección de humedad a estas zonas azotadas por la sequía. Si bien estas precipitaciones fueron suficientes para aliviar las condiciones de sequía en algunas partes de Texas, el bajo valle del Misisipi y el valle del Tennessee, dichas condiciones permanecieron prácticamente inalteradas en el sureste de Alabama, Georgia y el noroeste de Florida, donde la humedad del suelo y los caudales de los arroyos se mantienen en niveles extremadamente bajos. También se registraron lluvias más ligeras en el Noreste, lo cual, sumado a temperaturas más frescas, ayudó a frenar el avance de la sequía y mejoró las condiciones en el estado de Maine. En aquellas zonas donde las acumulaciones fueron más escasas, se produjo una ligera expansión de la sequía y de la sequedad anormal en algunas partes de la región del Atlántico Medio, el valle del Hudson y el sureste de Nueva Inglaterra. Temperaturas más frescas y un clima mayormente seco se extendieron por las Grandes Llanuras y el Medio Oeste. Aunque las condiciones de sequía continuaron expandiéndose en las Grandes Llanuras, el clima más seco fue, en general, bien recibido en el alto Medio Oeste y en el «Cinturón del Maíz» (Corn Belt), permitiendo el avance de las labores agrícolas. Un clima caluroso y seco propició el deterioro de las condiciones en Arizona y el noroeste de Washington, mientras que la humedad registrada a finales de la temporada en el norte de California apenas logró modificar las escasas condiciones de la capa de nieve acumulada.

Noreste

Precipitaciones de ligeras a moderadas se extendieron por la región del Noreste durante la semana pasada. Las mayores acumulaciones se registraron en Maine, lo que propició algunas mejoras modestas en las condiciones de sequía y sequedad anormal. En otras zonas, las acumulaciones tendieron a ser mayores a lo largo de las montañas y hacia el oeste de estas, y más ligeras (menos de 0,5 pulgadas) en las áreas de sequía del Atlántico Medio y del sur de Nueva Inglaterra. Las temperaturas, inferiores al promedio, redujeron las tasas de evapotranspiración, lo cual ayudó a evitar una degradación más generalizada. Los índices de sequía en múltiples escalas temporales —incluido el SPI— confirmaron la expansión de la sequía en la península de Delmarva. La sequedad anormal se extendió por algunas zonas del valle del Hudson y del sureste de Massachusetts, mientras que la sequía se intensificó en el sureste de Nuevo Hampshire.

Sureste

Un patrón meteorológico activo trajo consigo lluvias intensas y tormentas eléctricas generalizadas al «Deep South» (el sur profundo), proporcionando un muy necesario aporte de humedad a las zonas afectadas por la sequía. Las acumulaciones totales durante el periodo de siete días superaron las dos pulgadas en gran parte de Misisipi y Alabama, el sur de Georgia y el oeste del Panhandle de Florida; en algunas localidades, dichas acumulaciones fueron significativamente mayores. Las precipitaciones aliviaron las condiciones de sequía en

algunas zonas de Misisipi y el norte de Alabama, si bien persiste una sequía generalizada de intensidad severa a excepcional. Aunque resultaron beneficiosas, las lluvias apenas lograron algo más que estabilizar las condiciones más hacia el este —en gran parte de Georgia y el norte de Florida—, donde la humedad del suelo y los caudales de los arroyos se mantienen en niveles muy bajos. En estas regiones no se produjo ningún cambio en la clasificación de la sequía, y sería necesaria una precipitación más sostenida para comenzar a mitigar dichas condiciones. En la península de Florida se registraron precipitaciones más ligeras, zona donde las condiciones de sequía se expandieron lentamente. Las condiciones de sequía se mantuvieron estables en Carolina del Sur; no obstante, el clima más seco en Carolina del Norte y Virginia provocó cierta expansión de la sequía y de la sequedad anormal.

Sur

Tras las beneficiosas lluvias de la semana pasada, precipitaciones adicionales se extendieron por gran parte de Texas y Luisiana durante los últimos días, propiciando nuevas reducciones de la sequía. Las lluvias en el centro y el oeste de Texas también aliviaron la sequía en la parte alta del Valle del Río Grande. A pesar de estas lluvias beneficiosas, persiste una sequía generalizada —de severa a excepcional— en toda la Región Sur; será necesaria una serie sostenida de eventos de precipitaciones intensas para comenzar a lograr un alivio generalizado de sus efectos. Las lluvias beneficiosas no alcanzaron el Panhandle de Texas ni el oeste de Oklahoma, donde las condiciones desfavorables continúan afectando los pastizales y el trigo de invierno. Asimismo, las condiciones de sequía se extendieron por todo Arkansas.

Medio Oeste

Tras un periodo de humedad persistente en toda la región, condiciones más secas se extendieron por el Medio Oeste durante los últimos siete días. Un frío inusual para la temporada redujo las tasas de evapotranspiración, y la pausa en las precipitaciones fue, en su mayor parte, bienvenida para las labores agrícolas que se habían visto retrasadas por los frecuentes sistemas de tormentas. Los efectos de la sequía y la sequedad anómala se atenuaron en el norte de Minnesota y a lo largo de la frontera sur entre Indiana e Illinois. Se observaron ligeros deterioros en el sureste de Misuri y justo a lo largo del río Ohio, en el centro-sur de Indiana, dado que estas regiones no recibieron parte de las precipitaciones anteriores.

Altas Llanuras

Precipitaciones de ligeras a moderadas se extendieron por gran parte de las Altas Llanuras, registrándose las acumulaciones más intensas (de 0,5 a 1,5 pulgadas) en el centro de Colorado, lo que incluyó nevadas tardías en las zonas de mayor altitud. Estas precipitaciones propiciaron una cierta mitigación de la sequía en el centro de Colorado. Sin embargo, en el resto de las Llanuras, la humedad no resultó suficiente para generar mejoras sustanciales. A pesar de que las temperaturas más frescas redujeron las tasas de evapotranspiración, se

produjo cierto deterioro en Kansas, Nebraska y el extremo occidental de Dakota del Norte.

Oeste

A excepción del norte de California —donde las precipitaciones de finales de temporada impulsaron temporalmente los caudales fluviales y la humedad del suelo, aunque apenas modificaron la inusualmente escasa cobertura de nieve en el norte de la Sierra Nevada—, un clima seco, habitual para la época, se extendió por la mayor parte del Oeste. Las recientes precipitaciones aliviaron las condiciones de sequía en el extremo occidental de Montana. Si bien la situación general de la sequía en el Oeste experimentó pocos cambios, las condiciones de calor y sequedad agravaron sus efectos en Arizona, provocando una degradación sustancial en algunas zonas. Asimismo, la sequedad a corto plazo se intensificó en el noroeste de Washington, lo que derivó en la expansión de la categoría D0.

Caribe

Actualmente no se registra sequía ni sequedad anormal en Puerto Rico. Algunas zonas de la isla han experimentado condiciones más secas en las últimas semanas, por lo que deberán ser monitoreadas hasta los primeros meses del verano.

Esta semana, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos registraron poca o ninguna precipitación. En St. Croix se registraron entre 0.13 pulgadas y cantidades mínimas. De manera similar, en St. John se registraron 0.3 pulgadas y en St. Thomas solo se registraron cantidades mínimas de lluvia. El pozo Adventure 28 (St. Croix) registró una profundidad de agua de 20.72 pies esta semana. Esto es 0.2 pies menos que la semana pasada y 3.56 pies menos que el año pasado. El pozo Susannaberg DPW 3 (St. John) registró una profundidad de agua de 13.44 pies esta semana. Esto es 0.2 pies menos que la semana pasada y 3.63 pies menos que el año pasado. El pozo Grade School 3 (St. Thomas) tiene una profundidad de agua de 7.64 pies esta semana. Esto es 1.7 pies menos que la semana pasada y 2.77 pies menos que el año pasado. A pesar de las escasas o nulas precipitaciones, los valores del SPI a corto plazo muestran en su mayoría condiciones neutras, lo que deja a todas las islas libres de sequía o sequedad anormal.

Pacífico

Tras las precipitaciones superiores a lo normal registradas en gran parte del estado durante el mes de abril, la extensión de la sequedad anormal se redujo en gran parte de Alaska. Persiste cierta sequedad de categoría D0 en la península de Kenai y en las inmediaciones de Anchorage, donde los efectos orográficos redujeron la cantidad de precipitación caída.

Las condiciones en la Isla Grande de Hawái continúan mejorando, y la vegetación se ha reverdecido en las últimas semanas. Con base en esta evaluación, se eliminó la pequeña área restante de sequía moderada.

Las lluvias fueron variadas en la República de las Islas Marshall. Las islas de Jaluit y Majuro recibieron precipitaciones adecuadas, con 4,32 y 2,06 pulgadas de lluvia esta semana,

respectivamente. Kwajalein y Ailingalapalap registraron 1,82 y 1,98 pulgadas, respectivamente, mientras que Utirik, Wotje y Mili recibieron menos de media pulgada de lluvia esta semana (0,31", 0,3" y 0,1"). A pesar de que algunas islas recibieron poca precipitación, las lluvias adecuadas durante las semanas previas evitaron que todas las islas sufrieran sequía o sequedad anormal.

Los Estados Federados de Micronesia recibieron fuertes precipitaciones en la mayoría de las islas, algunas de las cuales registraron más de 4 pulgadas de lluvia. Estas fuertes precipitaciones hicieron que las condiciones anormalmente secas de Lukunor mejoraran hasta dejar de estarlo. Ulithi recibió 0,78 pulgadas de lluvia esta semana y continúa en condiciones anormalmente secas. Yap, a pesar de haber recibido 4,39 pulgadas de lluvia, continúa en condiciones anormalmente secas debido a las escasas precipitaciones de las semanas anteriores. Woleai (1,42"), Chuuk Lagoon (5,7"), Nukuoro (5,28"), Kapingamarangi (2,56"), Pohnpei (5,4") y Kosrae (5,51") permanecen libres de condiciones anormalmente secas.

La República de Palaos continúa con una sequía anormal, registrándose en Koror 1,4 pulgadas de lluvia esta semana tras un mes de abril seco.

Las Islas Marianas registraron precipitaciones de ligeras a moderadas esta semana. Guam experimentó precipitaciones de buenas a abundantes, con Dededo registrando 0,31 pulgadas, Agat 1,62 pulgadas y el aeropuerto 1,40 pulgadas de lluvia esta semana. Saipán y Rota recibieron 0,51 y 0,32 pulgadas respectivamente. Si bien las dos semanas anteriores registraron escasas precipitaciones, las precipitaciones muy superiores a lo normal provocadas por el tifón han mitigado parte de esta sequía, aunque Rota aún presenta datos faltantes para varias semanas. Los datos de Tinian están ausentes.

Samoa Americana experimentó una semana lluviosa, con Pago Pago registrando 3,45 pulgadas de lluvia. Además, Siufaga y Toa Ridge recibieron 2,64 y 2,62 pulgadas de lluvia esta semana, respectivamente. Samoa Americana se mantendrá libre de sequía.

Mirando hacia el futuro

Durante los próximos 7 días, se prevé que persista un patrón meteorológico activo en todo el sureste, con la posibilidad de lluvias intensas (de 2 a 7 pulgadas) a lo largo de una franja que se extiende desde el este de Texas hasta el sur de Alabama. Estas lluvias seguirían brindando alivio ante la sequía, pero también representarían una amenaza de condiciones meteorológicas severas. Se pronostican acumulaciones menores en Georgia y Florida, lo cual podría limitar el alcance de cualquier mejora. También se prevén precipitaciones generalizadas a lo largo del valle del Ohio y en la costa este, con el mayor potencial de alivio concentrado en el noreste. Unas condiciones algo más secas en la región del Atlántico Medio podrían limitar las posibilidades de mejora frente a la sequía. Las ligeras acumulaciones pronosticadas en las Llanuras podrían contribuir escasamente a mitigar las condiciones de sequía, mientras que en el oeste se prevé otra semana de sequedad habitual para la temporada. Las temperaturas superiores al promedio en el oeste favorecen una aceleración del deshielo, lo cual podría generar un aumento a corto plazo en los niveles de los embalses, pero dejaría las reservas de agua aún más mermadas a medida que se aproxima el verano. Se prevén temperaturas inferiores al promedio en la mitad oriental de los Estados Unidos continentales.

Durante el periodo de 8 a 14 días, se prevén temperaturas superiores al promedio en gran parte de los 48 estados contiguos, mientras que para el Noreste se pronostican temperaturas cercanas a la normalidad. Se pronostican precipitaciones superiores al promedio en la franja sur, con las probabilidades más altas concentradas en Texas, el este de Nuevo México y Luisiana. Una ligera tendencia hacia precipitaciones superiores a lo normal se extiende a través de la región de los Grandes Lagos hasta el Noreste, en tanto que se favorecen precipitaciones inferiores al promedio en el norte de las Montañas Rocosas.

Autor(s)

Adam Allgood, NOAA/NWS/NCEP/CPC

Lindsay Johnson, National Drought Mitigation Center