

Resumen nacional de sequía para 12 mayo, 2026

Resumen

Esta semana se caracterizó por una marcada disparidad en las precipitaciones, destacada por un gran diluvio en algunas zonas del sur y de la Costa del Golfo. Persistentes sistemas tormentosos canalizaron grandes cantidades de humedad hacia Luisiana, Misisipi y Alabama, donde el total de lluvias alcanzó entre 4 y 6 pulgadas —y en algunos puntos costeros, incluso cifras superiores—, lo que representa un exceso de 3 a 5 pulgadas por encima de las normas estacionales. Mientras que un activo corredor frontal trajo una banda secundaria de lluvias moderadas (de 1 a 3 pulgadas) desde Texas, pasando por el Valle del Ohio y llegando hasta el Noreste, el oeste de los Estados Unidos se mantuvo excepcionalmente seco; la mayoría de las áreas al oeste de las Montañas Rocosas recibieron menos de 0,1 pulgadas de lluvia. Esta falta de humedad, sumada a vientos racheados, provocó un peligro extremo de incendios en el Alto Valle del Misuri, aunque el periodo concluyó con un cambio en el patrón meteorológico, cuando un importante sistema de baja presión proveniente del Pacífico finalmente ingresó en tierra firme, aportando humedad al Noroeste.

Los patrones de temperatura mostraron una división geográfica igualmente marcada: un calor inusitado se apoderó del Oeste y de partes del Sur, mientras que un frío propio de finales de primavera persistía en el Norte. En el Suroeste y en el sur de Texas, un calor de tintes veraniegos se instaló con firmeza; así, Rio Grande Village (Texas) registró una máxima nacional de 105 °F, y el Valle de la Muerte alcanzó consistentemente las tres cifras. En términos generales, el oeste de los Estados Unidos registró temperaturas promedio de 5 a 15 °F por encima de lo normal. Por el contrario, un descenso significativo de las temperaturas se estableció sobre las Llanuras del Norte y el Alto Medio Oeste, donde las Dakotas y Minnesota experimentaron valores de 5 a 15 °F por debajo de los promedios estacionales. Este contraste térmico se acentuó aún más debido a las condiciones invernales en las regiones de gran altitud del Oeste, donde diversas estaciones en Utah registraron mínimas de hasta 10 °F, incluso mientras un calor cercano a romper récords comenzaba a extenderse por el Noroeste del Pacífico y los estados de la frontera sur.

Los patrones de temperatura mostraron una división geográfica igualmente marcada: un calor inusitado se apoderó del Oeste y de partes del Sur, mientras que un frío propio de finales de primavera persistía en el Norte. En el Suroeste y en el sur de Texas, un calor de tintes veraniegos se instaló con firmeza; así, Rio Grande Village (Texas) registró una máxima nacional de 105 °F, y el Valle de la Muerte alcanzó consistentemente las tres cifras. En términos generales, el oeste de los Estados Unidos registró temperaturas promedio de 5 a 15 °F por encima de lo normal. Por el contrario, un descenso significativo de las temperaturas se estableció sobre las Llanuras del Norte y el Alto Medio Oeste, donde las Dakotas y Minnesota experimentaron valores de 5 a 15 °F por debajo de los promedios estacionales. Este contraste térmico se acentuó aún más debido a las condiciones invernales en las regiones de gran altitud del Oeste, donde diversas estaciones en Utah registraron mínimas de hasta 10 °F, incluso mientras un calor cercano a romper récords comenzaba a extenderse por el Noroeste del Pacífico y los estados de la frontera sur.

Noreste

La región del Noreste experimentó un marcado enfriamiento a finales de la primavera, acompañado de una aguda división geográfica en cuanto a las precipitaciones. Las temperaturas promedio oscilaron entre los 39 °F y 48 °F en las zonas septentrionales de la región, y entre los 60 °F y 66 °F en partes de Maryland y Delaware. Las temperaturas se situaron por debajo de lo normal en casi toda la región, concentrándose las anomalías frías más significativas en Nueva York y Pensilvania; en estas áreas, las desviaciones alcanzaron entre 6 °F y más de 10 °F por debajo del promedio. Los patrones de precipitación resultaron igualmente divergentes, registrándose un superávit en el norte y el oeste, pero un déficit en el sur. La mayor acumulación de humedad se concentró en el oeste de Nueva York, el noroeste de Pensilvania y gran parte de Maine, donde los volúmenes de precipitación oscilaron entre 0.45 y 1.8 pulgadas por encima de lo normal. En Maine, mejoraron las condiciones de sequía moderada (D1) a severa (D2), así como la sequedad anormal (D0). Por el contrario, los totales de lluvia se situaron por debajo de lo normal en las zonas meridionales de la región, con déficits de precipitación que, por lo general, oscilaron entre 0.45 y 1.35 pulgadas por debajo del promedio. Esta semana, la sequía severa (D2) se extendió por el norte de Massachusetts, Delaware y las zonas meridionales de Pensilvania, Nueva Jersey y Virginia Occidental, mientras que la sequía moderada (D1) se expandió por Massachusetts, Rhode Island, Connecticut y el sur de Pensilvania.

Sureste

Gran parte del sureste experimentó temperaturas por debajo de lo normal esta semana, con valores entre 5 °F y 10 °F inferiores a la media. Florida, Georgia y partes de Alabama y Carolina del Sur constituyeron la excepción, con temperaturas promedio en el rango de los 80 °F —hasta 10 grados por encima de lo normal—. Se registraron totales de precipitación excepcionales (de 1.5 a 3.0 pulgadas) en gran parte de Alabama, así como en zonas de Georgia y del Panhandle de Florida. Las acumulaciones localizadas en estas áreas alcanzaron entre 4 y más de 7 pulgadas, lo que representa desviaciones significativas de 3 a 6 pulgadas por encima de lo normal. Los totales semanales de lluvia, de 1.5 a 3.0 pulgadas, se extendieron desde la región sur de los Apalaches hasta el centro-sur de Carolina del Norte. La sequía excepcional (D4) dejó de afectar al centro-sur de Carolina del Norte y al noreste de Georgia, y mejoró en el Panhandle de Florida. La sequía extrema (D3) mostró mejoría en partes del norte de Florida, Alabama, Georgia y las Carolinas. Los totales de lluvia se situaron por debajo de lo normal en las zonas septentrionales de Carolina del Norte y Virginia, así como en gran parte de la península de Florida, observándose déficits de 0.5 a 1.5 pulgadas. La sequía extrema (D3) se expandió hacia las zonas central y sur de Virginia, e incursionó ligeramente en un sector del norte de Carolina del Norte; asimismo, la

sequía —en rangos que van de moderada (D1) a extrema (D3)— se extendió por el sureste de Florida.

Sur

La región sur experimentó un marcado contraste tanto en precipitaciones como en temperaturas durante la semana, caracterizado por lluvias torrenciales en la Costa del Golfo y un notable descenso térmico, inusual para finales de la primavera, en el interior de la región. Las precipitaciones fueron más intensas en la zona central de la Costa del Golfo, particularmente en Luisiana y el sur de Misisipi, donde los acumulados semanales alcanzaron entre 7 y más de 9 pulgadas. Estos valores representan desviaciones excepcionales de entre 6 y 7.5 pulgadas por encima de lo normal. La sequía, en niveles de moderada (D1) a excepcional (D4), disminuyó en las zonas sur y este de Texas, así como en partes de Luisiana, Misisipi y el sur de Tennessee. Las condiciones de sequedad anormal (D0) mejoraron en algunas zonas de Texas y del sur de Luisiana. Por el contrario, prevalecieron condiciones más secas en el oeste de Texas, Oklahoma y gran parte del Valle de Tennessee, donde las precipitaciones se situaron, por lo general, entre 1.5 y 3 pulgadas por debajo del promedio. Se declaró sequía excepcional (D4) en el suroeste de Oklahoma y en la franja que se extiende desde el Panhandle de Texas hasta el noroeste de Oklahoma; asimismo, esta categoría se expandió en partes de Arkansas y del norte de Misisipi. La sequía extrema (D3) se extendió por las zonas septentrionales de Texas y el oeste de Oklahoma. El calor persistió en el sur de Texas, donde las temperaturas promedio alcanzaron rangos de entre 80 y 90 grados Fahrenheit, lo que representa desviaciones de hasta 5 °F por encima de lo normal. No obstante, una potente anomalía fría afectó a las zonas norte, este y central de la región. En estas áreas, las temperaturas se situaron, de manera generalizada, entre 5 y 10 °F por debajo de lo normal durante la semana.

Medio Oeste

La región del Medio Oeste experimentó un enfriamiento generalizado a finales de la primavera y un marcado contraste en los niveles de humedad entre el norte y el sur. Las temperaturas se situaron, en términos generales, por debajo del promedio en toda la región; la gran mayoría del Medio Oeste registró desviaciones de entre 5 y 10 °F por debajo de lo normal. Las temperaturas promedio oscilaron entre unos frescos 30-40 °F a lo largo de la frontera norte de Minnesota y Wisconsin, y unos más acordes a la estación 60-70 °F en los confines meridionales de Missouri y Kentucky. Las precipitaciones fueron notablemente escasas en la mitad norte de la región —incluyendo Minnesota, Wisconsin, Iowa y Michigan—, donde los acumulados se mantuvieron por debajo de las 0,1 pulgadas, lo que resultó en desviaciones de entre 0,5 y 1,5 pulgadas por debajo de lo normal. Por el contrario, la franja meridional —particularmente en zonas de Kentucky, el sur de Missouri y el valle del Ohio—

experimentó una actividad meteorológica más intensa, con acumulados de precipitación que oscilaron entre 1,5 y más de 3 pulgadas; esto generó superávits de entre 0,5 y 1,5 pulgadas y propició una reducción de la sequía severa (D2) y extrema (D3) en las zonas occidentales de Kentucky. No obstante, la sequía de moderada (D1) a extrema (D3) se extendió en algunas zonas del centro y el este de Kentucky, donde los registros de lluvia se situaron por debajo de lo normal. Asimismo, se amplió la zona afectada por una sequedad anormal (D0) en partes de Minnesota, el oeste de Iowa, el sur de Missouri y en focos aislados de Indiana y Ohio.

Altas Llanuras

Una calidez anómala predominó en la mayor parte de las Altas Llanuras esta semana, mientras que la precipitación se caracterizó por un marcado gradiente de este a oeste. Las zonas orientales de la región permanecieron bajo un persistente frío de finales de primavera, con temperaturas promedio que cayeron entre 4 °F y 10 °F por debajo de las normas estacionales. Esta área también resultó excepcionalmente seca, recibiendo menos de 0.05 pulgadas de lluvia, lo que generó déficits de precipitación de entre 0.6 y 1.2 pulgadas. La persistente sequedad provocó la expansión de la sequía excepcional (D4) en Nebraska, al tiempo que la sequía de moderada (D1) a extrema (D3) se extendió por el noreste de Wyoming, Dakota del Sur, Nebraska y Kansas. Por el contrario, las Altas Llanuras occidentales —abarcando Wyoming, gran parte de Colorado y las zonas occidentales de Dakota del Sur y Nebraska— experimentaron una calidez inusual para la época, con desviaciones que oscilaron entre 2 °F y 6 °F por encima de lo normal. Esta calidez estuvo acompañada por un activo corredor de humedad a través del sur de las Altas Llanuras; mientras que las zonas septentrionales y orientales permanecieron secas, algunas partes de Colorado y áreas adyacentes de Wyoming y Kansas registraron entre 0.7 y 1.6 pulgadas de precipitación, lo que representó un exceso de entre 0.3 y 0.9 pulgadas por encima de lo normal. Esta precipitación superior a la media propició la eliminación de la sequía excepcional (D4) y la reducción de la sequía extrema (D3) en Wyoming, así como mejoras en las condiciones de sequía —de severa (D2) a excepcional (D4)— en Colorado, y de severa (D2) a extrema (D3) en el oeste de Kansas.

Oeste

El Oeste se caracterizó por un calor inusualmente temprano y una sequedad generalizada a lo largo de la costa del Pacífico y la Gran Cuenca, en contraste con condiciones más frescas y activas en las Montañas Rocosas durante esta semana. La parte oriental de la región —específicamente las zonas orientales de Montana, Utah y Nuevo México— se mantuvo notablemente más fresca, con desviaciones que oscilaron entre 3 °F y 6 °F por debajo de lo normal. Sin embargo, la mayor parte de la región —particularmente en zonas de Oregón, California y Nevada— experimentó desviaciones

térmicas significativas, de entre 6 °F y más de 12 °F por encima de lo normal; de hecho, las lecturas promedio reales en el suroeste desértico alcanzaron rangos de entre 80 y 90 grados Fahrenheit. Este calor estuvo acompañado de una humedad mínima, ya que los estados costeros y los de las cuencas interiores registraron menos de 0.1 pulgadas de lluvia, lo que resultó en déficits de precipitación de entre 0.6 y 1.5 pulgadas por debajo de los promedios estacionales. La sequía excepcional (D4) se extendió en el sur de Idaho, mientras que la sequía extrema (D3) se introdujo en Oregón y se expandió en Montana, Idaho y Nevada durante esta semana. Las sequías severa (D2) y moderada (D1) se ampliaron en Oregón, Idaho y Montana. La sequía severa (D2) también se introdujo en el norte de Washington y se expandió en el norte de Nevada. Las condiciones se deterioraron en partes del suroeste de Washington y el noroeste de Oregón, lo que resultó en la expansión de la sequedad anormal (D0) en estas áreas. Por el contrario, la humedad localizada propició mejoras en las condiciones de sequía —desde moderada (D1) hasta severa (D2)— y en la sequedad anormal (D0) en el sur de Arizona, mientras que se registraron mejoras en la sequía moderada (D1) en partes del oeste de Nevada.

Caribe

Las condiciones fueron secas en Puerto Rico durante esta semana. Los niveles de precipitación inferiores a lo normal —junto con la vegetación estresada, la baja humedad del suelo y el agotamiento de los niveles de aguas subterráneas y de los lagos— dieron lugar a la aparición de una sequedad anormal en las zonas del sur de la isla.

La situación de precipitaciones en las Islas Vírgenes de los EE. UU. entre el 6 y el 12 de mayo de 2026 se caracterizó por un patrón meteorológico seco y estable, con un total de lluvias significativamente por debajo de los promedios estacionales. Si bien se produjeron chubascos aislados, estos fueron principalmente el resultado de humedad superficial que se desplazaba rápidamente impulsada por los vientos alisios.

Esta semana, St. Croix experimentó lluvias ligeras, con totales reportados en orden descendente. VI-SC-20 (Frederiksted 1.7 ESE) recibió la mayor cantidad, con 0.78 pulgadas, seguido por VI-SC-30 (Christiansted 1.7 SW) con 0.34 pulgadas, y VI-SC-35 (Frederiksted 1.3 ENE), que registró 0.19 pulgadas. VI-SC-10 (Christiansted 1.6 E) registró 0.16 pulgadas, mientras que VI-SC-23 (Christiansted 6.5 W) recibió 0.08 pulgadas. Finalmente, VI-SC-34 (Frederiksted 1.9 NE) reportó la cantidad más baja, con 0.07 pulgadas. Estas mediciones reflejan las lluvias ligeras experimentadas en toda la isla. El valor del Índice Estandarizado de Precipitación (SPI) para East Hill durante el último mes fue de -0.85, lo que indica condiciones anormalmente secas a corto plazo. De manera similar, los valores del SPI para Christiansted Hamilton a 1, 3 y 6 meses fueron de -0.72, -0.82 y -2.67, respectivamente, lo que indica condiciones de sequía en las zonas occidentales de St. Croix. Al 12 de mayo de 2026, el nivel del agua en el pozo Adventure 28 en St. Croix, USVI, se situaba en 21.01 pies, lo que representa un

aumento con respecto a la semana anterior. Este nivel es también superior al registrado en la misma fecha del año pasado (14 de mayo de 2025), cuando se encontraba en 14.85 pies, lo que indica además que St. Croix está experimentando condiciones anormalmente secas.

El Aeropuerto Cyril E. King, en St. Thomas, registró 0.06 pulgadas de precipitación esta semana. Al 7 de mayo de 2026, el Índice de Precipitación Estandarizado (SPI) a un mes en el aeropuerto se situaba en -0.95, lo que indica condiciones más secas de lo normal. Además, el total de precipitación para la estación VI-ST-15 (Charlotte Amalie West, 1.3 N) fue de 0.15 pulgadas. La profundidad del nivel freático por debajo de la superficie del terreno en el pozo Grade School 3, en St. Thomas, ha seguido aumentando desde el 20 de abril de 2026. El 12 de mayo de 2026, se midió una profundidad de 8.32 pies, lo cual contribuye a que la isla se encuentre en una condición anormalmente seca.

Del mismo modo, St. John registró escasas precipitaciones esta semana, con tan solo 0.29 pulgadas en VI-SJ-3 (Windswept Beach) y apenas 0.23 pulgadas en VI-SJ-5 (Cruz Bay 1.6 E). Además, el 12 de mayo se midió el nivel del agua en el pozo Susannaberg DPW 3 (St. John, USVI), situándose a 13.84 pies por debajo de la superficie del terreno. Esto representa un aumento significativo con respecto al año anterior, cuando el nivel del agua se encontraba a 8.92 pies por debajo de la superficie terrestre en esa misma fecha de 2025. Estos datos indican que St. John experimenta actualmente condiciones de sequedad anormal.

Pacífico

Las temperaturas se situaron, en términos generales, por debajo de lo normal en todo Alaska esta semana, mientras que en algunas zonas del interior centro-oriental y del Panhandle se registraron temperaturas superiores a lo normal. Las precipitaciones variaron en todo el estado durante esta semana; en las zonas del norte y del oeste, estas se situaron por debajo de lo normal. Por el contrario, las precipitaciones fueron superiores a lo normal en el centro y el centro-sur de Alaska, lo que propició una reducción de la sequedad anómala (D0) en dichas áreas.

No se realizaron cambios en Hawái esta semana.

Las precipitaciones en todas las Islas Marshall fueron de moderadas a intensas esta semana. Los atolones del sur, como Majuro, se beneficiaron de su proximidad a la vaguada casi ecuatorial, registrando 2,9 pulgadas esta semana. Los atolones del norte se mantuvieron secos, tal como es habitual en esta época del año; no obstante, Jaluit, Utirik y Wotje registraron 1,06, 0,61 y 0,34 pulgadas, respectivamente, logrando así mantenerse libres de sequía. Kwajalein y Ailinglapalap registraron precipitaciones intensas: 5,71 y 4,7 pulgadas esta semana, respectivamente. El entorno sinóptico actual se caracteriza por la presencia de vientos alisios del este-noreste y una

convergencia débil en los niveles bajos, lo que ha dado lugar a chubascos intensos y localizados en el sur; por ejemplo, Milli registró 3,12 pulgadas de lluvia.

Esta semana, los Estados Federados de Micronesia (EFM) experimentaron algunos de los totales de precipitación más altos de la región, impulsados por un flujo activo de tipo monzónico y una serie de perturbaciones tropicales que se desplazaban hacia el oeste. Los estados centrales y orientales —Chuuk, Pohnpei y Kosrae— reportaron lluvias significativas. Específicamente, Chuuk recibió 2,95 pulgadas; Kosrae registró 7,29 pulgadas; y Pohnpei tuvo 5,57 pulgadas de lluvia (con datos faltantes de dos días). Yap mejoró su situación, pasando de condiciones anormalmente secas a un estado libre de sequía, tras recibir 5,42 pulgadas de precipitación. Woleai reportó 5,96 pulgadas. Kapingamarangi, por otro lado, reportó 0,31 pulgadas (con datos faltantes de dos días); sin embargo, se mantiene libre de sequía gracias a las condiciones húmedas previas, habiendo registrado 2,46 pulgadas en un solo día la semana pasada (el 1 de mayo de 2026). En contraste, Ulithi recibió solo 1,95 pulgadas esta semana, permaneciendo en condiciones anormalmente secas. Lukunor y Nukuoro reportaron 0,59 y 0,62 pulgadas, respectivamente, con datos faltantes de dos días. No obstante, ambas islas se mantienen libres de sequía debido a las recientes condiciones húmedas.

La vaguada en superficie permaneció casi estacionaria cerca de las islas de Samoa Americana hasta el 8 de mayo, antes de desplazarse hacia el sur. Esta vaguada aportó la mayor parte de la humedad de la semana, antes de que el aire más seco de los vientos alisios regresara durante el fin de semana. Pago Pago reportó 0.79 pulgadas de lluvia, aunque faltan datos correspondientes a dos días. Mientras tanto, Siufaga Ridge y Toa Ridge registraron 2.31 y 0.61 pulgadas de lluvia esta semana, respectivamente, manteniendo a las islas libres de sequía.

Esta semana, el área de Koror experimentó precipitaciones significativas, sumando un total de 4,55 pulgadas. La semana comenzó con condiciones mayormente secas a medida que Palaos transitaba hacia condiciones neutras del ENSO, situación que se mantuvo hasta el 11 de mayo. Sin embargo, el 12 de mayo se produjo un evento de lluvias intensas y localizadas, con una caída de 2,76 pulgadas en Koror. Este evento estuvo influenciado por un pulso hacia el sur de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y por el desplazamiento de humedad tropical. Además, la estación WSO Palau Airai reportó 2,4 pulgadas de lluvia durante la semana. En abril, Koror recibió tan solo 2,53 pulgadas de lluvia, cifra muy por debajo del promedio normal de 9,1 pulgadas, lo que marcó el total más bajo en 75 años de registros de datos. Aunque hacia el final de esta semana se ha producido un repunte en las lluvias intensas, las condiciones atmosféricas generales siguen influenciadas por la supresión de la Oscilación de Madden-Julian (MJO) sobre el Pacífico Occidental. Esta supresión está dando lugar a un patrón anormalmente seco, mientras las islas se preparan para un posible cambio hacia condiciones de El Niño en los próximos meses.

Esta semana, las Islas Marianas han registrado precipitaciones influenciadas principalmente por vientos alisios moderados del este y débiles vaguadas en superficie, lo que marca los efectos iniciales de un fenómeno de El Niño en desarrollo. Rota

registró 1,3 pulgadas de lluvia esta semana, manteniéndose así libre de sequía. Por su parte, Guam y Saipán reportaron 0,82 y 0,55 pulgadas, respectivamente, lo que mantuvo a ambas islas libres de sequía durante esta semana.

Mirando hacia el futuro

Durante los próximos cinco días (del 12 al 16 de mayo de 2026), los patrones meteorológicos en todo Estados Unidos presentarán un marcado contraste entre un calor que desafiará los récords en el Oeste y condiciones inestables y más frescas en el Este. Una dorsal atmosférica en formación mantendrá temperaturas muy por encima de lo normal en el oeste de EE. UU., y es probable que se igualen o superen varios récords de temperatura máxima a medida que este calor se extienda hacia las Llanuras Centrales a mediados de semana. Por el contrario, la mitad oriental del país puede esperar temperaturas cercanas o por debajo de lo normal, ya que una serie de sistemas frontales traerá rondas frecuentes de chubascos y tormentas eléctricas desde el Medio Oeste hasta la costa atlántica. Mientras tanto, se pronostica que un sistema de baja presión proveniente del Pacífico traerá precipitaciones de ligeras a moderadas al Noroeste del Pacífico y al norte de las Montañas Rocosas, al tiempo que vientos racheados podrían acompañar el paso de estos sistemas meteorológicos a través de las Rocosas y las Grandes Llanuras.

A más largo plazo, el pronóstico a 6-10 días del Centro de Predicción Climática (válido del 17 al 21 de mayo de 2026) favorece temperaturas superiores a lo normal en todo Hawái y en la mayor parte de los Estados Unidos contiguos, concentrándose la probabilidad de calor más intenso en el sureste. Se prevé que las áreas a lo largo de la frontera norte y en las zonas meridionales de Alaska registren temperaturas inferiores al promedio durante este periodo. Las probabilidades de precipitaciones superiores a lo normal aumentan en Hawái y en la gran mayoría de los 48 estados contiguos, así como en Alaska. Por el contrario, se favorecen precipitaciones inferiores a lo normal en la Costa Oeste —particularmente en el norte de California— y en partes de la Costa Este, desde la región del Atlántico Medio hasta las Carolinas.

Autor(s)

Rocky Bilotta, NOAA/NCEI

Tsegaye Tadesse, National Drought Mitigation Center