

Resumen nacional de sequía para 19 mayo, 2026

Resumen

Durante la semana, los Estados Unidos contiguos mostraron anomalías térmicas regionales significativas, impulsadas por un patrón sinóptico altamente amplificado. Al comienzo del periodo, una masa de aire frío pronunciada e inusual para la época del año influyó en las Llanuras del Norte, el Alto Medio Oeste y el Noreste, haciendo descender las temperaturas entre 5 °F y 15 °F por debajo de lo normal en las Dakotas, Minnesota, Nueva York y Pensilvania. Por el contrario, el Suroeste y el sur de Texas experimentaron un calor anómalo, con temperaturas máximas que superaron los 90 °F y promediaron hasta 15 °F por encima de lo normal. Hacia la segunda mitad de la semana, esta masa de aire cálido se expandió hacia el este, adentrándose en el Valle del Ohio y la región del Atlántico Medio, dando inicio a una ola de calor temprana en la temporada, con temperaturas máximas observadas que escalaron hasta situarse entre los 85 °F y los 92 °F.

Los regímenes de precipitación durante este periodo se caracterizaron por severos brotes convectivos y marcadas disparidades en la humedad. A principios de la semana, el persistente transporte de humedad desde el mar hacia el interior dio lugar a fuertes acumulaciones de lluvia, de entre 4 y 6 pulgadas, a lo largo de la costa central del Golfo, afectando específicamente a Luisiana, Misisipi y Alabama. Entre el 17 y el 18 de mayo, un potente sistema frontal que atravesaba el centro de los Estados Unidos desencadenó condiciones meteorológicas severas generalizadas en las Grandes Llanuras y el Medio Oeste. Este sistema generó vientos destructivos de hasta 80 millas por hora, granizo de gran tamaño y múltiples tornados en Dakota del Sur, Nebraska, Iowa, Kansas y Misuri, además de inundaciones repentinas localizadas. Por el contrario, persistieron déficits extremos de humedad al oeste de las Montañas Rocosas, donde las acumulaciones semanales de precipitación se mantuvieron, por lo general, por debajo de las 0.10 pulgadas, elevando aún más el riesgo de incendios forestales en el sur de las Altas Llanuras.

Noreste

Las temperaturas variaron en toda la región, oscilando entre los 40 y 50 grados altos en el norte de Maine y los 60 grados medios a altos en el sur del Atlántico Medio. En cuanto a las desviaciones respecto a la normalidad, la mayor parte del Noreste experimentó una semana cálida, con temperaturas que, en general, promediaron entre 1 °F y 4 °F por encima de lo normal. Surgieron focos de calor más pronunciado en el este de Nueva York, el oeste de Vermont y el este de Massachusetts, donde las desviaciones ascendieron entre 4 °F y 8 °F por encima del promedio. La principal excepción a este calor regional se concentró en el suroeste, donde una masa de aire más frío mantuvo las temperaturas en Virginia Occidental y el oeste de Pensilvania entre 2 °F y 6 °F por debajo de lo normal durante la semana. Los totales de precipitación en el Noreste mostraron una marcada división durante esta semana, caracterizada por una zona húmeda concentrada en el norte de Nueva Inglaterra y déficits generalizados en el resto de la región. Las lluvias más intensas se produjeron en el norte de Nueva York, Vermont, New Hampshire y el oeste de Maine, donde los totales alcanzaron entre

2.0 y 3.5 pulgadas, lo que representa una desviación positiva significativa de 1.0 a 2.5 pulgadas por encima de lo normal. Las precipitaciones superiores a lo normal justificaron mejoras en las condiciones de sequía moderada (D1) a severa (D2) y de sequedad anormal (D0) en Maine, New Hampshire, Vermont y el este de Nueva York. La sequedad anormal (D0) también mejoró en el centro de Pensilvania. Por el contrario, el resto de la región experimentó condiciones excepcionalmente secas. Una vasta franja que abarca gran parte de Virginia Occidental, Maryland, Delaware, Pensilvania y partes del sur de Nueva York, el sur de Nueva Inglaterra y el norte de Maine recibió menos de 0.5 pulgadas de lluvia —con muchas áreas cayendo por debajo de las 0.1 pulgadas—, lo que resultó en déficits de precipitación generalizados de 0.5 a 1.5 pulgadas por debajo de lo normal. Se introdujo la categoría de sequía extrema (D3) en el sur y el este de Virginia Occidental, mientras que la sequía severa (D2) se expandió en las zonas centrales del estado. La sequía moderada (D1) también se expandió esta semana en las zonas meridionales de Nueva Inglaterra y en el centro-sur de Pensilvania.

Sureste

Gran parte del sureste experimentó déficits generalizados de humedad; una inmensa mayoría de los territorios de Misisipi, Alabama, Georgia, las Carolinas y Virginia recibió menos de 0,25 pulgadas de precipitación total. Este prolongado periodo de sequía dio lugar a anomalías negativas generalizadas, que oscilaron entre 0,75 y 1,5 pulgadas por debajo de los promedios estacionales en el corazón interior de la región. Se declaró una sequía excepcional (D4) en el oeste de Carolina del Norte, mientras que la sequía extrema (D3) se extendió por partes de Virginia, el este de Carolina del Norte y el centro de Carolina del Sur. La sequía severa (D2) también se expandió hacia las zonas del noreste de Carolina del Norte. Las precipitaciones significativas se limitaron estrictamente a las zonas periféricas del sur del sureste. La actividad convectiva localizada aportó entre 2,0 y 3,5 pulgadas de lluvia a lo largo de la frontera oriental entre Georgia y Florida, así como en el sur de Florida, lo que propició una mejora de las condiciones en dichas áreas. La sequía excepcional (D4) remitió en algunas zonas del sur de Georgia y en la región del Panhandle de Florida, mientras que se observó una mejora en la sequía extrema (D3) en el centro y sur de Georgia, el sur de Alabama y en las zonas septentrionales y orientales de Florida. Las temperaturas medias semanales mostraron un gradiente latitudinal típico, oscilando entre valores en el rango alto de los 50 y bajo de los 60 grados Fahrenheit en el sur de los montes Apalaches, y valores en el rango alto de los 70 y bajo de los 80 grados Fahrenheit en la península de Florida. En términos de desviación respecto a la normalidad, una amplia franja del interior del sureste —que abarca Alabama, Georgia y las Carolinas— experimentó una semana notablemente fresca, con temperaturas medias situadas, en promedio, entre 2 °F y 4 °F por debajo de lo normal. Por el contrario, la península de Florida y la llanura costera de Virginia registraron un calor inusitado para la época, con desviaciones que promediaron entre 2 °F y 4 °F por encima de lo normal.

Sur

Las precipitaciones por debajo de lo normal predominaron en el Sur esta semana. La inmensa

mayoría de Texas, Oklahoma, Arkansas, Luisiana, Misisipi y Tennessee recibió entre 0,10 y 0,50 pulgadas de lluvia total, dejando a la práctica totalidad de esta región geográfica bajo condiciones excepcionalmente secas. Esta falta de precipitaciones se tradujo en déficits generalizados que oscilaron entre 0,75 y 1,50 pulgadas por debajo de lo normal. Los totales de lluvia inferiores a la media derivaron en la declaración de sequía excepcional (D4) en el Panhandle de Oklahoma, así como en la expansión de la categoría D4 en partes de Arkansas y Misisipi. Asimismo, se extendieron las condiciones de sequía extrema (D3) a severa (D2) en zonas de Oklahoma, Arkansas, Misisipi y Tennessee.

La principal excepción a este régimen seco se concentró en las zonas meridionales de la región —específicamente en el sur de Texas—, donde tormentas convectivas localizadas descargaron entre 1,0 y 3,0 pulgadas de lluvia, lo que propició una mejora en la situación de sequía extrema (D3) en las zonas del sur de Texas, Luisiana y Misisipi. Las temperaturas se situaron por encima de lo normal en gran parte de la región, oscilando entre los 50 y 60 grados Fahrenheit altos en Tennessee y los 80 grados altos en algunas zonas de Texas. Al analizar las desviaciones respecto a la normalidad, se observó que una zona altamente anómala de calor intenso afectó a la mitad occidental de la región, donde las temperaturas promediaron entre 6 °F y 15 °F por encima de las normas históricas. Por el contrario, el sector oriental de la región se desmarcó por completo de la tendencia de calentamiento del oeste; Misisipi y Tennessee experimentaron condiciones inusualmente frescas para la época, con temperaturas que descendieron entre 3 °F y 6 °F por debajo de lo normal.

Medio Oeste

Los patrones de precipitación en todo el Medio Oeste se caracterizaron por un intenso y localizado corredor de lluvias torrenciales, que contrastó con una sequedad generalizada en el resto de la región. La actividad hidrológica más significativa se registró en el sur de Iowa, el norte y centro de Misuri, y el centro-oeste de Illinois, donde una serie de complejos tormentosos dejaron acumulados generalizados de entre 2,5 y 5,5 pulgadas, con cantidades puntuales que superaron las 6,25 pulgadas en el centro-sur de Iowa y el centro-norte de Misuri. Este patrón meteorológico húmedo dio lugar a desviaciones positivas sustanciales, de entre 1,5 y más de 4,5 pulgadas por encima de lo normal.

Por el contrario, los márgenes septentrionales y orientales de la región experimentaron una semana notablemente seca. El norte de Minnesota, el norte de Wisconsin, la Península Superior de Michigan, el este de Indiana y gran parte de Ohio recibieron menos de 0,50 pulgadas de lluvia —y gran parte de Kentucky registró cifras inferiores a las 0,10 pulgadas—, lo que generó déficits generalizados de precipitación de entre 0,75 y 1,5 pulgadas por debajo de lo normal.

Una calidez anómala predominó en el Medio Oeste esta semana, con temperaturas promedio que oscilaron entre los 40 grados altos a lo largo de la frontera canadiense y los 70 grados en el suroeste de Misuri. Al analizar las desviaciones respecto a la normalidad, un calor inusual para la temporada dominó las zonas occidental y central del Medio Oeste. Una amplia zona que abarca Misuri, Iowa, Minnesota, Wisconsin y el oeste de Illinois registró temperaturas entre 2 °F y 6 °F por encima de las normas históricas; el núcleo de este calor se centró en el

oeste de Iowa y el noroeste de Misuri, con valores de 6 °F a 10 °F por encima del promedio. Por el contrario, la parte sureste de la región se desmarcó por completo de esta tendencia al calentamiento: el este de Indiana, Ohio y el este de Kentucky quedaron bajo la influencia de una masa de aire más frío que hizo descender las temperaturas medias semanales a niveles entre 2 °F y 4 °F por debajo de lo normal.

Altas Llanuras

Las temperaturas se situaron por encima de lo normal en gran parte de la región esta semana, con valores promedio que oscilaron entre los 40 °F bajos a lo largo de la frontera canadiense y en las zonas montañosas, y los 70 °F medios en el sur de Kansas. Un calor altamente anómalo para esta etapa de la temporada se apoderó de la mitad sur de la región. El núcleo de esta anomalía térmica se centró sobre Kansas y Colorado, donde las temperaturas semanales se dispararon entre 6 °F y 12 °F por encima de los promedios históricos; en puntos localizados del sur de Kansas, los picos superaron en más de 12 °F los valores normales. Este calor inusual para la época se extendió moderadamente hacia el norte, llegando a Nebraska y generando desviaciones de entre 3 °F y 6 °F por encima del promedio. Por el contrario, el norte de las Grandes Llanuras permaneció bajo la influencia de una masa de aire más acorde con la temporada; Dakota del Norte, Dakota del Sur y el norte de Wyoming experimentaron condiciones por debajo de lo normal, fluctuando en un rango de entre 3 °F y 6 °F respecto a las temperaturas de referencia históricas. Los volúmenes de precipitación variaron a lo largo de la región, registrándose una sequedad extrema en gran parte del territorio y un diluvio altamente concentrado a lo largo del límite sureste. Grandes extensiones de Wyoming, Colorado y las zonas occidentales de Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska y Kansas reportaron totales semanales inferiores a 0,50 pulgadas, con amplias áreas que recibieron menos de 0,10 pulgadas. Esta falta de humedad resultó en desviaciones de entre 0,5 y 1,5 pulgadas por debajo del promedio, provocando un deterioro de las condiciones. La sequía extrema (D3) se expandió en el suroeste de Kansas y el sur de Colorado; la sequía severa (D2) se extendió por partes de Colorado y el noreste de Wyoming, mientras que la sequía moderada (D1) se amplió en zonas de Dakota del Sur. En marcado contraste, una intensa actividad convectiva generó un corredor bien definido de lluvias torrenciales a través de las zonas orientales de Kansas y Nebraska. Los totales en esta zona localizada ascendieron rápidamente a valores de entre 2,5 y 5,5 pulgadas, con desviaciones que oscilaron entre 1,5 y más de 4,5 pulgadas por encima de lo normal; esto propició mejoras en las condiciones de sequía, pasando de moderada (D1) a excepcional (D4) en Nebraska, y de moderada (D1) a extrema (D3) en Kansas. Las fuertes lluvias también generaron mejoras en las condiciones de sequía —pasando de severa (D2) a excepcional (D4)— en el norte de Colorado, así como una reducción de la sequía excepcional (D4) en el sur de Wyoming durante esta semana.

Oeste

Las temperaturas variaron en toda la región esta semana, con lecturas promedio que oscilaron entre los 30 y 40 grados Fahrenheit (en el rango medio) en la franja norte y en las zonas de gran altitud, hasta alcanzar los 80 grados (en el rango bajo) en el suroeste desértico. En

términos de desviaciones respecto a la normalidad, predominaron condiciones inusualmente frías en la mitad norte de la región, con desviaciones que oscilaron entre 3 °F y 9 °F por debajo de lo normal. En marcado contraste, la franja sur experimentó un calor inusual para la época. Una dorsal anticiclónica en formación sobre el suroeste elevó las temperaturas en el sur de California, Arizona y Nuevo México entre 3 °F y 9 °F por encima de lo normal; el este de Nuevo México registró los extremos más acentuados. La precipitación en toda la región occidental se caracterizó por un contraste extremo entre una trayectoria de tormentas sumamente activa en el noroeste del Pacífico y la aridez en el resto de la región. Las precipitaciones superiores a lo normal se limitaron a gran parte del estado de Washington y a zonas de Oregón y Montana, donde los totales semanales de lluvia oscilaron entre 1,5 y 3,5 pulgadas, con totales localizados en la Cordillera de las Cascadas que superaron las 4,5 pulgadas. Esta actividad generó desviaciones sustanciales de entre 0,75 y más de 3,0 pulgadas por encima de lo normal, lo que justificó mejoras en las categorías de sequía moderada (D1) a severa (D2) y de sequedad anormal (D0) en Washington y el norte de Idaho, así como mejoras en la categoría de sequedad anormal (D0) en el noroeste de Oregón y el oeste de Montana. Por el contrario, las condiciones secas persistieron en la práctica totalidad del resto del área geográfica. Extensas zonas de California, Nevada, Arizona, Nuevo México y partes de Idaho, Montana y Utah registraron totales de lluvia insignificantes, inferiores a 0,10 pulgadas. Debido al inicio climatológico de la estación seca en algunas partes del oeste, esta falta de precipitaciones se tradujo en modestas desviaciones negativas, que oscilaron entre valores cercanos a la normalidad y 0,75 pulgadas por debajo de los promedios estacionales. No obstante, el deterioro de las condiciones provocó la expansión de la sequía excepcional (D4) en el sur de Idaho, así como de la sequía extrema (D3) en partes de Nuevo México, Arizona, Utah, Montana y el sur de Idaho. Además, se amplió la sequía severa (D2) en Oregón, Montana y Arizona, mientras que la sequía moderada (D1) se extendió por partes de Idaho, Montana, Nevada y Arizona.

Caribe

Las condiciones cálidas y la escasa precipitación en el Caribe han propiciado una ligera expansión de las condiciones de sequedad anormal (D0) en Puerto Rico, a excepción de las regiones del interior y del oeste, donde se observaron lluvias adecuadas. En algunas zonas del suroeste, del centro-norte y en la isla de Culebra, los acumulados de precipitación de los últimos 30 días han caído a niveles que oscilan entre un 15 % y un 40 % por debajo de lo normal; al mismo tiempo, los datos objetivos indican un deterioro en la saturación de las raíces y un aumento del estrés en los cultivos. También resultan evidentes los déficits hidrológicos en el sur-sureste, donde los pozos monitoreados por el USGS continúan registrando descensos en sus niveles. Las evaluaciones de campo realizadas en el suroeste corroboran aún más esta escasez, al señalar bajos caudales fluviales y un amarillamiento prematuro de la vegetación; por su parte, la región del noreste permanece excluida de las clasificaciones de sequedad, debido a la elevada humedad de base característica del bosque tropical y a la ausencia de impactos sociales evidentes.

Esta semana, las Islas Vírgenes de los EE. UU. continuaron experimentando condiciones anormalmente secas debido a un clima más seco de lo normal durante las últimas semanas.

Aunque recientemente se registraron algunos episodios localizados de lluvias intensas, no hubo eventos meteorológicos significativos durante este periodo que aliviaran la presión sobre las aguas subterráneas. El territorio se mantuvo relativamente estable, en consonancia con las condiciones estacionales típicas del mes de mayo.

Esta semana, St. Croix experimentó una variabilidad significativa en las precipitaciones, con totales de lluvia que oscilaron entre 0.42 pulgadas en el Aeropuerto Henry E. Rohlsen y 1.79 pulgadas en la estación CoCoRaHS Frederiksted 1.9NE. Esta disparidad pone de relieve la naturaleza localizada de la actividad convectiva en la isla: las zonas occidentales recibieron lluvias sustanciales, mientras que las secciones orientales —como Christiansted— registraron cantidades más moderadas. Las mediciones de lluvia en diversas estaciones de St. Croix incluyen 0.52 pulgadas en VI-SC-10 (Christiansted 1.6 E), 0.78 pulgadas en VI-SC-20 (Frederiksted 1.7 ESE), 0.6 pulgadas en VI-SC-23 (Christiansted 6.5 W), 0.44 pulgadas en VI-SC-30 (Christiansted 1.7 SW) y 1.28 pulgadas en VI-SC-35 (Frederiksted 1.3 ENE). A pesar de estos aguaceros localizados, el perfil hidrológico de la isla sigue bajo presión, tal como se observa en el pozo Adventure 28, donde la profundidad de los niveles de agua ha seguido aumentando, alcanzando los 21.29 pies para el 19 de mayo de 2026; un incremento significativo en comparación con los 14.15 pies registrados en la misma fecha del año anterior. En consecuencia, St. Croix permanece en condiciones de sequedad anormal. A pesar de estos recientes aguaceros localizados, el suministro de agua de la isla continúa bajo estrés. Esto resulta evidente en el pozo Adventure 28, donde la profundidad del nivel del agua ha seguido aumentando, alcanzando los 21.29 pies para el 19 de mayo de 2026. Esto marca un aumento significativo en comparación con los 14.15 pies registrados en la misma fecha del año anterior. Como resultado, St. Croix continúa experimentando condiciones de sequedad anormal.

St. Thomas experimentó las condiciones más secas de las tres islas esta semana debido a una persistente capa de inversión atmosférica de nivel medio que suprimió la actividad de lluvias. Los registros oficiales del Aeropuerto Cyril E. King reportaron tan solo 0.08 pulgadas de precipitación, mientras que los informes voluntarios de la estación CoCoRaHS de Charlotte Amalie West (VI-ST-15) confirmaron una precipitación igualmente mínima, de 0.09 pulgadas. Esta falta de lluvia ha agravado el déficit hidrológico de la isla. El pozo "Grade School 3" ha mostrado un aumento constante en el nivel del agua desde el 20 de abril de 2026, alcanzando los 8.65 pies para el 19 de mayo de 2026, en comparación con apenas 2.25 pies en la misma fecha de 2025. Como resultado, St. Thomas permanece bajo condiciones anormalmente secas.

St. John se benefició de las precipitaciones más constantes y topográficamente forzadas de todo el territorio; la estación de gran altitud de Windswept Beach (VI-SJ-3) registró 0.75 pulgadas, mientras que Cruz Bay 1.6 E (VI-SJ-5) registró 0.38 pulgadas. Los valores del SPI para Windswept Beach al 14 de mayo de 2026 son: -0.69 (1 mes), 0.46 (3 meses), 0.25 (6 meses), 0.14 (9 meses) y 0.15 (12 meses). Si bien estas lluvias brindaron alivio a los suelos superficiales y a la vegetación gracias al levantamiento orográfico, resultaron insuficientes para propiciar una recarga significativa de las aguas subterráneas. El pozo Susannaberg DPW 3 registró una profundidad del nivel freático de 14.14 pies el 19 de mayo de 2026, lo que marca un descenso continuo tanto con respecto a la semana anterior como al año precedente, cuando los niveles eran significativamente menos profundos, situándose en 8.39 pies (el 19 de

mayo de 2025). Como consecuencia, la isla permanece en la categoría de sequía "Anormalmente Seca" (D0).

Pacífico

Las temperaturas se situaron, en términos generales, por debajo de lo normal en toda Alaska durante esta semana, particularmente en la mitad sur del estado y extendiéndose hacia el norte, hacia el interior. Este patrón más fresco estuvo acompañado de precipitaciones superiores a lo normal en el sur de Alaska, la península de Alaska y el Panhandle, lo que dio lugar a una reducción de la sequedad anormal (D0) en la zona centro-sur de Alaska.

Esta semana, Hawái experimentó una humedad elevada y temperaturas superiores a lo normal, con máximas costeras que se mantuvieron en el rango bajo a medio de los 80 grados Fahrenheit. Un sistema de baja presión en niveles altos —inusualmente fresco para la temporada— canalizó una profunda humedad tropical a través del archipiélago, desencadenando tormentas eléctricas de lento desplazamiento, fuertes aguaceros e inundaciones repentinas localizadas que dejaron hasta 10 pulgadas de lluvia en Kauai y Oahu durante la semana. En la Isla Grande, tormentas localizadas provocaron fuertes precipitaciones en zonas de las costas este y sur, lo que resultó en una mejora de la condición de sequedad anormal (D0) en dichas áreas.

Las Islas Marshall experimentaron una semana de intensas lluvias que afectaron a casi todo el archipiélago, desde los atolones del sur hasta la cadena del norte. Esta semana, Wotje, en el norte, registró la mayor cantidad de precipitaciones del territorio, acumulando la impresionante cifra de 7,95 pulgadas, mientras que Majuro recibió 6,40 pulgadas. Otras islas también reportaron lluvias significativas: Kwajalein recibió 4,19 pulgadas, Mili registró 3,05 pulgadas y Utirik tuvo 2,88 pulgadas. Ailinglapalap reportó 2,50 pulgadas de lluvia, mientras que Jaluit recibió 1,30 pulgadas. Como resultado, las Islas Marshall se encuentran actualmente libres de condiciones de sequía.

Esta semana, los Estados Federados de Micronesia (EFM) experimentaron condiciones de precipitación dinámicas debido a un desplazamiento hacia el norte de la vaguada casi ecuatorial y de las vaguadas de los vientos alisios. Como resultado, una humedad generalizada afectó a los estados orientales y a partes del archipiélago occidental, mientras que solo unos pocos atolones centrales permanecieron secos. Pohnpei registró la mayor cantidad de precipitaciones, totalizando 6,79 pulgadas (con un día de datos faltantes). La laguna de Chuuk recibió 2,76 pulgadas de lluvia (con dos días faltantes), y Kosrae observó 2,18 pulgadas (con dos días faltantes). En las islas occidentales, habitualmente secas, Woleai recibió 3,84 pulgadas y Yap registró 2,58 pulgadas, lo que aseguró que estas islas se mantuvieran libres de sequía. Los atolones cercanos de Nukuoro y Lukunor midieron 0,45 y 0,16 pulgadas de lluvia, respectivamente. Kapingamarangi reportó 1,01 pulgadas (con un día faltante). Debido a las condiciones húmedas de las últimas semanas, las islas de Kapingamarangi, Nukuoro y Lukunor también se encuentran libres de sequía esta semana. Sin embargo, Ulithi registró solo 0,87 pulgadas (con dos días faltantes), manteniendo sus condiciones anormalmente secas.

La estación principal del aeropuerto en Pago Pago no dispone de datos para el periodo

comprendido entre el 13 y el 19 de mayo de 2026. Sin embargo, los sensores remotos de gran altitud distribuidos por Tutuila indican que el territorio experimentó una tormenta tropical excepcionalmente intensa durante ese lapso. Siufaga Ridge registró una cifra extraordinaria de 7,72 pulgadas de lluvia durante la semana, mientras que Toa Ridge reportó 4,73 pulgadas. La mayor parte de estas intensas precipitaciones se produjo en un solo día, el 16 de mayo, cuando Siufaga Ridge recibió 3,60 pulgadas y Toa Ridge registró 2,02 pulgadas en tan solo 24 horas. Como resultado, la Samoa Americana se mantiene libre de condiciones de sequía.

Palau tuvo una semana muy favorable, con precipitaciones constantes y productivas que ayudaron a aliviar los déficits de humedad existentes. Durante esta semana, Koror registró un total de 3,62 pulgadas de lluvia, mientras que la WSO Palau Airai midió 2,57 pulgadas. Como resultado, las islas pasaron de condiciones anormalmente secas a estar libres de sequía.

Las Islas Marianas experimentaron condiciones meteorológicas altamente localizadas y variables durante esta semana. El extremo sur del archipiélago recibió precipitaciones moderadas, mientras que las islas del norte registraron solo cantidades escasas. Esta semana, Guam registró el mayor volumen de lluvia, con 2.61 pulgadas, mientras que la vecina Rota recibió 1.26 pulgadas. En contraste, más al norte, Saipán reportó un mínimo de 0.08 pulgadas. Aunque no se dispuso de datos directos para Tinián, los expertos meteorológicos regionales indicaron que esta comparte condiciones atmosféricas similares a las de Saipán debido a su estrecha proximidad geográfica, lo que sugiere que probablemente experimentó el mismo bajo nivel de precipitaciones. No obstante, gracias a las condiciones húmedas de las semanas anteriores, tanto Saipán como Tinián se mantienen libres de sequía esta semana.

Mirando hacia el futuro

Durante los próximos cinco días (del 19 al 23 de mayo de 2026), Estados Unidos puede esperar un patrón meteorológico sumamente dinámico, caracterizado por extremos de temperatura contrastantes y una actividad tormentosa generalizada. Una ola de calor temprana acaparará los titulares en gran parte del este de los EE. UU. hasta mediados de semana; en las zonas del interior de la región del Atlántico Medio y de las Carolinas, las temperaturas máximas ascenderán a rangos de entre 90 y 95 grados Fahrenheit —lo suficientemente cálido como para establecer potencialmente nuevos récords diarios— antes de que un frente frío traiga un alivio más fresco hacia el jueves. En marcado contraste, el Oeste Intermontano y las Montañas Rocosas experimentarán temperaturas por debajo de lo normal al comienzo de la semana, acompañadas de nevadas acumulativas tardías en las elevaciones más altas de Colorado y Wyoming. Mientras tanto, un fuerte frente frío que se desplazará a través de las Llanuras y el Medio Oeste provocará lluvias generalizadas y tormentas eléctricas severas. Múltiples episodios de lluvias intensas generarán un riesgo de inundaciones repentinas dispersas, concentrándose principalmente en Texas, Oklahoma y Arkansas el martes, antes de que un riesgo ampliado de precipitaciones fuertes se extienda desde el oeste de Texas hasta los Apalaches centrales el miércoles.

A más largo plazo, el pronóstico a 6-10 días del Centro de Predicción Climática (válido del 24 al 28 de mayo de 2026) favorece temperaturas superiores a lo normal en la mayor parte de los Estados Unidos —extendiéndose desde las Montañas Rocosas hasta la Costa Este—; la

mayor probabilidad de que se produzca este calor inusual se concentra en el Alto Medio Oeste. Hawái también tiende hacia condiciones más cálidas. Por el contrario, se espera que las temperaturas sean más frías que el promedio en todo el estado de Alaska y en una zona del noroeste del estado de Washington. Mientras tanto, se pronostican temperaturas cercanas a lo normal en algunas partes del Sur y a lo largo de la Costa Oeste. Las probabilidades de condiciones más húmedas de lo normal favorecen a la gran mayoría del país, incluidos Hawái y algunas zonas de Alaska. En los Estados Unidos contiguos, este patrón meteorológico húmedo se extiende desde el Suroeste hasta la Costa Este, esperándose la mayor probabilidad de precipitaciones superiores a lo normal en la región centro-sur del país, específicamente en el sur de Texas. La Costa Oeste, algunas zonas del Noroeste del Pacífico, el norte de las Rocosas, el norte del Medio Oeste y el norte de Alaska tienen mayores probabilidades de recibir precipitaciones cercanas a lo normal durante este periodo. No se prevé que ninguna zona sea más seca de lo normal.

Autor(s)

Rocky Bilotta, NOAA/NCEI

Tsegaye Tadesse, National Drought Mitigation Center