

Resumen nacional de sequía para 9 junio, 2026

Resumen

Las tormentas eléctricas de verano, caracterizadas por su naturaleza irregular y localizada, dominaron los patrones de precipitación en todo Estados Unidos esta semana. Las mayores desviaciones respecto a los niveles normales de precipitación se registraron en partes de las Llanuras centrales y meridionales, el oeste de Texas, Nuevo México y el Medio Oeste. También se registraron precipitaciones muy por encima de lo normal en zonas del sur de Luisiana, el norte de Alabama y el oeste de Kentucky. La costa este permaneció seca, a excepción de la costa atlántica de Florida. Gran parte del Oeste también se mantuvo seco; solo algunas zonas del noroeste del Pacífico y del sur de California registraron precipitaciones cercanas a lo normal o superiores a la media.

Las temperaturas de la semana estuvieron por debajo de lo normal en todo el sureste; en algunas zonas de Georgia, Florida y Carolina del Sur, los promedios se situaron entre 3 y 6 grados por debajo de lo habitual. También se registraron temperaturas inferiores a lo normal en partes del oeste de Texas, el sureste de Nuevo México y el noroeste del Pacífico. Las mayores desviaciones térmicas se produjeron en las llanuras centrales y septentrionales, donde zonas de Nebraska, Dakota del Sur, Dakota del Norte y Minnesota experimentaron temperaturas entre 9 y 12 grados por encima de lo normal.

Los indicadores de sequía en gran parte del sur de los Estados Unidos siguen siendo mixtos: se observan condiciones más húmedas a corto plazo, mientras que persisten los déficits a largo plazo a pesar del reciente cambio en los patrones meteorológicos. En la región de las Grandes Llanuras, los efectos han repercutido principalmente en el trigo de invierno y en la producción de forraje, y las zonas que han permanecido secas continúan registrando un elevado riesgo de incendios. En el sureste, las preocupaciones sobre el abastecimiento de agua y el riesgo de incendios siguen siendo considerables, especialmente en Florida.

Noreste

Esta semana, las temperaturas fueron más cálidas de lo habitual en casi toda la región; las mayores desviaciones se registraron en Nueva Inglaterra, donde algunas localidades presentaron promedios de 4 a 6 grados por encima de lo normal. Las condiciones secas, sumadas a estas temperaturas inusualmente cálidas, propiciaron la intensificación y expansión de la sequía existente.

En Nueva Jersey, la sequía severa se extendió por gran parte de la zona norte del estado y alcanzó Nueva York y el este de Pensilvania. Las condiciones de sequedad anómala se propagaron por el sureste de Nueva York, mientras que la sequía moderada se extendió por el sur de Connecticut y el oeste de Massachusetts. La sequía severa también se amplió hacia el este de Massachusetts, el este de Rhode Island y partes del este de Maryland. Se registró sequía extrema en el sur de Nueva Jersey, la cual se extendió hacia Delaware y el este de Maryland. Una combinación de sequía a corto y largo plazo está afectando a la agricultura, así como a los recursos de aguas subterráneas y superficiales en toda la región.

Sureste

Se registró una semana más fresca de lo habitual en la mayor parte de la región; casi todas las zonas presentaron temperaturas iguales o inferiores al promedio, a excepción del norte de Virginia. Algunas áreas de Georgia, Carolina del Sur y Florida experimentaron temperaturas entre 4 y 6 grados por debajo de lo normal, mientras que el norte de Virginia registró un promedio de 2 a 4 grados por encima de lo normal.

Las precipitaciones fueron escasas; solo el oeste de Georgia y el norte de Alabama registraron lluvias significativas. El sur de Florida también experimentó tormentas convectivas a lo largo de la costa. A pesar de la semana relativamente seca, el reciente patrón de mayor humedad siguió favoreciendo una mejora de las condiciones de sequía en toda la región.

Las condiciones de sequía siguen siendo desiguales allí donde persisten los déficits a largo plazo, y continúa habiendo una gran preocupación por el suministro de agua en el sur de Georgia y en todo el estado de Florida. Los embalses y lagos que sufrieron un descenso considerable de sus niveles durante el último año se están recuperando más lentamente que otros indicadores de sequía. También persiste un alto riesgo de incendios, especialmente en Florida, donde siguen vigentes varias prohibiciones de quema. El nivel del lago Okeechobee continúa bajo, ya que sigue perdiendo más agua de la que recibe; se encuentra casi 2 pies por debajo de su nivel habitual para esta época del año y apenas 0,28 pies por encima del umbral crítico del 10 %.

Se observaron mejoras en gran parte de Georgia, Florida y Alabama, mientras que en Carolina del Norte y Virginia se produjeron un deterioro y una intensificación de las condiciones. La sequía extrema se extendió por el este de Virginia, y las sequías moderada y severa también se ampliaron hacia las zonas orientales y centrales del estado. En Carolina del Norte, la sequía extrema se expandió y surgió una nueva área de sequía excepcional en las regiones central y norte del estado, extendiéndose la sequía severa hacia la llanura costera.

Aunque algunos indicadores a largo plazo siguen rezagados, los indicadores de sequía en Florida continuaron mostrando mejoría. La sequía extrema y excepcional se redujo tanto en el norte como en el sur del estado, mientras que la sequía severa disminuyó a lo largo de la costa sur del Atlántico. En el sur de Georgia, la sequía extrema pasó a ser severa, al tiempo que las condiciones de sequía moderada y severa mejoraron en la zona occidental del estado. La persistencia de condiciones húmedas en el norte de Alabama permitió reducir las áreas con sequía moderada y aquellas clasificadas como anormalmente secas, registrándose mejoras adicionales en el sur del estado.

La designación de impacto destacado se modificó de «SL» a «L» para reflejar que los impactos principales son ahora de naturaleza a largo plazo.

Medio Oeste

Los indicios de sequía a corto plazo se vieron atenuados por una semana más húmeda en gran parte de la región, lo que resultó principalmente en mejoras, mientras que el deterioro de las condiciones se limitó a Minnesota. Las precipitaciones más intensas se registraron desde

el este de Iowa hasta el oeste de Indiana, así como en gran parte del oeste y centro de Missouri. El oeste de Kentucky también recibió precipitaciones superiores a lo normal. Por el contrario, se registraron precipitaciones inferiores a lo normal desde el oeste de Iowa hasta Minnesota, en gran parte del centro de Wisconsin, y en Ohio y las zonas meridionales de Indiana e Illinois.

Las temperaturas fueron variadas: gran parte de la región registró valores por encima de lo normal, con Minnesota situándose entre 8 y 10 grados por encima de la media. Por el contrario, desde el sur de Misuri hasta Kentucky se observaron temperaturas cercanas a lo normal o inferiores a ello.

Se observaron mejoras en las condiciones de sequedad anómala y sequía moderada en el norte de Illinois, el este de Iowa y el noreste y sur de Misuri. La sequía extrema desapareció del oeste de Kentucky, donde también mejoraron las condiciones de sequía moderada, extendiéndose dicha mejoría hacia el sur de Illinois.

El cambio más significativo se produjo en Minnesota, donde los efectos acumulados de varios años de sequía han afectado gran parte de la zona norte del estado, incluidas las cabeceras del río Misisipi. La sequía moderada se extendió y surgió una sequía severa.

Altas Llanuras

Las temperaturas fueron, por lo general, más cálidas de lo habitual en toda la región; en algunas zonas de las Dakotas y del oeste de Nebraska, los promedios se situaron entre 9 y 12 grados por encima de lo normal. Se registraron precipitaciones superiores a la media en el sur de Nebraska, el norte de Kansas, la franja que va desde el norte de Nebraska hasta el sur y el centro de Dakota del Sur, y gran parte del norte de Dakota del Norte. Las zonas situadas a lo largo de las estribaciones de las Montañas Rocosas, desde Montana hasta Colorado, permanecieron mayormente secas.

La intensidad de la sequía disminuyó en las zonas de Nebraska, Kansas y Dakota del Sur donde se registraron las lluvias más intensas, y la sequía desapareció en partes del norte de Kansas y del sureste de Nebraska. El sureste de Dakota del Sur siguió sin recibir precipitaciones significativas, y la combinación de condiciones secas a corto y largo plazo propició la expansión de la sequía moderada y severa. También se produjo un deterioro en el este de Colorado, donde la sequía extrema se extendió por el norte y la sequía moderada avanzó por las zonas centro-orientales del estado. La sequía extrema se redujo ligeramente en el sur de Colorado tras las recientes lluvias.

Sur

Las temperaturas fueron variadas: Oklahoma y Arkansas registraron promedios de 2 a 4 grados por encima de lo normal. Por otro lado, gran parte del oeste, sur y este de Texas, así como el este de Misisipi y Tennessee, presentaron promedios de 2 a 4 grados por debajo de lo normal.

La mayor parte de la región registró precipitaciones, aunque el este de Arkansas, el norte de

Misisipi, el sur de Texas y el suroeste de Oklahoma fueron las zonas más secas. La persistencia de un patrón más húmedo propició nuevas mejoras, lográndose eliminar la sequía en una mayor parte del centro de Texas y el este de Oklahoma. La sequía también se atenuó en gran parte de las zonas del Panhandle de Texas y Oklahoma, si bien persistió una sequía generalizada de carácter severo y extremo.

La sequedad persistente en el extremo sur de Texas continúa disminuyendo; la mejora de las condiciones locales, sumada a los datos a corto plazo, justificó la eliminación de las últimas clasificaciones de «anormalmente seco». También se registraron mejoras en Arkansas, Misisipi, Luisiana y Tennessee, donde las recientes condiciones húmedas están empezando a contrarrestar los indicadores de sequía a largo plazo.

Oeste

Las precipitaciones superiores a lo normal se limitaron a unas pocas zonas, principalmente a lo largo de la costa del Noroeste del Pacífico y en el sur y el este de Nuevo México. Las temperaturas estuvieron por encima de lo normal en gran parte de la región, con desviaciones de entre 6 y 9 grados por encima de la media en Nevada, Utah y el oeste de Colorado. Se registraron temperaturas inferiores a lo normal en el Noroeste del Pacífico y en el este de Nuevo México, con desviaciones que promediaron entre 3 y 4 grados por debajo de lo habitual.

Aunque algunas zonas han recibido precipitaciones adicionales recientemente, un invierno caracterizado por temperaturas superiores a lo normal y una acumulación de nieve inferior a la media sigue afectando a la región y probablemente influirá en las condiciones durante el verano. La situación empeoró en Oregón, donde la sequía de moderada a extrema se extendió por gran parte de la zona oriental del estado, si bien el sur de Oregón experimentó mejoras localizadas, pasando a una sequía moderada.

Por otra parte, el oeste de Montana se benefició de las lluvias recientes, lo que permitió una mejora en las condiciones de sequía severa y extrema. La sequía extrema también disminuyó en gran parte del este de Utah, mientras que el sur y el este de Nuevo México experimentaron mejoras adicionales tras registrarse precipitaciones que superaron el 200 % de los niveles normales.

Caribe

El sur de Puerto Rico continuó secándose, lo que ha comenzado a generar preocupación entre los proveedores de agua. Esta semana se extendieron la sequía moderada y las condiciones de sequedad anómala.

Esta semana persistieron las condiciones secas en las Islas Vírgenes de los EE. UU.; la situación en St. John y St. Thomas empeoró, pasando de sequedad anómala (D0-S) a sequía moderada a corto plazo (D1-S), mientras que St. Croix permaneció en sequía moderada a corto plazo (D1-S). En St. John, la estación de Rafe Boulon/Windswept Beach no registró precipitaciones, y las estaciones de CoCoRaHS en toda la isla reportaron un promedio de apenas 0,08 pulgadas. El 9 de junio, el nivel del agua subterránea en el pozo Susannaberg

DPW 3 se situaba a 15,02 pies por debajo de la superficie del terreno; los análisis indican que los niveles de agua han descendido en su mayor parte desde el 19 de octubre de 2025. En el último año, este nivel de agua subterránea ha bajado aproximadamente 5,2 pies con respecto a los 9,82 pies registrados el 9 de junio de 2025. Esta sequedad localizada se ve corroborada por el índice SPI a corto plazo.

En St. Thomas, el Aeropuerto Cyril E. King tampoco registró precipitaciones esta semana, y las estaciones de CoCoRaHS reportaron un promedio de 0,08 pulgadas. El 9 de junio se midió la profundidad del nivel del agua en el pozo Grade School 3, situándose a 9,03 pies por debajo de la superficie del terreno; esto representa un ligero aumento de 0,1 pies con respecto a la semana anterior (9,03 pies el 2 de junio). Los valores del SPI confirman estos déficits incipientes, mostrando condiciones de sequedad en las escalas temporales de 1, 3 y 6 meses, mientras que no se dispuso de datos de SPI a largo plazo para la isla.

En St. Croix, esta semana se registró un total de 0,06 pulgadas de lluvia en el Aeropuerto Henry Rohlsen, mientras que la estación de East Hill registró 0,71 pulgadas (una cifra que coincide con el promedio de 0,72 pulgadas de las observaciones de CoCoRaHS). El 9 de junio, la profundidad del nivel del agua en el pozo Adventure 28 era de 21,76 pies por debajo de la superficie del terreno, lo que refleja un descenso constante y acusado durante el último año. Esto representa una bajada de 7,6 pies con respecto a la misma época del año anterior, cuando el nivel del agua subterránea se situaba en 14,46 pies el 9 de junio de 2025. Como reflejo de este déficit prolongado, los valores del SPI correspondientes a los periodos de 1, 3, 6, 9 y 12 meses confirman las condiciones de sequedad predominantes en St. Croix.

Pacífico

No se realizaron cambios en Alaska.

No se realizaron cambios en Hawái.

Las precipitaciones fueron ligeras en gran parte de la República de las Islas Marshall. Ulirik, Ailinglapalap, Majuro, Jaluit, Wotje y Kwajalein registraron menos de una pulgada de lluvia, con 0,22, 0,30, 0,38, 0,41, 0,91 y 0,98 pulgadas respectivamente. Mili registró 3,45 pulgadas de lluvia esta semana. Todas las islas permanecen libres de condiciones de sequedad.

Los Estados Federados de Micronesia registraron precipitaciones intensas en la mayor parte de sus islas, manteniéndolas libres de sequedad. La mayoría de las islas acumularon más de 2,5 pulgadas de lluvia esta semana: la laguna de Chuuk (4,98 pulgadas), Pohnpei (3,14 pulgadas), Nukuoro (2,92 pulgadas), Lukunor (4,80 pulgadas), Kapingamarangi (9,84 pulgadas) y Woleai (2,70 pulgadas). Las excepciones fueron Yap (1,46 pulgadas) y Kosrae (0,19 pulgadas), mientras que no se dispuso de datos para el análisis de Fananu, Pingelap y Ulithi.

La República de Palaos se mantiene libre de sequedad; Koror registró 1,93 pulgadas de lluvia esta semana y Airai, 4,49 pulgadas, tras un mes de mayo húmedo en el que se acumularon 17,54 pulgadas.

Fue otra semana seca en las islas Marianas. Guam registró apenas 0,23 pulgadas de lluvia y

Rota, 0,31 pulgadas durante la semana. El Aeropuerto Internacional de Saipán registró 0,7 pulgadas. Comienza a observarse una tendencia a la sequedad, por lo que serán necesarias lluvias beneficiosas en las próximas semanas para evitar caer en una situación de sequedad anómala.

Samoa Americana vivió una semana seca: Pago Pago recibió 0,27 pulgadas y Siufaga Ridge registró 0,74 pulgadas, mientras que Toa Ridge no registró precipitaciones durante la semana. A pesar de estas condiciones más secas, el buen nivel de lluvias registrado en mayo garantiza que Samoa Americana se mantenga libre de sequía y condiciones de aridez.

Mirando hacia el futuro

Se espera que el oeste permanezca bastante seco durante los próximos 5 a 7 días, mientras que el sur de Estados Unidos y partes del Medio Oeste presentan la mayor probabilidad de registrar precipitaciones por encima de lo normal. Se prevé que las llanuras del norte y el suroeste reciban menos de una pulgada de precipitación.

Se prevé que las temperaturas se mantengan por encima de lo normal en todo el oeste, con valores que superarán en más de 10 grados el promedio habitual en Nevada y partes del noroeste del Pacífico. En la mayor parte del resto del país, se esperan temperaturas cercanas a lo normal o ligeramente inferiores.

La previsión para el periodo de 6 a 10 días indica que las mayores probabilidades de registrar temperaturas superiores a lo normal se concentrarán en el oeste y el sureste, especialmente en zonas centradas en Nevada y gran parte del sur de Florida. Por otro lado, las probabilidades de temperaturas inferiores a lo normal se centrarán en la región de los Grandes Lagos y el Medio Oeste, con los índices más altos en Michigan.

Existe una probabilidad superior a la normal de registrar precipitaciones inferiores a lo habitual en gran parte de las Llanuras del norte y el Alto Medio Oeste, así como en las zonas septentrionales de California, Nevada y partes de Oregón. Por otro lado, la probabilidad de registrar precipitaciones superiores a lo normal será mayor principalmente en el sur y el este de los Estados Unidos, concentrándose las probabilidades más altas en el sur de Texas y en el valle bajo del río Misisipi.

Autor(s)

Brian Fuchs, National Drought Mitigation Center

Lindsay Johnson, National Drought Mitigation Center