

Resumen nacional de sequía para 16 junio, 2026

Resumen

Las precipitaciones más intensas de esta semana se registraron en el Medio Oeste y en las Llanuras del sur. Se produjeron lluvias torrenciales que provocaron inundaciones, extendiéndose desde el sur de Texas hasta la región de la Costa del Golfo, tanto durante el periodo analizado esta semana como posteriormente. En algunas zonas de Illinois e Indiana, los totales de precipitación superaron los valores normales entre 4 y 5 pulgadas. En las últimas semanas, las lluvias persistentes en el Medio Oeste y en las Llanuras (desde la zona central hasta la meridional) han contribuido a una mejora generalizada de las condiciones de sequía.

Las temperaturas se situaron cerca o por encima de lo normal en gran parte del país. Las condiciones más frescas se registraron desde las Llanuras Centrales hasta el norte de las Montañas Rocosas, donde zonas de Montana y Wyoming presentaron promedios de entre 4 y 6 grados por debajo de lo habitual. En cambio, la costa este —especialmente Nueva Inglaterra—, así como gran parte de California y el sur de Nevada, experimentaron temperaturas superiores a lo normal. Algunas zonas de Nueva Inglaterra registraron valores entre 8 y 10 grados por encima de la media.

Noreste

Esta semana predominaron temperaturas cálidas en la región. Las zonas que abarcan desde el este de Massachusetts hasta Maine registraron temperaturas entre 8 y 10 grados por encima de lo normal, con desviaciones localmente mayores. Gran parte de Virginia Occidental, el oeste de Pensilvania, el oeste de Nueva York y sectores de Nueva Inglaterra también recibieron precipitaciones superiores a lo habitual.

Las precipitaciones en Maine permitieron mejorar la situación de sequía moderada en gran parte del estado. Sin embargo, la sequía moderada se extendió por Massachusetts, Connecticut y el este de Nueva York, mientras que la sequía severa abarca ahora la totalidad de Long Island. La sequía extrema se propagó más hacia el norte en Delaware y alcanzó zonas adicionales del este de Maryland. La semana lluviosa también permitió aliviar las condiciones de sequía en partes del oeste de Maryland y de Virginia Occidental.

Sureste

Las precipitaciones fueron desiguales en toda la región esta semana. Georgia recibió las precipitaciones más generalizadas, y en partes del centro y norte de Georgia se registraron precipitaciones superiores a lo normal. Las precipitaciones casi normales fueron comunes en gran parte de la región, aunque partes de Florida y el sur de Alabama estuvieron por debajo de lo normal durante la semana.

La mayor parte del sureste registró temperaturas cercanas a lo normal o superiores a la media; las mayores desviaciones —entre 6 y 8 grados por encima de lo habitual— se observaron en Carolina del Norte y Virginia. Carolina del Norte sigue siendo el estado que presenta el mayor agravamiento de la sequía, especialmente en sus zonas centrales. Esta semana se

intensificaron las condiciones de sequía extrema y excepcional, y gran parte del estado reporta caudales fluviales cercanos a mínimos históricos.

Las precipitaciones generalizadas favorecieron la continua mejoría de la sequía en Georgia, donde la intensidad del fenómeno disminuyó en gran parte del estado y solo unos pocos condados permanecen en situación de sequía extrema. También se registraron mejoras puntuales en el norte de Carolina del Sur y el oeste de Carolina del Norte, zonas que se vieron aliviadas por las lluvias recientes. En Virginia, las condiciones se mantuvieron prácticamente sin cambios esta semana, ya que las lluvias recientes ayudaron a frenar el deterioro en curso. La sequía severa disminuyó en algunas zonas del norte de Virginia, mientras que la sequía extrema se extendió ligeramente por las áreas meridionales del estado.

Florida sigue presentando un panorama complejo. Las zonas costeras del lado atlántico del estado, así como gran parte del sur de Florida, mantuvieron un patrón de precipitaciones activas durante esta semana. Persiste una señal marcada de sequía hidrológica a largo plazo, pero la mayoría de los demás indicadores de sequía continúan mejorando gradualmente. Estas mejoras propiciaron una reducción localizada de la sequía en algunas zonas del sur de Florida.

El lago Okeechobee permanece más de dos pies por debajo de su nivel normal y sigue perdiendo más agua a través de las salidas de la que recibe mediante las entradas. Varias zonas de los Everglades continúan sin agua estancada y se mantienen vigentes las prohibiciones de quemas en varios condados.

Las condiciones se mantuvieron bastante estables la semana pasada en Alabama, con solo una leve mejoría de la sequía en el extremo norte del estado y a lo largo de la frontera con Georgia. Sin embargo, el calor estival ya está ejerciendo presión sobre los caudales de los arroyos, especialmente en la zona sur de Alabama.

Medio Oeste

Últimamente, los estados del Medio Oeste continúan registrando un patrón meteorológico activo, con otra semana de precipitaciones generalizadas y varios episodios de tiempo severo que se extienden desde Misuri e Iowa hacia el este, hasta Michigan y Ohio. En consecuencia, se ha producido un mayor alivio de la sequía en una franja que abarca desde el noreste de Misuri hasta el norte de Illinois. Tanto Ohio como Indiana están libres de condiciones de sequía o de sequedad anómala, y la mayor parte de Michigan presenta la misma situación, a excepción del extremo occidental de la Península Superior.

El norte de Illinois y el centro de Wisconsin experimentaron el alivio más generalizado de la sequía gracias a las lluvias que, durante la última semana, dejaron acumulados de entre 2 y 4 pulgadas (o más) en amplias zonas. Otras áreas muy beneficiadas por las fuertes precipitaciones incluyen el sureste de Iowa, donde se registraron entre 2 y 5 pulgadas de lluvia. El norte de Missouri registró los mayores acumulados, situándose en el rango de 5 a 10 pulgadas, lo que eliminó los últimos vestigios de sequedad anómala en la parte noreste del estado. Sin embargo, persistió una sequía severa a extrema de larga duración en la región del «Bootheel» de Missouri, donde los indicadores a largo plazo siguen reflejando un déficit

sustancial de precipitaciones.

Mientras tanto, en Kentucky, las zonas norte y oeste del estado registraron precipitaciones de entre 1 y 4 pulgadas (en puntos localizados), lo que ayudó a reducir la extensión de la sequía de moderada a grave. Sin embargo, la situación en el este de Kentucky no ha sido tan favorable, ya que continúan acumulándose déficits de precipitaciones tanto a corto como a largo plazo. Esta semana se ha identificado una nueva zona de sequía extrema, donde ya se perciben impactos hidrológicos en las cuencas de los ríos Kentucky y Big Sandy. Los bajos caudales y los problemas de abastecimiento de agua ya están afectando al este de Kentucky a un nivel que resultaría preocupante incluso en una etapa más avanzada del verano.

Otras zonas donde se ha extendido la sequía en la región del Medio Oeste incluyen el norte de Minnesota y el norte de Iowa, donde los déficits de precipitaciones persistentes y prolongados siguen siendo motivo de preocupación. En el norte de Minnesota, la sequía severa se ha ampliado en dirección norte-noreste hacia la frontera con Canadá, reflejando la persistencia y el agravamiento de las condiciones de sequía en la parte septentrional del estado. Si bien el sur y el este de Iowa han registrado precipitaciones considerables, las zonas norte y oeste del estado han permanecido persistentemente secas. La ausencia de lluvias durante la semana pasada en el centro-norte de Iowa motivó la clasificación de sequía moderada justo al sur de la frontera con Minnesota, según un informe de extensión agrícola local.

Altas Llanuras

En los estados de las Grandes Llanuras, la sequía persiste en el oeste de Kansas y el este de Colorado. Las zonas afectadas por sequía extrema y excepcional se extienden desde el este de Wyoming hasta el oeste y norte de Nebraska y el extremo sur de Dakota del Sur. La persistente falta de precipitaciones y las temperaturas superiores a lo normal agravaron las condiciones de sequía en las llanuras del este de Colorado y en pequeñas zonas del noroeste de Kansas. La sequía excepcional se extendió a tres condados de la región del *Panhandle* de Nebraska, donde el estado de los pastizales y de los cultivos de trigo de secano es el peor registrado en décadas, consecuencia de un invierno cálido y seco sin precedentes seguido de escasas lluvias primaverales. Los efectos en la agricultura del oeste de Nebraska fueron confirmados por los indicadores de sequía correspondientes a los últimos 6 a 12 meses.

La semana pasada se registraron otras zonas de deterioro en Dakota del Norte, especialmente en la mitad occidental del estado. La sequía moderada se extendió hacia el sur a lo largo de la frontera con Montana, a medida que se intensificaban las condiciones secas en el oeste de Dakota del Norte. Asimismo, se identificó una situación de sequedad anómala desde el suroeste hasta la zona centro-norte del estado, debido a las recientes condiciones más secas de lo habitual.

Las únicas mejoras en la región de las Grandes Llanuras (High Plains) se observan en el centro y el este de Nebraska. Durante la semana pasada, se registraron precipitaciones de entre 2 y 4 pulgadas en dos franjas: una a lo largo del corredor de la Interestatal 80 y otra en el sureste de Nebraska, zona que actualmente está libre de sequía o condiciones de sequedad anómala.

Sur

En los estados del sur, muchas zonas registraron precipitaciones generalizadas y significativas de entre 2 y 6 pulgadas durante la última semana, especialmente en el sur y este de Texas, el este de Oklahoma, el norte de Arkansas, el norte de Misisipi y el oeste de Tennessee. La mayor parte de estas zonas del sur profundo experimentó una mejora en las condiciones de sequía gracias a estas lluvias. La única excepción se encuentra en el noreste de Tennessee, donde se registró un agravamiento de la sequía al noroeste de Knoxville debido al deterioro de los indicadores correspondientes.

La zona noreste del Panhandle de Texas registró entre 2 y 4 pulgadas de lluvia en un área afectada por sequía excepcional, lo que ayudó a aliviar las condiciones y permitió una ligera mejora hacia una categoría de sequía extrema en dicha zona. Sin embargo, en gran medida, persistieron condiciones de sequía extrema a excepcional en los Panhandles de Texas y Oklahoma, así como en gran parte del oeste de Oklahoma. A pesar de haberse registrado precipitaciones semanales de 2 pulgadas o más en la periferia de Arkansas, la sequía —de severa a excepcional— continuó afectando gran parte del estado debido a los déficits de lluvia acumulados a largo plazo durante los últimos meses.

Las recientes lluvias significativas en el este de Oklahoma, sumadas a las fuertes precipitaciones de la semana pasada, provocaron una reducción considerable de las condiciones de sequedad anómala en una zona que abarca desde Texas hasta el suroeste de Misuri. Las lluvias intensas y generalizadas —que acumularon entre 2 y 6 pulgadas o más— condujeron a una disminución tanto de la extensión como de la intensidad de la sequía en el sur y este de Texas, el centro de Luisiana y partes del oeste de Misisipi. El alivio de la sequía también llegó al oeste y noroeste de Tennessee, marcando el límite oriental de la amplia zona afectada por fuertes lluvias esta semana en el sur del país.

Oeste

Esta semana no se registraron precipitaciones generalizadas en la región. Sin embargo, algunas zonas del oeste de Oregón y Washington, Arizona, el norte de Idaho, Nuevo México, el sur de Montana, el sur de Utah y el norte de Wyoming registraron precipitaciones por encima de lo normal.

Las temperaturas fueron variadas: se registraron valores por debajo de lo normal en la parte norte de la región y temperaturas por encima de lo normal más al sur. Las condiciones más cálidas se presentaron en California, Nevada y Arizona, donde predominaron anomalías de entre 6 y 8 grados —o más— por encima de lo habitual.

Las condiciones de sequía empeoraron en el este de Oregón, donde se extendió la sequía moderada. Asimismo, la sequía moderada, grave y extrema se propagó por gran parte del sur de Idaho y hacia el oeste de Montana, mientras que la sequía extrema aumentó su extensión en el centro de Wyoming.

Varias semanas de condiciones más húmedas de lo habitual en Nuevo México permitieron una mejora de la situación de sequía extrema en las zonas noreste y sur del estado, aunque se

produjo una ligera expansión en las áreas del norte. La mejora de las condiciones de humedad a corto plazo en el este de Utah y el oeste de Colorado favoreció una reducción de la sequía extrema, mientras que en el centro y el este de Colorado se registró un deterioro de la situación.

Los efectos de un invierno seco y de una acumulación de nieve inferior a lo normal siguen afectando a Colorado y a otras partes de la región, donde un número creciente de cursos de agua presenta caudales bajos.

Caribe

En Puerto Rico, las condiciones continuas más secas de lo normal permitieron que condiciones anormalmente secas se expandieran a otras partes del centro y norte de Puerto Rico, mientras que la sequía moderada se expandió en el suroeste.

Esta semana persistieron las condiciones de sequedad en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, manteniéndose todas las localidades en una situación de sequía moderada a corto plazo. En St. John, la estación de Rafe Boulon/Windswept Beach no registró precipitaciones durante la semana, prolongando así la racha sin lluvias reportadas en lo que va de mes. El 16 de junio, el nivel del agua subterránea en el pozo Susannaberg DPW 3 se situaba a 15,40 pies por debajo de la superficie del terreno; los análisis muestran una tendencia general al descenso desde el 19 de octubre de 2025 (cuando el nivel era de 7,56 pies), a pesar de una ligera y temporal recuperación a principios de febrero y mediados de abril. En el último año, este nivel freático ha descendido aproximadamente 5,09 pies con respecto a los 10,31 pies registrados el 16 de junio de 2025. Esta sequedad localizada se ve corroborada por los índices SPI de 1, 3 y 9 meses, que señalan condiciones secas en la isla, si bien los índices SPI correspondientes a los plazos de 6 y 12 meses mostraron valores más cercanos a la media.

Por otro lado, esta semana solo se registró una cantidad insignificante de lluvia en el Aeropuerto Henry Rohlsen de St. Croix, situando el total acumulado del mes en 0,06 pulgadas al 15 de junio. Las estaciones de la red CoCoRaHS distribuidas por la isla han reportado totales mensuales acumulados de entre 0,23 y 1,40 pulgadas. El 16 de junio, la profundidad del nivel del agua en el pozo Adventure 28 era de 21,76 pies por debajo de la superficie del terreno, lo que refleja un descenso constante y acusado durante el último año. Esto representa una bajada de 6,99 pies con respecto a la misma época del año anterior, cuando el nivel de las aguas subterráneas se situaba en 14,77 pies el 16 de junio de 2025. Como reflejo de este déficit prolongado, todas las escalas temporales del SPI (1, 3, 6, 9 y 12 meses) confirman las condiciones de sequedad predominantes en St. Croix.

En St. Thomas, el Aeropuerto Cyril E. King registró solo una cantidad insignificante de precipitación durante el mes de junio hasta el día 15. El 16 de junio, se midió la profundidad del nivel del agua en el pozo Grade School 3, situándose a 9,25 pies por debajo de la superficie del terreno. Los niveles de agua subterránea en este punto han experimentado un descenso constante desde el 20 de abril de 2026 (cuando el nivel era de 4,13 pies), bajando 5,12 pies en las últimas 8 semanas; además, este nivel se encuentra 7,21 pies por debajo del máximo anual de 2,04 pies registrado el 19 de octubre de 2025. Los valores del SPI confirman estos déficits incipientes, mostrando condiciones de sequedad en las escalas temporales de 1,

3, 6 y 9 meses, mientras que no se disponía de datos del SPI para la escala de mayor plazo (12 meses) en la isla.

Pacífico

En Alaska, las condiciones han sido bastante secas en el territorio continental durante las últimas semanas. Sin embargo, el deshielo tardío —más allá de lo habitual— y las temperaturas inferiores a lo normal han evitado impactos significativos; los ecosistemas locales permanecen estables y no se ha observado un riesgo inmediato de incendios. Esta semana no se han realizado cambios en Alaska.

No se realizaron cambios en Hawái esta semana.

Samoa Americana permaneció libre de sequía o condiciones de sequedad anómala esta semana, al regresar las condiciones húmedas a las islas. Pago Pago registró un total de precipitaciones semanales de 2,03 pulgadas, elevando el acumulado mensual de junio a 3,50 pulgadas hasta el día 15. Asimismo, Toa Ridge y Siufaga Ridge reportaron totales de lluvia semanales de 2,38 y 1,29 pulgadas, respectivamente. En consecuencia, Pago Pago continúa totalmente libre de sequía y de sequedad anómala.

Esta semana, las precipitaciones en Palaos estuvieron por debajo de lo normal; la estación de observación COOP de Koror registró un total semanal de 1,46 pulgadas, lo que elevó el acumulado mensual a 3,86 pulgadas al 16 de junio. Aunque esta cifra es inferior al umbral mínimo de dos pulgadas necesario para satisfacer las necesidades hídricas, Palaos permanece libre de sequía y de condiciones de sequedad anómala gracias a las condiciones húmedas registradas anteriormente.

Esta semana, las condiciones fueron más secas de lo habitual en la mayor parte de las islas Marianas. Rota y Guam registraron totales de precipitación semanal de 0,74 y 0,36 pulgadas, respectivamente; cifras inferiores al umbral mínimo semanal de una pulgada necesario para satisfacer las necesidades hídricas de las islas. Saipán recibió 0,31 pulgadas esta semana, lo que marca la séptima semana consecutiva en la que los totales de precipitación se situaron por debajo de dicho umbral mínimo. Como consecuencia, la clasificación de Saipán se ajustó esta semana a la categoría de sequedad anómala a corto plazo.

Las condiciones variaron en los Estados Federados de Micronesia esta semana.

Kapingamarangi y Nukuoro registraron totales de precipitación semanal de 3,35 y 2,69 pulgadas, respectivamente, manteniéndose libres de sequía y de condiciones de sequedad anómala. Lukunoch, Yap, Pohnpei, Kosrae, Chuuk y Woleai reportaron totales semanales de 1,50, 0,72, 0,67, 0,50, 0,43 y 0,19 pulgadas, respectivamente. Aunque estas cantidades estuvieron por debajo del umbral mínimo semanal de dos pulgadas, dichas localidades permanecieron libres de sequía y de sequedad anómala gracias a las condiciones húmedas previas. Por otro lado, los datos correspondientes a Pingelap, Fananu y Ulithi fueron insuficientes para realizar una evaluación esta semana.

Predominaron condiciones secas en la mayor parte de la República de las Islas Marshall; en Wotje (1,40 pulgadas), Mili (0,93 pulgadas), Utirik (0,50 pulgadas) y Jaluit (0,31 pulgadas) las precipitaciones estuvieron por debajo del umbral mínimo semanal de dos pulgadas necesario

para satisfacer las necesidades hídricas, aunque estas localidades permanecieron libres de sequía y de condiciones de sequedad anómala gracias a las condiciones húmedas previas. Ailinglapalap registró 0,20 pulgadas esta semana, marcando la tercera semana consecutiva en la que el total de precipitaciones no alcanzó dicho umbral de dos pulgadas; en consecuencia, la clasificación de Ailinglapalap se ajustó esta semana a la categoría de sequedad anómala a corto plazo. Por el contrario, Kwajalein y Majuro reportaron 3,57 y 2,17 pulgadas de lluvia, respectivamente, manteniéndose ambas localidades libres de sequía y de sequedad anómala.

Mirando hacia el futuro

Durante los próximos 5 a 7 días, se esperan más lluvias intensas en el sur profundo de Estados Unidos debido a la tormenta tropical Arthur, que al momento de redactar este informe se encuentra cerca de la costa sureste de Texas. Una gran masa de humedad tropical fluirá en dirección noreste desde Arthur a medida que esta avance hacia los estados del sureste. Estas precipitaciones de origen tropical podrían aliviar aún más la sequía en el sureste de Luisiana, Alabama, Georgia y Tennessee. Los pronósticos actuales del Centro de Predicción Meteorológica (Weather Prediction Center) también indican la posibilidad de acumulaciones significativas de lluvia desde Oklahoma, Misuri y Arkansas hacia el este, abarcando el valle del río Ohio, con un riesgo adicional de tiempo severo en la región del Medio Oeste. Asimismo, se prevén precipitaciones considerables en partes del noreste y en las zonas orientales de las Grandes Llanuras (High Plains).

El pronóstico a 6-10 días del Centro de Predicción Climática indica que deberían predominar temperaturas superiores a lo normal en gran parte del oeste de los Estados Unidos y a lo largo de la costa inmediata del Golfo hasta Florida. Es posible que se registren temperaturas inferiores a lo normal desde la parte oriental de las Grandes Llanuras y el Medio Oeste hasta los estados del noreste. Por otro lado, se prevén precipitaciones superiores a lo normal en gran parte del Medio Oeste y las Grandes Llanuras, extendiéndose posiblemente hacia los estados del noreste. Para el sur y el sureste se anticipan lluvias cercanas a lo normal durante este periodo, mientras que en la mayor parte del oeste se esperan precipitaciones inferiores a lo normal.

Autor(s)

Brian Fuchs, National Drought Mitigation Center

Rocky Bilotta, NOAA/NCEI