

Resumen nacional de sequía para 14 julio, 2026

Resumen

Esta semana se registraron fuertes lluvias en diversas partes de Estados Unidos, lo que alivió considerablemente la sequía persistente y las condiciones de sequedad anómala en una franja que se extiende desde el noreste de Texas hasta la región del Atlántico Medio. En algunas zonas, las lluvias recientes desplazaron los efectos de la sequía hacia un horizonte temporal más largo. Se observaron mejoras localizadas tras las precipitaciones recientes en partes del sur de Nueva York, el sur de Nueva Inglaterra y sectores de la región central de las Grandes Llanuras. Asimismo, se produjeron mejoras puntuales en áreas reducidas del noroeste de Alaska y del centro-norte de Puerto Rico gracias a las fuertes lluvias de esta semana. La evaluación de las condiciones a corto plazo en Utah y en partes del oeste de Oklahoma, así como del oeste y sur de Texas, dio lugar a algunas mejoras. Por otro lado, predominó un clima cálido y seco en la zona occidental de la región de los Grandes Lagos, especialmente en el extremo norte de Wisconsin, partes de la Península Superior de Michigan, el norte de Minnesota y el este de Dakota del Norte; estas áreas experimentaron un deterioro generalizado debido a las condiciones meteorológicas de la semana. En las zonas más secas del centro de Colorado, también se registró una expansión de las categorías de sequía extrema y excepcional. Los caudales fluviales extremadamente bajos y el déficit de precipitaciones a corto plazo persistieron en partes del estado de Washington, provocando un deterioro generalizado en la región. Finalmente, la sequía severa se intensificó tanto en el centro-sur de Puerto Rico como en el sureste de Florida, a consecuencia del déficit de lluvias a corto plazo en ambas zonas.

Noreste

Esta semana se registraron lluvias más intensas —que localmente superaron las 2 pulgadas— en el sur de la región del Noreste y en partes del este de Massachusetts. En ambas zonas, la mejora en los caudales fluviales y en la humedad del suelo, sumada a una reducción de los déficits de precipitación a corto plazo, contribuyó a una mejora localizada de las condiciones, especialmente en Virginia Occidental, Nueva Jersey, el sur de Pensilvania y sectores de Maryland y Delaware. En el este de Maine aumentaron los déficits de lluvia a corto plazo y disminuyeron los caudales fluviales, lo que provocó una ligera expansión de las condiciones de sequedad anómala; no obstante, esta semana no se registraron expansiones ni nuevas áreas de sequía en el Noreste. Las temperaturas en la región mostraron anomalías de entre 3 y 6 grados por encima de lo normal en el oeste de Pensilvania, mientras que en el resto de la zona se mantuvieron, en su mayoría, dentro de un margen de 3 grados respecto a los valores habituales.

Sureste

Esta semana se registraron lluvias generalizadas, de moderadas a intensas, en partes de la región sureste, especialmente en Virginia y las Carolinas. A pesar de que las temperaturas se mantuvieron entre 3 y 6 grados por encima de lo normal en el este de las Carolinas y el

sureste de Georgia, las lluvias localmente intensas y los acumulados moderados generalizados contribuyeron mayormente a mejorar la situación o a frenar el agravamiento de la sequía existente. En zonas aisladas del centro de Virginia y del centro-sur de Carolina del Norte se observó una expansión de la sequía extrema; allí, los déficits de precipitación acumulados en seis meses siguieron aumentando, mientras que la humedad del suelo y los caudales fluviales descendieron aún más por debajo de los niveles normales. Por lo demás, se produjeron mejoras generalizadas en Carolina del Norte y Virginia, así como en puntos aislados de Carolina del Sur, Georgia y el Panhandle de Florida. Las precipitaciones recientes, especialmente las de esta semana, ayudaron a mitigar los déficits de lluvia a corto plazo que comenzaban a acumularse en zonas ya afectadas por sequía a largo plazo o condiciones de sequedad anómala. Asimismo, estas lluvias incrementaron la humedad del suelo y los caudales fluviales en muchas áreas.

Sur

Esta semana se registraron precipitaciones en gran parte de Tennessee, zonas del norte de Alabama, gran parte del centro-sur y oeste de Luisiana, y sectores del este y centro-sur de Texas. Las lluvias más intensas superaron las 5 pulgadas en partes de Texas y Luisiana, mientras que en algunas zonas de Tennessee se acumularon entre 2 y 5 pulgadas. Las temperaturas en la región se mantuvieron, en su mayoría, dentro de un margen de 3 grados respecto a lo normal, salvo en el sur del Panhandle de Texas y el oeste del norte de Texas, donde superaron los valores habituales entre 3 y 6 grados. Por el contrario, se registraron temperaturas entre 3 y 6 grados por debajo de lo normal a lo largo del río Grande, cerca de Del Río, Texas. Desde el este de Texas hasta el sur de Luisiana, así como en Tennessee y el extremo noreste de Arkansas, las lluvias de esta semana redujeron o eliminaron localmente los déficits de precipitación, favoreciendo la mejora de la humedad del suelo y de los caudales fluviales. Asimismo, se reevaluaron y mejoraron las condiciones en partes del oeste y suroeste de Texas, zonas adyacentes del oeste de Oklahoma y el Panhandle de Oklahoma, así como en sectores del oeste y norte de Arkansas; en estas áreas, las precipitaciones recientes han mitigado los déficits de lluvia a medio plazo y han mejorado localmente los caudales y la humedad del suelo.

Medio Oeste

Fuertes lluvias azotaron la zona que se extiende desde el sur de St. Louis (en el sureste de Missouri y el sur de Illinois) hasta gran parte de Kentucky. Las precipitaciones intensas —que superaron las 5 pulgadas en una amplia extensión— provocaron inundaciones repentinas en algunas áreas al sur de St. Louis. No obstante, estas lluvias también redujeron o eliminaron el déficit de precipitaciones en muchas zonas del sureste de Missouri, el sur de Illinois y Kentucky, lo que resultó en una mejora generalizada según el Monitor de Sequía de esta semana. Es posible que se produzcan más mejoras en las próximas semanas a medida que se analice más a fondo el impacto de estas lluvias en el ciclo hidrológico. Por ahora, las pocas zonas que aún presentan sequía en Missouri y en el centro-sur de Kentucky corresponden a sequías de larga duración, aunque esta semana persistieron algunos efectos a corto plazo

cerca de la frontera entre Kentucky y Virginia. Más al norte predominó el tiempo seco, salvo algunas excepciones. En el centro-norte de Iowa se registraron lluvias más intensas, de entre 2 y 4 pulgadas, lo que permitió mejoras localizadas frente a la sequía moderada y la sequedad anómala existentes. Una franja estrecha del centro de Minnesota recibió precipitaciones de 2 pulgadas, cantidad insuficiente para mejorar las condiciones de sequedad general en la región. Por último, las lluvias más abundantes en la península de Keweenaw (en la península superior de Michigan) mitigaron el déficit de precipitaciones a corto plazo y eliminaron la condición de sequedad anómala en la zona.

En el norte de Minnesota y Wisconsin, así como en el extremo occidental de la Península Superior de Michigan, se intensificaron los déficits de precipitación a corto plazo en un contexto de disminución de la humedad del suelo y del caudal de los ríos; esto provocó la aparición o expansión generalizada de condiciones de sequedad anómala y sequía moderada, además de un ligero aumento de las zonas afectadas por sequía severa en el norte de Minnesota. Gran parte de la mitad sur de la región del Medio Oeste registró temperaturas dentro de un margen de 3 grados respecto a lo habitual, salvo algunas excepciones locales. En Minnesota, el norte de Wisconsin y el norte de Michigan, las temperaturas superaron los valores normales entre 3 y 6 grados, llegando a estar entre 6 y 9 grados por encima de lo habitual en la mayor parte del norte de Minnesota. Coincidiendo con este tiempo mayoritariamente cálido y seco, también se produjeron incendios esta semana en el noreste de Minnesota. Asimismo, surgieron focos aislados de sequía moderada en el este de Wisconsin, donde la falta de precipitaciones a corto plazo generó condiciones similares a las observadas más al norte, aunque de forma menos generalizada. En el oeste de Iowa, aumentaron los déficits de precipitación a corto plazo y descendieron los niveles de humedad del suelo, lo que dio lugar a una expansión de la sequía moderada.

Altas Llanuras

Esta semana se registraron precipitaciones superiores a 2 pulgadas en el noreste de Dakota del Sur y en una franja que se extiende desde partes del centro-sur de Nebraska hacia el sureste, abarcando zonas del noreste de Kansas. Se produjeron lluvias intensas y dispersas —con acumulaciones locales de entre 1,5 y 2 pulgadas— en el este de Colorado, el oeste de Kansas, el oeste de Nebraska y el suroeste de Dakota del Sur, así como en algunas áreas de Dakota del Norte. Estas lluvias propiciaron mejoras localizadas en el este de Colorado, el oeste de Kansas y el oeste de Nebraska, donde aumentó la humedad del suelo y disminuyó la gravedad del déficit de precipitaciones. Se observó una mejora generalizada respecto a la sequía y las condiciones de sequedad anómala en el noreste de Dakota del Sur, zona donde se registraron las lluvias más intensas. En el este de Dakota del Norte, la combinación de déficits de precipitación a corto plazo y una menor humedad del suelo provocó una expansión generalizada de la sequedad anómala, así como la aparición de una pequeña zona con sequía moderada. En algunas áreas del centro-norte y noroeste de Dakota del Sur se registraron ciertos deterioros en las condiciones, debido a la presencia de déficits de precipitación a corto y medio plazo y a bajos niveles de humedad en el suelo. Las temperaturas en la parte norte de la región de las High Plains (Grandes Llanuras Altas) —especialmente desde el noroeste de Nebraska hacia el norte— se situaron entre 3 y 9 grados por encima de lo normal esta

semana, coincidiendo con la llegada de una ola de calor. Los efectos de este calor y del clima localmente más seco se evaluarán en las próximas semanas.

Oeste

A excepción de cierta humedad en el sureste de Arizona derivada del monzón de América del Norte, esta semana predominó el tiempo seco en el Oeste, al oeste de la Divisoria Continental. En el sureste de Arizona se registraron precipitaciones de entre 1 y 2 pulgadas, aunque estas cantidades fueron insuficientes para mejorar las condiciones. En el sureste de Nuevo México se reevaluaron las condiciones, junto con las del oeste de Texas, lo que dio lugar a mejoras localizadas en zonas donde la humedad del suelo, el caudal de los arroyos y los déficits de precipitación a medio plazo habían mejorado recientemente. También se produjeron mejoras localizadas en partes de Utah, donde disminuyeron los déficits de precipitación a corto plazo. No obstante, persistía una sequía generalizada de gravedad severa y extrema en la mayor parte del estado, acompañada de caudales fluviales deficientes en todo Utah. En el este de Washington, los déficits de precipitación a corto y medio plazo, las recientes temperaturas cálidas y la escasa humedad del suelo provocaron la expansión de la sequía moderada. Asimismo, surgieron o se intensificaron condiciones de sequía moderada y severa en otras zonas del estado, donde persistieron los déficits de precipitación y disminuyeron tanto la humedad del suelo como el caudal de los arroyos. Se registraron temperaturas elevadas desde Arizona y el oeste de Nuevo México hacia el norte, hasta Montana y Wyoming. Durante la semana, las temperaturas superaron los valores normales entre 3 y 6 grados en la mayor parte de estas áreas, mientras que en el noreste de Wyoming y en el centro-sur y este de Montana estuvieron entre 6 y 12 grados por encima de lo habitual. Varias ciudades del sur y este de Montana alcanzaron temperaturas máximas históricas el domingo 12 de julio, incluyendo registros de 115 °F en Miles City y 111 °F en Billings. En las próximas semanas se evaluará el impacto de esta ola de calor en las condiciones de sequía existentes. A lo largo de la costa del Pacífico, las temperaturas se mantuvieron, por lo general, dentro de un margen de 3 grados respecto a los valores normales.

Caribe

Se observaron mejoras leves en las zonas afectadas por sequía moderada y condiciones de sequedad anómala en el centro-norte y noroeste de Puerto Rico, después de que las lluvias más intensas de esta semana mitigaran algunos déficits de precipitación a corto plazo. En otras áreas persistieron condiciones muy secas, y la sequía severa a corto plazo se intensificó en el centro-sur de la isla. Los impactos de la sequía reportados recientemente en las zonas del sur de Puerto Rico incluyen incendios de vegetación, descenso en los niveles de los pozos y racionamiento de agua. Los caudales de los ríos se encuentran en niveles muy bajos en la mayor parte de Puerto Rico. A excepción de las áreas que experimentaron mejoras esta semana, la mayor parte de la isla registró nuevamente precipitaciones por debajo de lo normal. Las temperaturas estuvieron entre 1 y 3 grados por encima de lo habitual en la mayor parte del territorio.

Una onda tropical débil atravesó el este del Caribe al inicio de la semana (miércoles 8 de julio – martes 14 de julio de 2026). Sin embargo, la mayor parte de la humedad tropical se mantuvo muy al sur de las islas, y se estableció un patrón meteorológico más seco de lo habitual, acompañado de un aumento en la presencia de polvo del Sahara. Al reducirse la cobertura de las precipitaciones, las principales preocupaciones meteorológicas pasaron a ser el calor peligroso, el riesgo de incendio de elevado a crítico, los vientos alisios del este (de moderados a fuertes) y los cielos brumosos con reducciones ocasionales en la visibilidad y la calidad del aire. Las condiciones propicias para incendios en las Islas Vírgenes de los EE. UU. son más marcadas en St. Croix, donde persisten el déficit de precipitaciones, la vegetación extremadamente seca y los valores elevados del índice de sequía Keetch-Byram (KBDI). Se espera que continúen las temperaturas nocturnas cálidas, ya que el polvo del Sahara limita el enfriamiento radiativo.

Esta semana se ha agravado la clasificación de la sequía en las tres Islas Vírgenes de los EE. UU., pasando de sequía severa (D2-S) a sequía extrema (D3-S), debido al empeoramiento de los déficits de precipitación, el descenso generalizado de los niveles de agua en pozos, los valores cada vez más negativos del SPI (Índice de Precipitación Estandarizada) a corto plazo, las temperaturas cercanas a niveles récord o que los han superado, la grave reducción de la humedad del suelo y el aumento general del riesgo de incendios. Entre los impactos observados figuran la falta de agua para llenar las cisternas, el estrés de la vegetación, el aumento de los incendios de pastizales y la probable escasez de agua para fines agrícolas.

Las estimaciones cuantitativas de precipitación basadas en satélite de NASA-SPoRT para la semana que finalizó el 14 de julio a las 12z indicaron acumulaciones de lluvia ligeras (menos de 0,50 pulgadas). Las siguientes mediciones de precipitación de CoCoRaHS corresponden a St. Croix y son válidas para un período de 7 días, salvo que se indique lo contrario. Las mediciones oscilaron entre una cantidad insignificante (*trace*) en el Aeropuerto Rohlsen (#11624, 6 días de datos) y 0,45 pulgadas en VI-SC-25 (Christiansted 4,4). Las cantidades de lluvia intermedias, en orden ascendente, incluyen: 0,07 pulgadas en VI-SC-20 (Frederiksted 1,7 ESE), 0,15 pulgadas en VI-SC-30 (Christiansted 1,7 SO, 6 días de datos), 0,16 pulgadas en East Hill (#672560), 0,27 pulgadas en VI-SC-29 (Frederiksted 2,5 NNE), 0,28 pulgadas en VI-SC-23 (Christiansted 6,5 O), 0,31 pulgadas en VI-SC-10 (Christiansted 1,6 E, 6 días) y 0,44 pulgadas de precipitación en VI-SC-34 (Frederiksted 1,9 NE). Los valores más recientes del SPI en el Aeropuerto Rohlsen son -3,35, -1,83 y -2,04 (correspondientes a 1, 3 y 6 meses, respectivamente), y reflejan los graves déficits de precipitación que se están acumulando. En East Hill, aunque la situación no es tan severa a corto plazo como en el Aeropuerto Rohlsen, los valores del SPI siguen siendo significativos: -1,28, -1,43, -0,30, -0,96 y -0,38 (correspondientes a 1, 3, 6, 9 y 12 meses, respectivamente). El gráfico del USGS sobre la profundidad del agua en el pozo Adventure 28 muestra que los niveles del agua descendieron durante la semana pasada, pasando de un máximo de 23,49 pies bajo la superficie del terreno a un mínimo de 24,06 pies.

En la isla de St. John, se registró una precipitación de 0,03 pulgadas en la estación VI-SJ-10 (Cruz Bay 3.1 NNW), donde un observador reportó condiciones de mucho calor en Fish Bay, en la costa sur de la isla. Incluso a 10 pies de profundidad, la tierra estaba «...como polvo». En este lugar, el total de precipitaciones de junio fue de solo 0,21 pulgadas y, en lo que va de julio,

se han registrado apenas 0,06 pulgadas. En Windswept Beach (VI-SJ-3), cayeron 0,12 pulgadas de lluvia esta semana; el total de junio fue de solo 0,23 pulgadas y, hasta ahora en julio, la precipitación ha sido de 0,15 pulgadas. Los valores del SPI en Windswept Beach para los periodos de 1, 3, 6, 9 y 12 meses (respectivamente) reflejan el deterioro de las condiciones de humedad, con cifras de -2,03, -1,69, -0,31, -1,22 y -0,23. En East End (#672551) no se dispuso de datos de precipitación ni de valores SPI esta semana. El gráfico del USGS sobre la profundidad del agua en el pozo Susannaberg Dpw-3 muestra que los niveles del agua descendieron durante la última semana, pasando de un máximo de 16,42 pies bajo la superficie del suelo a un mínimo de 16,74 pies.

En St. Thomas, la estación King Airport (n.º 11640) registró una cantidad insignificante de precipitación (con datos de 6 días); los valores disponibles del índice SPI para los plazos de 1, 3, 6 y 9 meses fueron de -2,73, -2,78, -0,51 y -1,25, respectivamente, lo que pone de relieve el rápido deterioro de las condiciones en la isla. La estación VI-ST-15 (Charlotte Amalie West 1.3 N) reportó 0,06 pulgadas de lluvia esta semana, aunque solo se disponía de datos de 3 días. El gráfico de profundidad del agua del pozo del USGS «Grade School 3» mostró que el nivel freático descendió inicialmente de 9,90 pies el 8 de julio a 10,27 pies el 9 de julio, para luego subir gradualmente hasta situarse a 9,77 pies por debajo de la superficie del terreno al finalizar el periodo (14 de julio).

Pacífico

Tras las lluvias recientes, desapareció la sequía moderada a corto plazo en el noroeste de Alaska y disminuyó el área afectada por condiciones de sequedad anómala en las cercanías. Surgieron condiciones de sequedad anómala en el noreste del interior de Alaska, donde predominaron condiciones cálidas y secas durante la semana. Las anomalías de precipitación variaron en todo el estado; sin embargo, se registraron precipitaciones superiores a lo normal en el área de Anchorage, lo que permitió eliminar la clasificación de sequedad anómala en dicha zona. En el centro-norte de Alaska, las temperaturas estuvieron mayormente entre 3 y 9 grados por encima de lo normal, mientras que en el resto del estado se mantuvieron, en su mayoría, dentro de un margen de 3 grados respecto a la media o entre 3 y 6 grados por debajo de lo normal.

Esta semana, las temperaturas en Hawái se mantuvieron mayormente dentro de un margen de un par de grados respecto a lo habitual, aunque tendieron a ser más cálidas de lo normal en Oahu y la Isla Grande. Las zonas de barlovento de las islas hawaianas registraron nuevamente precipitaciones superiores a la media en algunos puntos, mientras que las vertientes de sotavento continuaron siendo más secas. Aún no se han producido condiciones de sequía en estas áreas, dado que marzo fue un mes bastante lluvioso en gran parte del estado. No obstante, se extendió la sequedad anómala en las zonas de sotavento de la Isla Grande, en el centro de Maui y en las laderas bajas de sotavento del oeste de Maui, y surgió también en algunas áreas de sotavento de Molokai.

Al comienzo de la semana de sequía (del miércoles 8 al martes 14 de julio de 2026), el sistema Invest 97W se encontraba al sur de Pohnpei, desplazándose hacia el oeste-noroeste. Durante el fin de semana, Guam registró un aumento en la cobertura de chubascos y

extendiendo chubascos y tormentas hacia Palaos y Yap. En el lado sur de 97W, un flujo del suroeste inició un incremento de la actividad monzónica en partes del Pacífico Norte occidental; sin embargo, este fue ligeramente más débil y se desplazó más al norte de lo previsto. Esto resultó en una reducción de las precipitaciones y de las probabilidades de tormentas eléctricas para Guam y la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte (CNMI) hacia el final de la semana de sequía. Mientras tanto, una perturbación débil (designada brevemente como 98W) atravesó la República de las Islas Marshall (RMI) y la zona oriental de los Estados Federados de Micronesia (FSM) al final del periodo. Al sur del ecuador, una vaguada situada sobre y al noreste de Samoa Americana provocó chubascos generalizados en todo el territorio a principios de la semana de sequía. No obstante, la cizalladura del viento en los niveles medios y altos limitó la convección profunda, dando lugar a zonas de lluvia ligera y llovizna. Se formó un sistema de alta presión en superficie cerca de Nueva Zelanda, lo que hizo que los vientos en Samoa Americana soplaran desde el sur durante el fin de semana. Para el lunes 13 de julio, se establecieron los vientos alisios del sureste, con algunos chubascos aislados dentro de dicho flujo. El oleaje proveniente del sur y sureste contribuyó a elevar el nivel del mar, generando un oleaje peligroso, fuertes corrientes de resaca y mareas excepcionalmente altas (*king tides*).

Las estimaciones de precipitación basadas en datos satelitales de la NASA SPoRT para la semana que finalizó el 14 de julio a las 12:00 UTC revelaron una región notable y coherente con acumulaciones de lluvia de 1 a 4 pulgadas situada bastante al oeste de las CNMI; asimismo, se observó otra área —aunque de configuración más irregular— con precipitaciones de 1 a 4 pulgadas sobre las RMI y la zona oriental de Micronesia. En el resto de la región, las cantidades de precipitación fueron mayoritariamente inferiores a 1 pulgada. Según las imágenes de SPoRT, el total de lluvia registrada en Samoa Americana fue inferior a 0,75 pulgadas.

La región de las USAPI permanece libre de sequedad anómala y sequía esta semana.

En Guam y partes de la CNMI, la menor cantidad de mediciones de pluviómetros esta semana probablemente siga relacionada con los efectos devastadores del reciente supertifón Bavi. Las siguientes mediciones de precipitación corresponden a los últimos 7 días, salvo que se indique lo contrario. En Guam, cayeron 2,37 pulgadas de lluvia durante la semana pasada, alcanzando un total acumulado en julio de 19,15 pulgadas. Estas cantidades superan con creces los mínimos semanales de 1 pulgada y mensuales de 4 pulgadas necesarios para satisfacer la mayoría de las necesidades hídricas. De hecho, el total mensual de 19,15 pulgadas registrado hasta la fecha es casi cinco veces superior al requisito mínimo mensual de agua. Guam también ha superado su requisito mínimo mensual de agua todos los meses desde agosto de 2025. Dededo recibió 2,21 pulgadas de lluvia la semana pasada y ha registrado 19,43 pulgadas en lo que va de julio. La lluvia semanal en Tinian se quedó justo por debajo de la marca de 1 pulgada (0,99 pulgadas) necesaria para cumplir con los requisitos mínimos semanales de agua. Saipán registró 0,60 pulgadas de precipitación esta semana (datos de 6 días). No hubo datos de precipitación para el aeropuerto de Rota esta semana. La cifra de 9,5 pulgadas (datos de xmACIS2) registrada en Agat se consideró inicialmente sospechosa, dado que las zonas circundantes eran mucho más secas. Sin embargo, esta cantidad es

comparable a la registrada en la isla de Yap y en Gilman, más al oeste, lo que sugiere que Agat pudo haber sido afectada por una o varias de las bandas de lluvia en espiral del supertifón Bavi. Por el momento, el valor de 9,5 pulgadas se considera preliminar.

La República de Palaos registró precipitaciones abundantes durante la semana pasada, a pesar de las condiciones de sequía. Koror recibió 2,18 pulgadas de lluvia (datos correspondientes a 6 días, pero que aun así cumplen con el requisito mínimo semanal de 2 pulgadas), y el total de precipitaciones de junio fue de 13,51 pulgadas (muy por encima del mínimo requerido de 8 pulgadas). En lo que va de julio, Koror ha recibido 4,79 pulgadas de lluvia, lo que representa el 68 % de lo habitual. La oficina meteorológica WSO de Palaos (en Airai) registró 1,79 pulgadas de lluvia la semana pasada y 13,78 pulgadas durante el mes de junio. El total de precipitaciones acumuladas en julio hasta la fecha es de 5,81 pulgadas.

En los Estados Federados de Micronesia (EFM), los niveles de precipitación oscilaron entre 1,74 pulgadas en Ulithi (la única estación de los EFM que no alcanzó el mínimo semanal de 2 pulgadas) y 10,04 pulgadas (datos de 6 días) en Gilman (en el lado sur de la isla de Yap). En Ulithi se registró una precipitación de 1,94 pulgadas en lo que va de julio, lo que representa el 32,5 % de lo habitual. A continuación, se presentan los niveles intermedios de precipitación en orden ascendente: Chuuk (2,22 pulgadas la semana pasada y 4,34 pulgadas en lo que va de julio, es decir, el 79 % de lo habitual), Kosrae (2,35 pulgadas), Nukuoro (2,87 pulgadas), Woleai (2,88 pulgadas), Lukunoch (3,29 pulgadas, 5 días), Rumung (5,22 pulgadas, 6 días, con un total de 6,10 pulgadas en lo que va de julio), Pohnpei (5,46 pulgadas), Kapingamarangi (5,90 pulgadas, con 7,09 pulgadas en lo que va de julio, es decir, el 124 % de lo habitual), North Fanif (6,28 pulgadas) y la isla de Yap (9,22 pulgadas). La semana pasada, la isla de Yap y Gilman recibieron más de 8 pulgadas de lluvia, cantidad que constituye el requisito mínimo de agua para un mes completo. No se dispuso de datos de Fananu ni de Pingelap esta semana.

Los niveles de precipitación en la República de las Islas Marshall (RMI) oscilaron entre 1,55 pulgadas en Jaluit (5 días) y 7,06 pulgadas en Majuro (6 días). Entre las cantidades de precipitación intermedias se registraron 1,88 pulgadas (5 días) en Ailinglaplap, 1,95 pulgadas en Utirik, 2,12 pulgadas en Wotje, 3,79 pulgadas en Kwajalein y 5,95 pulgadas en Mili. Esta semana, las tres estaciones que no alcanzaron la marca de 2 pulgadas (el umbral mínimo de precipitación para satisfacer la mayoría de las necesidades de agua) fueron Jaluit, Ailinglaplap y Utirik.

Al sur del ecuador, Samoa Americana informó 1,83 pulgadas de lluvia en Siufaga Ridge, 2,11 pulgadas en Toa Ridge y 2,46 pulgadas (4 días) en el aeropuerto de Pago Pago.

Mirando hacia el futuro

El Centro de Predicción Meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional pronostica condiciones mayormente secas en gran parte de las Grandes Llanuras y el Medio Oeste hasta la noche del lunes 14 de julio. Se prevén lluvias más intensas —con acumulaciones que localmente oscilarán entre 2 y 5 pulgadas en partes de Arizona— en zonas del centro-sur y suroeste de Texas, así como en una franja que se extiende desde Arizona y el oeste de Nuevo México hacia el norte, abarcando el suroeste de Colorado, partes de Utah y sectores de

Wyoming y del extremo centro-sur de Montana. Se pronostican lluvias intensas de 1 a 2 pulgadas en la región de "Big Bend" de Florida, aunque se espera que los mayores volúmenes de precipitación permanezcan principalmente sobre aguas abiertas. Se prevén acumulaciones de lluvia de 0,75 pulgadas o más desde el sur de los montes Apalaches hasta el noreste del país, así como en partes de la costa de Carolina del Norte. También se pronostican lluvias de 0,75 pulgadas o más en la Península Superior de Michigan y en el norte de la Península Inferior de Michigan. Por último, se prevén condiciones mayormente secas a lo largo de la costa oeste.

De cara al periodo del 21 al 25 de julio, el pronóstico del Centro de Predicción Climática del Servicio Meteorológico Nacional apunta a condiciones más húmedas de lo habitual en partes del suroeste de Estados Unidos, especialmente en Arizona, Nuevo México, Utah y Colorado. Asimismo, se prevén precipitaciones superiores a la media en una franja que va desde el sureste de California hasta Montana por el norte, y desde el Panhandle de Texas hasta Dakota del Norte, aunque con un menor grado de certeza que en los estados de la región de las "Cuatro Esquinas" (Four Corners). Se anticipan precipitaciones por encima de lo normal en la mayor parte del este de Estados Unidos —al este de los montes Apalaches—, a excepción del sur de Florida, donde se esperan niveles de lluvia cercanos a la media. En el extremo sur de Texas, existe una ligera probabilidad de precipitaciones inferiores a lo normal. Se prevén temperaturas superiores a la media en el oeste del país (salvo en algunas zonas de Arizona y Nuevo México) y en las regiones del Sur y el Sureste. El pronóstico indica temperaturas cercanas a lo normal en el norte de las Grandes Llanuras, mientras que es más probable que se registren temperaturas más frescas de lo habitual en la zona alta del Medio Oeste, la región de los Grandes Lagos y el Noreste.

Para el periodo del 21 al 25 de julio, se prevén precipitaciones superiores a lo normal en toda Alaska, excepto en la región sureste del estado, donde es más probable que las precipitaciones sean inferiores a lo normal. Se esperan temperaturas superiores a lo normal en el sureste de Alaska y en el extremo oriental del interior del estado. En las zonas centro-sur y suroeste de Alaska, el pronóstico apunta a condiciones más frescas de lo habitual. En Hawái, se prevén tanto precipitaciones como temperaturas por encima de lo normal.

Autor(s)

Curtis Riganti, National Drought Mitigation Center

Anthony Artusa, NOAA/NWS/NCEP/CPC