

Resumen nacional de sequía para 21 julio, 2026

Resumen

Esta semana, el Monitor de Sequía de EE. UU. (USDM) mostró un deterioro en las áreas de las Grandes Llanuras, el Alto Medio Oeste y Florida, mientras que las lluvias de la semana pasada propiciaron mejoras en las áreas afectadas por la sequía en el Sur, el Sureste, el Atlántico Medio y el Noreste. En el Oeste, se observó una combinación de mejoras y deterioros en el mapa, con mejoras en áreas de Idaho y Montana como respuesta a las lluvias superiores a lo normal durante los últimos 30 días. Por el contrario, áreas del este de Colorado y el sureste de Wyoming experimentaron un deterioro como respuesta a las condiciones secas, el calor excesivo y la elevada demanda de evaporación. Asimismo, prevalecieron condiciones cálidas y secas en las Grandes Llanuras centrales y del norte, lo que provocó la expansión e intensificación de la sequía, con temperaturas que oscilaron entre 2 y más de 10 °F por encima de lo normal e informes de malas condiciones en los pastizales. En el sur, otra ronda de fuertes lluvias en la región montañosa de Texas propició una mejora continua en la sequía prolongada, así como graves inundaciones repentinas, con acumulaciones generalizadas de lluvia que oscilaron entre 5 y 10 pulgadas y áreas aisladas que recibieron totales superiores a 15 pulgadas durante la semana pasada. En el sureste y la región del Atlántico Medio, lluvias aisladas propiciaron mejoras en las áreas afectadas por la sequía en Florida, Georgia, las Carolinas y los estados del Atlántico Medio. De manera similar, áreas aisladas del noreste recibieron fuertes acumulaciones de lluvia que oscilaron entre 2 y más de 5 pulgadas, lo que generó mejoras en Nueva Jersey, Nueva York, Connecticut y Massachusetts.

En cuanto al almacenamiento en embalses en el Oeste, los embalses de California siguen estando en o por encima de los promedios históricos para la fecha (21 de julio), con los dos embalses más grandes del estado, el lago Shasta y el lago Oroville, al 110 % y al 100 % del promedio, respectivamente. En el Suroeste, la Oficina de Recuperación de los Estados Unidos informa (19 de julio) que el lago Powell está al 22 % de su capacidad (34 % del promedio para la fecha; el nivel más bajo registrado para la fecha en los últimos 30 años), el lago Mead al 27 % de su capacidad (45 % del promedio para la fecha; el nivel más bajo registrado para la fecha en los últimos 30 años) y el sistema total del río Colorado (19 de julio) al 33 % de su capacidad (en comparación con el 39 % de la capacidad en la misma fecha del año pasado).

Noreste

Esta semana, se registraron mejoras aisladas en áreas de Delaware, Maryland, Virginia Occidental, Pensilvania, Nueva Jersey, Nueva York, Connecticut y Massachusetts, como consecuencia de las lluvias y la mejora general de las condiciones, principalmente en el extremo sur de la región, observada durante los últimos 30 días. Las precipitaciones acumuladas esta semana oscilaron entre 2,5 y 5 cm, con acumulaciones que superaron los 12,5 cm en áreas aisladas. Las lluvias recientes han contribuido a elevar los niveles de agua subterránea y el caudal de los arroyos, así como la humedad del suelo. Durante la semana, las temperaturas se mantuvieron cerca de lo normal o ligeramente por encima de lo normal en

el extremo sur de la región, mientras que gran parte de Nueva Inglaterra experimentó temperaturas por debajo de lo normal, con desviaciones negativas que oscilaron entre -1 y 2 °C.

Sureste

Durante la semana pasada, se observaron acumulaciones aisladas de lluvia de ligeras a moderadas (de 2.5 a 12.5 cm) en gran parte de la región, con las mayores acumulaciones a lo largo de las zonas costeras del Golfo en el centro-oeste y el Panhandle de Florida, y las zonas costeras del noreste de Carolina del Norte. Se observaron mejoras en las zonas afectadas por la sequía en todos los estados de la región. Por el contrario, se produjeron algunos deterioros menores en áreas de Florida donde existe un déficit de precipitación a largo plazo y que no recibieron las lluvias de esta semana. En toda Florida, numerosos incendios forestales continúan activos en todo el estado, incluido el incendio de Berger en el Área de Manejo de Vida Silvestre de Rotenberger, en el centro-sur de Florida, que ha quemado 6.700 hectáreas desde que comenzó el 17 de julio. Además, otros impactos de la sequía en el sur de Florida incluyen niveles de agua extremadamente bajos en las partes occidentales de los Everglades. Según datos de la herramienta Perspectivas Climáticas del Centro Climático Regional del Sudeste, el último mes ha sido muy seco en diversas zonas de la región, registrándose niveles de sequía casi récord en los siguientes lugares: Aeropuerto Internacional de Miami, FL (4.º mes más seco; -4,7 pulgadas de diferencia); Naples, FL (6.º mes más seco; -2,61 pulgadas); North Myrtle Beach, SC (5.º mes más seco; -2,4 pulgadas); Fayetteville, NC (9.º mes más seco; -3,2 pulgadas); y Mobile, AL (2.º mes más seco; -5,12 pulgadas). En cuanto a las temperaturas medias de la semana, se observaron temperaturas superiores a lo normal (entre 1 y 5 °F o más) en la mayor parte de la región, registrándose las mayores diferencias en las Carolinas.

Sur

En el mapa de esta semana, se observaron mejoras en las zonas afectadas por la sequía en Texas, Arkansas y Tennessee. En cuanto a las precipitaciones durante la semana pasada, se registraron acumulaciones de lluvia de moderadas a intensas (entre 5 y más de 15 pulgadas) en la región montañosa de Texas, lo que brindó un alivio muy necesario a la sequía prolongada y a los bajos niveles de los embalses. Sin embargo, las lluvias torrenciales también provocaron inundaciones repentinas graves y peligrosas en varias zonas de la región. Respecto a la situación de los embalses, los datos hídricos de Texas (22 de julio) indican que los embalses estatales se encuentran al 78% de su capacidad, con los embalses del este en buen estado, mientras que numerosos embalses del oeste y del sur permanecen por debajo de lo normal. En Tennessee, las precipitaciones durante los últimos 30 días fueron superiores a lo normal en gran parte del oeste del estado, lo que se reflejó en las mejoras del mapa. Según las clasificaciones climatológicas de los últimos 30 días, se observaron precipitaciones récord o casi récord en algunas zonas de la región, como Junction, TX (el segundo día más lluvioso registrado; +5,44 pulgadas), San Angelo, TX (el noveno día más lluvioso; +2,49 pulgadas), Del Rio, TX (el tercer día más lluvioso; +5,86 pulgadas) y el aeropuerto de

Shreveport, LA (el día más lluvioso; +8,36 pulgadas). Las temperaturas medias de la semana estuvieron por encima de lo normal en la mayor parte de la región (entre 1 y 5 °F).

Medio Oeste

En el mapa de esta semana, se registraron degradaciones en áreas de Minnesota, Iowa, Wisconsin y Michigan en respuesta a temperaturas superiores a lo normal y déficits de precipitación durante el período de 30 días. En otras partes de la región, las condiciones continuaron mejorando en Kentucky, donde la precipitación ha estado muy por encima de lo normal durante el último mes. Al observar las clasificaciones climatológicas para el período de 30 días, numerosas ubicaciones se ubicaron entre sus más húmedas o casi húmedas registradas, incluyendo Paducah, KY (más húmeda registrada; +7.09 pulgadas de diferencia); Aeropuerto Internacional de Louisville, KY (más húmeda registrada; +7.08 pulgadas), Aeropuerto Municipal de Ames (2.º más húmedo; +7.77 pulgadas); y Evansville, IN (5.º más húmedo; +4.37 pulgadas). Las temperaturas fueron cercanas a lo normal en la franja sur de la región, mientras que la extensión norte registró anomalías que oscilaron entre 2 y 6 °F.

Altas Llanuras

En el mapa de esta semana, las condiciones relacionadas con la sequía se deterioraron en toda la región, incluyendo Dakota del Sur y Nebraska, con informes de un rápido deterioro de las condiciones. Las recientes temperaturas inusualmente altas y el deterioro de las condiciones relacionadas con la sequía llevaron al gobernador de Dakota del Sur a emitir una orden ejecutiva de emergencia por sequía la semana pasada. En cuanto a los impactos de la sequía, el sistema de informes de impactos de sequía del Centro Nacional de Mitigación de la Sequía (CMOR) muestra numerosos informes de impacto en Dakota del Sur durante los últimos 30 días. Para la semana, las temperaturas promedio fueron de 4 a más de 10 °F por encima de lo normal en Dakota del Sur y Nebraska. Al observar las clasificaciones climatológicas para el período de los últimos 30 días, varias ubicaciones registraron una sequedad cercana al récord, incluyendo Omaha, NE (3.ª más seca registrada; -3.16 pulgadas); Grand Island, NE (5.ª más seca; -3.05 pulgadas); y la Oficina de Pronóstico del Tiempo del Servicio Meteorológico Nacional de Rapid City, SD (5.ª más seca; -1.48 pulgadas).

Oeste

En el mapa, las condiciones relacionadas con la sequía continuaron deteriorándose en áreas del este de Colorado, el sureste de Wyoming y partes del sur de Idaho, mientras que se hicieron mejoras en el centro y norte de Idaho y Montana donde las condiciones a corto plazo (últimos 30 días) mejoraron. En el suroeste, las tormentas monzónicas trajeron la humedad muy necesaria a áreas aisladas de los estados de las Cuatro Esquinas y el este de Nevada, mientras que las condiciones secas prevalecieron en el oeste de la Gran Cuenca y los estados del Pacífico. En la cuenca del río Colorado, el lago Powell está al 22% de su capacidad, mientras que el lago Mead está al 27% de su capacidad, según la Oficina de Recuperación de los Estados Unidos. Otros embalses en la región están experimentando niveles bajos,

incluidos el embalse Elephant Butte en Nuevo México (2% de su capacidad) y el embalse Blue Mesa en el suroeste de Colorado (32% de su capacidad). Observando las condiciones climatológicas del último mes, se observó precipitación récord o casi récord en las siguientes ubicaciones: Nogales, AZ (tercera más húmeda; +2,43 pulgadas de desviación de lo normal); Wilcox, AZ (séptimo más lluvioso; +2,03 pulgadas); y Aeropuerto de Flagstaff, AZ (décimo más lluvioso; +1,76 pulgadas); Great Falls, MT (más lluvioso registrado; +2,29 pulgadas); Aeropuerto de Glasgow, MT (tercer más lluvioso; +2,88 pulgadas); y Aeropuerto de Challis, ID (más lluvioso registrado; +1,8 pulgadas).

Caribe

En el mapa, no se registraron cambios esta semana en Puerto Rico.

Durante el período de monitoreo de la sequía que finalizó el 21 de julio, persistió un clima cálido, ventoso y mayormente seco en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. En ocasiones, el polvo del Sahara provocó condiciones de neblina y reducción de la visibilidad. Los valores del Índice de Precipitación Estandarizado (IPE) indicaron en general que existe una sequía extrema a corto plazo (D3-S) en todo el territorio. En St. John, Windswept Beach reportó una precipitación casi récord de 0.23 pulgadas en junio, seguida de 0.22 pulgadas durante los primeros 20 días de julio. El julio más seco registrado en Windswept Beach ocurrió en 2015, con 0.69 pulgadas. Los impactos relacionados con la sequía en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos incluyen un estrés significativo de la vegetación, un mayor riesgo de incendios forestales, la disminución de las reservas de agua superficial y el aumento de la profundidad del agua subterránea. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), la profundidad del agua en el pozo de la agencia en St. John superó los 17 pies el 21 de julio por primera vez desde principios de octubre de 2023. A finales de octubre de 2025, la profundidad del agua en el pozo del USGS en St. John era inferior a 8 pies.

Pacífico

En Alaska, se eliminaron las zonas de sequía anormal (D0) en el interior y el centro-sur, y también se redujeron las zonas D0 en la península de Seward debido a las lluvias de corta duración.

En el mapa, no se registraron cambios esta semana en las islas hawaianas.

El clima generalmente activo continuó en las islas del Pacífico asociadas a Estados Unidos, sin sequía ni sequía en la región. Algunas de las lluvias más significativas acompañaron las crecidas monzónicas en los Estados Federados de Micronesia (EFM), con totales durante el período de monitoreo de sequía que oscilaron entre 4 y 10 pulgadas en partes del estado de Chuuk. En otras partes de los EFM, la precipitación acumulada en Yap en lo que va del mes se acercó a las 17 pulgadas. También continuaron las abundantes lluvias en la República de Palaos, mientras que los esfuerzos de recuperación tras el reciente paso del supertifón Bavi continuaron en las Marianas. Más al este, la República de las Islas Marshall (RIM) experimentó una leve tendencia a la sequía, aunque aún no se observaron preocupaciones al respecto. De hecho, el almacenamiento en el embalse de Majuro superó los 41 millones de galones durante

varios días a mediados de julio, en comparación con los 37,7 millones de galones a principios de mes. La capacidad del embalse de Majuro es de 47,4 millones de galones. Finalmente, en Samoa Americana también prevaleció un clima algo más seco, aunque, al igual que en las Islas Marshall, aún no se han presentado problemas relacionados con la sequía. Además, Samoa Americana ha experimentado recientemente varios meses muy lluviosos, con precipitaciones que alcanzaron los 27,92 pulgadas en el Aeropuerto Internacional de Pago Pago en enero y los 21,55 pulgadas en mayo.

Mirando hacia el futuro

El pronóstico cuantitativo de precipitación a 7 días del Centro de Predicción Meteorológica del NWS indica que las mayores acumulaciones de precipitación se registrarán en partes de los estados del Atlántico Medio, donde se esperan acumulaciones que generalmente oscilan entre 2 y más de 7 pulgadas, con las cantidades más altas principalmente en las llanuras costeras del sur de Virginia y las Carolinas. En áreas del interior del sureste, incluyendo partes del norte de Georgia y el este de Tennessee, se esperan acumulaciones de precipitación que generalmente oscilan entre 1 y más de 3 pulgadas. En áreas aisladas del noreste y las llanuras centrales, se esperan acumulaciones de precipitación que generalmente oscilan entre 1 y 2 pulgadas. En Texas, se esperan acumulaciones de ligeras a moderadas (de 2 a 4 pulgadas) en áreas de las llanuras del sur de Texas. En el oeste, en las elevaciones más altas de áreas de las Montañas Rocosas centrales y meridionales y partes del suroeste, incluyendo el Mogollon Rim de Arizona, se esperan acumulaciones de precipitación localizadas de 1 a más de 2 pulgadas.

El pronóstico de temperaturas a 6-10 días del Servicio Meteorológico Nacional (válido del 27 al 31 de julio de 2026) prevé temperaturas superiores a lo normal en la mayor parte de los Estados Unidos continentales, con las mayores probabilidades concentradas en gran parte de California, la Gran Cuenca, las Montañas Rocosas centrales y meridionales, los estados de las Grandes Llanuras, Texas y las zonas occidentales del Medio Oeste. También se prevén temperaturas superiores a lo normal en gran parte de las regiones Sur y Sureste. Por el contrario, se prevén temperaturas inferiores a lo normal en el Noroeste del Pacífico, en el oeste de Washington, gran parte del Noreste y Alaska, mientras que se esperan temperaturas cercanas a lo normal en algunas zonas del Atlántico Medio.

El pronóstico de precipitaciones del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) para los próximos 6 a 10 días prevé precipitaciones superiores a lo normal en zonas del noroeste del Pacífico (Washington), partes del suroeste y las Montañas Rocosas centrales, y a lo largo de la costa este, desde Florida hasta Maine. Se prevén precipitaciones inferiores a lo normal en las zonas orientales de las Grandes Llanuras centrales y meridionales, Texas, el sur y el medio oeste.

Autor(s)

David Simeral, WRCC/DRI

Brad Rippey, U.S. Department of Agriculture