

Resumen nacional de sequía para 28 julio, 2026

Resumen

Esta semana, el Monitor de Sequía de EE. UU. (USDM) registró condiciones muy calurosas y secas en áreas del oeste de EE. UU. y los estados de las Grandes Llanuras, donde las temperaturas promedio se dispararon muy por encima de los niveles normales, elevando significativamente la demanda de evaporación, especialmente en el Alto Medio Oeste, las Grandes Llanuras del Norte, Colorado y el Panhandle de Texas, donde las condiciones se deterioraron rápidamente. En otras partes, las fuertes lluvias en áreas de los estados del Atlántico Medio, el Sureste y el Sur, llevaron a mejoras generalizadas en el mapa en las áreas afectadas por la sequía. En Carolina del Norte, los totales de lluvia de la semana oscilaron entre 3 y más de 8 pulgadas en todo el estado, lo que condujo a una mejora significativa en las condiciones relacionadas con la sequía en todo el estado. En el Noreste, la actividad de lluvias aisladas recientes ayudó a mejorar las condiciones de sequía; sin embargo, los impactos de la sequía a largo plazo continúan afectando las condiciones de las aguas subterráneas en áreas de Rhode Island y Massachusetts. En el Alto Medio Oeste, la sequía se expandió e intensificó en el mapa, especialmente en Minnesota y Wisconsin, donde los indicadores compuestos de sequía repentina mostraron condiciones de sequía repentina severas a extremas durante la semana pasada. En el oeste, los estados de las Cuatro Esquinas continuaron recibiendo lluvias monzónicas beneficiosas, con áreas aisladas que registraron entre 5 y 10 cm. En partes de Arizona y el oeste de Nuevo México, las precipitaciones durante los últimos 30 días han sido superiores a lo normal, lo que ha incrementado el caudal de los ríos y la humedad del suelo, a la vez que ha mejorado la salud de la vegetación. En el noroeste del Pacífico, la sequía a corto plazo ha provocado una disminución de la humedad del suelo y del caudal de los ríos en áreas del oeste de Oregón y Washington. En la Gran Cuenca, las recientes lluvias monzónicas han proporcionado un alivio menor a las zonas afectadas por la sequía en el este de Nevada.

En cuanto al almacenamiento en embalses en el Oeste, los embalses de California continúan estando en o por encima de los promedios históricos para la fecha (28 de julio), con los dos embalses más grandes del estado, el lago Shasta y el lago Oroville, que experimentaron leves disminuciones durante la última semana, al 99% y 108% del promedio, respectivamente. En el Suroeste, la Oficina de Recuperación de los Estados Unidos informa (26 de julio) que el lago Powell está al 23% de su capacidad (33% del promedio para la fecha; el nivel más bajo registrado para la fecha en los últimos 30 años), el lago Mead al 27% de su capacidad (45% del promedio para la fecha; el nivel más bajo registrado para la fecha en los últimos 30 años) y el sistema total del río Colorado (26 de julio) al 33% de su capacidad (en comparación con el 39% de la capacidad en la misma fecha del año pasado). Según el Salt River Project, el sistema de embalses del río Salt en Arizona se encuentra actualmente al 48% de su capacidad, el sistema del río Verde al 59% y el sistema total de embalses al 50% (en comparación con el 59% de su capacidad hace un año).

Noreste

Las lluvias de esta semana propiciaron mejoras aisladas en áreas de Delaware, Maryland, Virginia Occidental, Nueva Jersey, Nueva York, Connecticut, Rhode Island y Massachusetts. La acumulación de lluvia durante la semana pasada osciló entre 1 y más de 5 pulgadas, registrándose las mayores acumulaciones en áreas aisladas de Delaware y Nueva Jersey. A pesar de las lluvias recientes, persisten problemas a largo plazo con las aguas subterráneas en áreas de Rhode Island y Massachusetts. En Maine, las condiciones se deterioraron, lo que provocó la expansión de áreas de Sequía Moderada (D1) y áreas de Sequía Anormal (D0) debido a la disminución del caudal de los ríos, la elevada demanda de evaporación y las precipitaciones inferiores a lo normal durante los últimos 30 a 60 días. Durante la semana, las temperaturas estuvieron por debajo de lo normal en la mayor parte de la región, con desviaciones negativas que oscilaron entre 2 y más de 6 °F. Según datos de la herramienta Perspectivas Climáticas del Centro Climático Regional del Sudeste, el último mes ha sido muy seco en algunas zonas de Maine, con una sequía casi récord observada en Portland, Maine (el segundo mes más seco registrado; desviación de -2,83 pulgadas).

Sureste

Durante la semana pasada, se observaron acumulaciones de lluvia de ligeras a fuertes (de 1 a 8+ pulgadas) en toda la región, con las mayores acumulaciones en Carolina del Norte y Virginia. En otros lugares, áreas aisladas del norte de Alabama y Georgia, así como Florida, recibieron lluvias beneficiosas que llevaron a mejoras en áreas afectadas por la sequía. Por el contrario, se produjeron algunas degradaciones menores en áreas del Panhandle de Florida, donde la precipitación ha sido <50% de lo normal durante los últimos 30 días y el mapa indicador de condiciones de sequía repentina del Centro Nacional de Mitigación de la Sequía (NDMC) (27 de julio) está mostrando condiciones de sequía repentina severas a moderadas en el Panhandle y el norte de Florida. Según los datos de la herramienta Perspectivas Climáticas del Centro Climático Regional del Sudeste, el mes pasado ha sido muy caluroso en áreas de la región, con temperaturas máximas récord a casi récord observadas en las siguientes ubicaciones: Orlando, FL (más cálido registrado; desviación de +3 °F); Gainesville, FL (más cálido registrado; desviación de +3 °F); West Palm Beach, FL (segundo más cálido; desviación de +3 °F); Jacksonville, FL (segunda más cálida; desviación de +3 °F); y North Myrtle Beach, SC (segunda más cálida; desviación de +2 °F). En cuanto a las temperaturas promedio de la semana, se observaron temperaturas superiores a lo normal (de 1 a 4 °F o más) en Florida y en las zonas meridionales de Alabama, Georgia y Carolina del Sur, mientras que las temperaturas inferiores a lo normal asociadas con la actividad de tormentas de esta semana en Carolina del Norte y Virginia dieron lugar a anomalías negativas que oscilaron entre 2 y 5 °F o más.

Sur

En el mapa de esta semana, se observaron mejoras generalizadas en las zonas afectadas por la sequía en Tennessee, donde las precipitaciones han estado muy por encima de lo normal durante los últimos 30 a 60 días en gran parte del estado. En el sur de Texas, las zonas de sequía se expandieron debido a las condiciones cálidas y secas que han prevalecido durante

los últimos 30 días. En el Panhandle de Texas, la sequía a corto y largo plazo provocó una intensificación de la misma, con déficits de precipitación acumulados en lo que va del año que oscilan entre 3 y más de 8 pulgadas. En cuanto a la situación de los embalses, los datos hídricos de Texas (29 de julio) informan que los embalses estatales se encuentran al 78% de su capacidad, con los embalses del este en buenas condiciones, mientras que numerosos embalses del oeste, norte (Panhandle) y sur permanecen por debajo de lo normal. Según las clasificaciones climatológicas de los últimos 30 días, se observaron temperaturas medias récord o cercanas a récord en varias zonas de la región, incluyendo Brownville, TX (la segunda más cálida registrada; desviación de +2 °F), Amarillo, TX (la octava más cálida; desviación de +3 °F), Gulfport, MS (la cuarta más cálida; desviación de +2 °F) y Jackson, MS (la quinta más cálida; desviación de +2 °F). Las temperaturas medias de la semana estuvieron por encima de lo normal en la mayor parte de la región (entre 1 y más de 10 °F), observándose las mayores anomalías en las zonas del extremo norte de Oklahoma y Texas.

Medio Oeste

En el mapa de esta semana, se realizaron degradaciones generalizadas en el mapa en las partes norte de la región, incluyendo Minnesota, Iowa, Wisconsin e Illinois. En términos de precipitaciones para la semana, gran parte de la región estuvo seca y se observaron temperaturas muy por encima de lo normal en Minnesota con desviaciones de 2 a 8+ °F. Además, el mapa compuesto de sequía repentina del NDMC (27 de julio) mostró condiciones de sequía repentina desarrollándose en áreas del Alto Medio Oeste, incluyendo Minnesota, Wisconsin y Michigan. Al observar las clasificaciones climatológicas para el período de 30 días, numerosas ubicaciones se ubicaron entre sus temperaturas medias más cálidas o cercanas a las más cálidas registradas, incluyendo Hibbing, MN (más cálida registrada; desviación de +6 °F); Aeropuerto de Minneapolis/St. Paul (2.º más cálido; desviación de +5 °F); Dubuque, IA (2.º más cálido; desviación de +5 °F); Eau Claire, WI (2.º más cálido; desviación de +4 °F); y Milwaukee, WI (4.º más cálido; desviación de +3 °F).

Altas Llanuras

Durante la semana, las condiciones relacionadas con la sequía se deterioraron en toda la región, incluyendo Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska y Kansas, donde las temperaturas estuvieron muy por encima de lo normal, especialmente en las zonas occidentales de la región, donde las anomalías oscilaron entre 3 y 9 °F por encima de lo normal. El mapa compuesto de sequía repentina del NDMC (27 de julio) también mostró el desarrollo de condiciones de sequía repentina con numerosos informes de impacto de sequía que llegaron al sistema de informes del Observador de Monitoreo de Condiciones (CMOR) del NDMC durante el período de los últimos 7 días, especialmente en Dakota del Norte en relación con las condiciones de los cultivos y los pastizales. Al observar las clasificaciones climatológicas para el período de los últimos 30 días, numerosas ubicaciones se clasificaron entre sus temperaturas medias más cálidas o cercanas a las más cálidas registradas, incluyendo: Oficina de Pronóstico del Tiempo del NWS de Rapid City, SD (más cálida registrada; desviación de +8 °F); Custer, SD (3.ª más cálida; desviación de +6 °F); Bismarck,

ND (5.^a más cálida; desviación de +5 °F); y Fargo, ND (3.^a más cálida; desviación de +5 °F).

Oeste

En el mapa, las condiciones relacionadas con la sequía empeoraron en áreas del este de Colorado, el este de Nuevo México, el sureste de California y el oeste de Washington. Por el contrario, las beneficiosas lluvias monzónicas propiciaron mejoras en Arizona, el noroeste de Nuevo México, el sureste de Utah y el noreste de Nevada. En el suroeste, un patrón monzónico activo (del 15 de junio hasta la fecha) ha generado precipitaciones superiores a lo normal, especialmente en Arizona, donde los porcentajes de lo normal han oscilado entre el 150 % y el 250 % por encima de lo normal en las zonas sureste, central y norte del estado. Según las estadísticas del monzón de la Oficina de Pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional en Tucson, Arizona, las siguientes localidades de Arizona han recibido precipitaciones superiores a lo normal durante la temporada del monzón: Nogales, Sierra Vista, Wilcox, Ajo, Globe, Apache Junction, Flagstaff, Kingman, Page, Prescott, Show Low y Winslow. En Colorado, la sequía se expandió e intensificó en el mapa en respuesta a temperaturas anómalamente cálidas, la disminución de los niveles de humedad del suelo y la elevada demanda de evaporación. Al observar las clasificaciones climatológicas del último período de 30 días, numerosos lugares se ubicaron entre sus temperaturas medias más cálidas o cercanas a las más cálidas registradas, incluyendo: Montrose, CO (más cálida registrada; diferencia de +3 °F); Dinosaur, CO (más cálida registrada; diferencia de +4 °F); Grand Junction, CO (segunda más cálida; diferencia de +4 °F); Trinidad, CO (segunda más cálida; diferencia de +4 °F); Denver, CO (segunda más cálida; diferencia de +3 °F); Rock Springs, WY (tercera más cálida; diferencia de +4 °F); Casper, WY (tercera más cálida; diferencia de +5 °F); Salt Lake City, UT (quinta más cálida; diferencia de +4 °F); y Pocatello, ID (quinta más cálida; diferencia de +4 °F).

Caribe

En Puerto Rico, la escasez de lluvias durante los últimos 30 a 90 días provocó la expansión e intensificación de la sequía en las zonas sur y noreste de la isla. Entre las consecuencias de la sequía se incluyen el racionamiento de agua para los agricultores del suroeste y noreste, la disminución del caudal de los ríos y el deterioro de los cultivos.

Las Islas Vírgenes de los Estados Unidos permanecieron en sequía extrema (D3-S), a pesar de las lluvias dispersas que localmente acumularon más de media pulgada durante el período de monitoreo de la sequía. Los valores del Índice de Precipitación Estandarizado (IPE) en períodos de hasta 3 meses son indicativos de D3. La sequía, que comenzó a finales de la primavera de 2026 y se ha intensificado rápidamente, ha tenido un profundo efecto en la salud de la vegetación. Otros impactos han incluido un mayor riesgo de incendios forestales, una reducción en los suministros de agua superficial y un aumento en la profundidad del agua subterránea. Por ejemplo, la profundidad del agua en el pozo del Servicio Geológico de los Estados Unidos en St. John superó recientemente los 17.2 pies por primera vez desde principios de octubre de 2023. Las temperaturas crónicamente elevadas han sido un factor que complica la situación, y el Aeropuerto King en St. Thomas experimentó más días

documentados con calor de 95 grados (cuatro) en julio de 2026 que en cualquier otro mes del siglo XXI.

Pacífico

En el mapa, no se realizaron cambios esta semana en Alaska.

En el mapa, no se registraron cambios esta semana en las islas hawaianas.

Todas las islas del Pacífico asociadas a Estados Unidos permanecieron libres de sequía. Al final del período de monitoreo de la sequía, el supertifón Dolphin pasó al norte de la República de las Islas Marshall (RIM), entre el atolón Utirik y la isla Wake. Según informes preliminares, las precipitaciones semanales en la RIM superaron las 6 pulgadas en Mili y oscilaron entre 2 y 4 pulgadas en Majuro, Jaluit y Ailinglaplap. Las lluvias generalizadas en los Estados Federados de Micronesia (EFM) resultaron en totales semanales de más de 8 pulgadas en Pohnpei y más de 4 pulgadas en la laguna de Chuuk. Hasta el 28 de julio, las precipitaciones acumuladas en el mes en los EFM incluyeron 18.96 pulgadas para Yap y 17.02 pulgadas para Chuuk. También continuaron cayendo abundantes lluvias en la República de Palaos. Mientras tanto, a medida que continuaban los esfuerzos de recuperación tras el supertifón Bavi en Guam y la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte, la precipitación acumulada en lo que va del mes en el Aeropuerto Internacional de Guam alcanzó los 20,90 pulgadas, casi el doble del valor normal para el período del 1 al 28 de julio. Finalmente, la actividad de lluvias aumentó en Samoa Americana, donde el Aeropuerto Internacional de Pago Pago recibió 1,23 pulgadas durante el período de monitoreo de la sequía y 6,71 pulgadas durante los primeros 28 días de julio.

Mirando hacia el futuro

El pronóstico cuantitativo de precipitaciones a 5 días del Centro de Predicción Meteorológica del NWS indica fuertes acumulaciones de lluvia en partes de la costa del Golfo, desde el sureste de Luisiana hasta el centro-oeste de Florida, donde se esperan totales de entre 3 y más de 5 pulgadas. En otras áreas del sureste y del Atlántico Medio, se esperan acumulaciones más ligeras, generalmente de entre 1 y más de 2 pulgadas. En el noreste, el medio oeste y las partes orientales de las Grandes Llanuras, se esperan acumulaciones de lluvia de entre 1 y más de 4 pulgadas. En los estados de las Cuatro Esquinas, se pronostican lluvias monzónicas aisladas con acumulaciones de entre 1 y 2 pulgadas, mientras que se esperan condiciones secas en la mayor parte del oeste intermontañoso, la Gran Cuenca y los estados de la costa oeste.

El pronóstico de temperaturas de 6 a 10 días del NWS, válido del 3 al 7 de agosto de 2026, prevé temperaturas superiores a lo normal en la mayor parte de los Estados Unidos continentales, con las mayores probabilidades concentradas en California, la Gran Cuenca, el suroeste desértico y partes de las Montañas Rocosas centrales y meridionales. También se prevén temperaturas superiores a lo normal en las Grandes Llanuras, el Medio Oeste, el Sur, el Sureste y el Noreste. Se prevén temperaturas cercanas a lo normal en partes del Noroeste del Pacífico y la costa central del Golfo. En Alaska, se prevén temperaturas superiores a lo

normal, mientras que se pronostican temperaturas cercanas a lo normal para el suroeste de Alaska y las Islas Aleutianas. En Hawái, también se prevén temperaturas superiores a lo normal.

El pronóstico de precipitaciones del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) para los próximos 6 a 10 días prevé precipitaciones superiores a lo normal en algunas zonas del suroeste, el oeste y sur de Texas, el sur de Florida, el Alto Medio Oeste y el noreste. Se prevén precipitaciones inferiores a lo normal en algunas zonas del noroeste del Pacífico, el norte de las Montañas Rocosas, el norte de la Gran Cuenca y el oeste de los estados de las Grandes Llanuras. En el resto del país, se esperan condiciones cercanas a lo normal. En las islas hawaianas, se prevén precipitaciones superiores a lo normal.

Autor(s)

David Simeral, WRCC/DRI

Brad Rippey, U.S. Department of Agriculture