

Resumen nacional de sequía para 4 agosto, 2026

Resumen

Se registraron lluvias de moderadas a intensas en casi todas las zonas de sequía a lo largo de la costa este, lo que mejoró las condiciones en amplias extensiones de la región. Numerosas localidades sufrieron lluvias torrenciales e inundaciones, pero la sequía en algunas zonas se ha afianzado, lo que limita la mejora observada debido a problemas persistentes como la disminución del suministro de agua, el bajo nivel freático y otras preocupaciones hidrológicas similares.

Las lluvias intensas, incluso excesivas, también cayeron en algunas zonas de sequía más al oeste, desde las Grandes Llanuras centrales y nororientales hacia el este, a través de gran parte de la región de los Grandes Lagos y el valle inferior del río Ohio, lo que provocó una mejoría en algunas zonas. Pero si bien las fuertes lluvias afectaron en general a la costa este y al medio oeste, hubo algunas regiones que no recibieron las cantidades más intensas, lo que dejó las condiciones prácticamente sin cambios o incluso permitió cierto deterioro. Las temperaturas, que promediaron entre 6 y 12 grados Fahrenheit por encima de lo normal en partes del valle superior del río Misisipi y las Grandes Llanuras, junto con una humedad relativa inusualmente baja en gran parte de Dakota del Norte, Dakota del Sur y Nebraska, aceleraron la pérdida de humedad superficial.

Hacia el sur, las fuertes lluvias no fueron tan generalizadas en el valle inferior del Misisipi, la mitad sur de las Grandes Llanuras y la mayor parte de las Grandes Llanuras. Aun así, las lluvias moderadas no fueron infrecuentes en esta zona, y se registraron cantidades aisladas de lluvias intensas que superaron las 2 pulgadas. Por lo tanto, se observó un patrón variable con áreas de deterioro y mejora, y muchos lugares permanecieron prácticamente sin cambios. La precipitación fue marcadamente deficiente desde el sur de Kansas hacia el sur, a través de gran parte de Texas, lo que resultó en amplias áreas de deterioro. La mayoría de estas áreas también fueron más cálidas de lo normal, aunque no faltó humedad. Gran parte del Panhandle de Texas registró un promedio de 6 a 9 grados Fahrenheit por encima de lo normal durante la semana. Otras partes de esta región no fueron tan extremas, pero la mayoría de los lugares aún registraron un promedio algo más cálido de lo normal.

Desde las Montañas Rocosas hacia el oeste, las precipitaciones fueron escasas. Se registraron cantidades moderadas, con totales aislados superiores a 5 cm, asociadas al monzón del suroeste en algunas zonas de Nuevo México y Arizona. En el resto del oeste, se registraron precipitaciones dispersas de entre 2,5 y 2,5 cm en las Montañas Rocosas y el extremo noroeste del Pacífico, pero en la mayoría de los lugares se registraron precipitaciones ligeras como máximo. Llovió muy poco en la región intermontañosa del oeste, la Gran Cuenca, el interior del noroeste del Pacífico y California, a pesar de que esta es una época seca del año para muchas de esas zonas. Las temperaturas estuvieron por encima de lo normal fuera del noroeste del Pacífico.

La sequedad y el calor se intensificaron en la mayor parte de Puerto Rico, registrándose en algunas zonas uno de los julios más secos de la historia. En Hawái y Alaska se observaron nuevas zonas de sequedad anormal, además de una sequía moderada en el extremo sureste

de Alaska.

Noreste

Las lluvias, de moderadas a intensas, empaparon la mayor parte de las áreas previamente afectadas por la sequía, lo que resultó en una mejora generalizada. Se registraron cantidades superiores a media pulgada prácticamente en todas partes, desde el oeste de Maine hacia el sur, hasta Maryland, con totales que superaron las 2 pulgadas en la mayor parte de este tramo. El sur de Nueva Inglaterra y la zona adyacente de Nueva York registraron las mayores cantidades de lluvia. La mayor parte de esta región recibió al menos 3 pulgadas de lluvia, con entre 5 y 8 pulgadas inundando partes del centro de Massachusetts, el centro-norte de Connecticut, el sur de Rhode Island y áreas adyacentes. Como era de esperar, se introdujeron mejoras a lo largo de este corredor, especialmente en el sur de Nueva Inglaterra y sus alrededores. Sin embargo, la sequía moderada se mantuvo en el centro de Massachusetts a pesar de las lluvias torrenciales debido a la continua escasez de agua subterránea y los bajos niveles de los pozos, lo que podría afectar el suministro de agua donde estos son las principales fuentes de abastecimiento. De manera similar, aunque se introdujeron mejoras puntuales, la sequía anormal a severa persiste en la mayor parte de Nueva Jersey a pesar de que grandes áreas recibieron entre 2 y 4 pulgadas de lluvia. El Departamento de Protección Ambiental del estado mantiene al norte de Nueva Jersey en su clasificación de Alerta de Sequía debido a la continua presión sobre las fuentes de suministro de agua. Además, algunas áreas reportaron intensas tasas de lluvia que dejaron caer grandes cantidades de agua en algunas zonas e indujeron algunas inundaciones, pero también mantuvieron los niveles de agua subterránea en niveles desfavorablemente bajos, aunque han mejorado un poco. Por el contrario, las fuertes lluvias no afectaron las áreas más al norte y noroeste, aunque se reportaron totales moderados dispersos. Con el aumento de los déficits de humedad a corto plazo, las condiciones D0 y D1 en Maine se extendieron hacia el norte, y se introdujeron nuevas franjas de D0 en parte del oeste del estado de Nueva York y partes del norte de Vermont. En estas zonas afectadas, los totales de lluvia de 30 días fueron solo del 25 al 50 por ciento de lo normal, y los totales de 90 días fueron de 4 a 8 pulgadas por debajo de lo normal.

Sureste

De forma similar a las zonas más al norte, se registraron lluvias de moderadas a intensas en la mayor parte de la región, especialmente desde el centro de la península de Florida hacia el norte, a través de la mayor parte del Panhandle de Florida, el centro-sur y el centro-este de Georgia, y el centro de Carolina del Sur. La mayoría de los lugares reportaron más de 2 pulgadas de lluvia. Otra franja bastante sólida con cantidades similares se extendió por el centro y el centro-sur de Virginia, además de algunas zonas más pequeñas en la región que incluyeron partes de las Carolinas costeras, el Piedmont y las laderas orientales de los Apalaches a través del sur de Virginia y las Carolinas occidentales, y parte de los Apalaches meridionales. Cantidades excesivas de 5 a localmente 10 pulgadas de lluvia empaparon el noroeste de la península de Florida y las zonas adyacentes en el Panhandle oriental, y hubo

lugares dispersos que registraron más de 5 pulgadas de lluvia dentro de las áreas más amplias con 2 pulgadas o más mencionadas anteriormente. Estas lluvias trajeron mejoras a varias zonas de la región, sobre todo desde el noroeste de la península de Florida hacia el oeste, a través de gran parte del Panhandle, pero, al igual que en algunos lugares de la región noreste, la persistente sequía hizo que las mejoras fueran más moderadas de lo que cabría esperar. Solo unos pocos puntos aislados experimentaron una mejora de dos categorías a pesar de las lluvias torrenciales, y la mayoría de las localidades de Virginia, las Carolinas, Georgia y el sur y el este de Florida permanecen sin cambios con respecto a la semana pasada. A pesar de la semana lluviosa, las precipitaciones de los últimos cuatro meses se sitúan entre 2 y 6 pulgadas por debajo de lo normal en la mayor parte del centro y suroeste de Virginia, el norte de Carolina del Norte, la franja oriental de Carolina del Sur y la zona adyacente de Carolina del Norte, y en muchas localidades dispersas por la península de Florida.

Sur

Lluvias moderadas a fuertes fueron bastante generalizadas en el centro y este de Tennessee y la mitad oriental de Misisipi, aunque cantidades superiores a 2 pulgadas se limitaron principalmente al centro-norte y sureste de Tennessee. Se observaron lluvias ligeras (varias décimas de pulgada) con totales más altos dispersos más al oeste en Arkansas y, en menor medida, en Luisiana. Más al oeste, hubo algunas franjas de lluvia moderada a fuerte en partes del noroeste de Texas, el este de Oklahoma y el centro y suroeste de Texas, pero la mayoría de estos dos estados reportaron lluvia nula o, en el mejor de los casos, unas pocas décimas. Recientemente, un clima muy caluroso ha azotado la parte norte de esta región desde el valle del río Rojo y el Panhandle de Texas hacia el norte. Las temperaturas promediaron 1-3 °F por encima de lo normal en el noreste de Texas, 3-6 °F por encima de lo normal en la mayor parte de Oklahoma y 5-9 °F por encima de lo normal en el Panhandle de Texas. Partes del sur profundo de Texas también fueron más cálidas que sus temperaturas típicas de mediados de verano. La sequía y el calor han acelerado el deterioro en Oklahoma y el norte de Texas, donde en muchas zonas se observan pastos secos, estanques agrícolas y alimentados por arroyos agotados y un mayor riesgo de incendios. En los últimos 30 días, la mayoría de las zonas desde el Panhandle de Texas y el valle del río Rojo hacia el norte recibieron menos de la mitad de la lluvia normal, con las zonas más secas (menos de una cuarta parte de lo normal) abarcando el centro y el este del Panhandle de Texas, el oeste y el norte de Oklahoma, y algunas regiones cercanas al río Rojo. La humedad inferior a lo normal también agravó la situación en el Panhandle de Texas y el oeste de Oklahoma. Como resultado, la degradación por sequía se extendió por la mayor parte de Oklahoma y el norte de Texas, lo que indica una rápida pérdida de humedad superficial. Otras zonas con un deterioro significativo incluyeron el oeste de Texas, el sur profundo de Texas y el oeste de Arkansas. También se registró una sequía anormal en algunos puntos de Luisiana y Misisipi, mientras que las condiciones de sequía más intensas en partes de Arkansas y el Misisipi adyacente permanecieron prácticamente sin cambios. En los últimos 30 días, también se registró menos de la mitad de la lluvia normal en numerosas zonas del oeste y el sur de Texas, Arkansas, el norte y el este de Luisiana, y el centro y el sur de Misisipi. La mejora se limitó a algunas zonas

de las áreas más húmedas del este de Tennessee.

Medio Oeste

Se registraron lluvias de moderadas a intensas en gran parte de la región, con acumulaciones de al menos 0,5 pulgadas en la mayoría de las localidades. Se observaron franjas de lluvias intensas a excesivas (más de 2 pulgadas) en áreas extensas del noroeste y sur de Minnesota, el sur y este de Iowa, el sur de Wisconsin, gran parte del norte de Illinois, el centro de Indiana, partes del oeste de Ohio y lugares aislados en el sur de Kentucky, la Península Superior de Michigan y el centro y norte de Missouri. En general, se observaron totales máximos de precipitación de aproximadamente 5 pulgadas en puntos aislados de las áreas mencionadas, pero cantidades excesivas de 5 a 7 pulgadas fueron más generalizadas en una franja que se extendía desde los condados de Kandiyohi y Chippewa en el interior del sur de Minnesota hacia el sureste a través de partes de los condados de Renville, McLeod, Sibley y Le Sueur. Toda la sequía y la aridez desaparecieron de esta región, y también se introdujeron áreas relativamente amplias de mejora en el noroeste de Minnesota, el sureste de Wisconsin, el norte de Illinois, partes del centro y noroeste de Indiana y el sureste de Kentucky. En marcado contraste, las lluvias más intensas no llegaron a algunas zonas de la región, y en aquellas donde había prevalecido el tiempo seco durante las semanas previas, la sequía se intensificó. Esto incluyó el centro-este y el centro-oeste de Michigan, el norte de Wisconsin, parte del centro y noroeste de Iowa, y las zonas norte y sur de Missouri. En estas localidades se registraron entre el 10 y el 50 por ciento de la lluvia normal durante los últimos 30 días, mientras que los totales de 90 días cercanos o inferiores a la mitad de lo normal se observaron en el norte de Wisconsin, partes del centro y norte de Minnesota, y algunas zonas más al sur en el sur de Michigan, Missouri, Illinois y algunas partes del norte de Indiana y Ohio. Los déficits de 90 días de 4 a 8 pulgadas abarcan gran parte del norte de Wisconsin y el Michigan adyacente, y algunas otras áreas dispersas por la región.

Altas Llanuras

Las condiciones variaron significativamente en la región de las Grandes Llanuras la semana pasada. Se registraron fuertes lluvias de 2 a 5 pulgadas, con cantidades mayores aisladas, en el noreste de Dakota del Sur, gran parte del norte y este de Nebraska y el noreste de Kansas. Se observaron cantidades moderadas a fuertes en otras partes de las secciones orientales y centrales de las Dakotas y Nebraska, el sur, el centro-norte y el centro-este de Kansas, el sureste y las elevaciones más al oeste de Colorado, y zonas del centro y norte de Wyoming y las Dakotas occidentales. En algunas de las zonas más secas de la región, que abarca Dakota del Norte, el centro y oeste de Dakota del Sur y el oeste de Nebraska, un clima inusualmente cálido acompañó las cantidades relativamente bajas de lluvia. Durante los últimos 30 días, estas ubicaciones generalmente promediaron de 4 a 8 grados Fahrenheit por encima de lo normal, con algunos puntos en las Dakotas occidentales y partes adyacentes de Wyoming y Nebraska que reportaron temperaturas promedio de 30 días de 8 a 10 grados Fahrenheit por encima de lo normal. Esto incluyó algunos periodos de calor extremo con temperaturas superiores a 100 °F. Al mismo tiempo, la humedad relativa ha sido inusualmente baja. Muchas

áreas del este de Wyoming, el oeste de Dakota del Sur y la zona adyacente de Nebraska reportaron una humedad relativa promedio de 4 semanas que se encuentra entre el 10 % más seco de las observaciones históricas para ese periodo, y algunos puntos aislados fueron tan secos como el 2 % más bajo de las observaciones históricas. Una humedad relativa menos notable, pero aún consistentemente por debajo de lo normal, ha prevalecido en la mayor parte de la región desde el centro de Dakota del Norte y Nebraska hacia el oeste, junto con la mayor parte de Colorado. La dicotomía de las condiciones entre las zonas este y oeste de la región se refleja en los cambios introducidos en el Monitor de Sequía esta semana. La mayor parte de Dakota del Norte, la mitad occidental de Dakota del Sur y partes del noreste de Wyoming, el oeste de Nebraska y el noreste de Colorado vieron deteriorarse las condiciones, al igual que el sur de Kansas adyacente a Oklahoma. Mientras tanto, el este de Dakota del Sur, el centro y el este de Nebraska, el sureste de Colorado y el oeste de Wyoming registraron áreas considerables de mejora. Se introdujo una nueva zona de sequía de máxima gravedad (D4) en el noroeste de Nebraska y otra en parte del área metropolitana de Denver. Las zonas existentes de D4 permanecieron intactas en el Panhandle de Nebraska, el centro-este de Colorado, el centro-sur y el interior del oeste de Colorado. La mayor parte de Wyoming y Colorado siguen sumidos en la sequía de grado 3 (D3), al igual que las zonas occidentales de Nebraska y Dakota del Sur, junto con algunas localidades dispersas más al sur y al este. Por el contrario, la sequía ha desaparecido por completo de amplias zonas del sureste de Nebraska, el este de Kansas y el centro-este de las Dakotas.

Oeste

Se observaron áreas de lluvia moderada a localmente intensa, impulsadas al menos parcialmente por una circulación monzónica madura, en gran parte del sur y este de Nuevo México, el sureste de Arizona, las elevaciones más altas del centro de Arizona y algunos parches dispersos que se extienden desde el sur de Utah hacia el norte a través del sureste de Idaho, el sur de Montana y el este de Montana. Algunas zonas recibieron cantidades similares en el oeste de Washington. Otras ubicaciones registraron poca o ninguna precipitación, aunque esto no es infrecuente durante el verano en gran parte de California y el Lejano Oeste. Las condiciones en el sureste de Idaho y el sur de Montana se han visto exacerbadas por temperaturas promedio de 6 a 10 °F por encima de lo normal durante los últimos 30 días, incluyendo algunos días de calor intenso. Las temperaturas cercanas o por debajo de lo normal durante este período se limitaron al noroeste del Pacífico, el centro y norte de California y el oeste de Nevada. La humedad relativa ha sido estacionalmente baja durante este período. Las condiciones secas y calurosas no son demasiado inusuales para julio en California, Nevada y el sur de Oregón, con designaciones de sequía sin cambios desde la semana pasada. Más al norte, la falta de nieve acumulada durante el invierno, a pesar de las abundantes precipitaciones, comienza a hacerse notar. La creciente escasez de humedad está provocando deterioros en el este de Washington, el noroeste y el este de Oregón, gran parte del Panhandle de Idaho y algunas zonas del este de Montana. Mientras tanto, las intensas precipitaciones de las últimas semanas, intensificadas por la lluvia de una circulación monzónica avanzada, propiciaron mejoras localizadas en el centro-oeste de Nuevo México, partes del sureste de Arizona y algunas zonas de mayor altitud más al norte del estado, así

como en algunos puntos aislados de Utah.

Caribe

Las condiciones de sequía severa continuaron afectando a Puerto Rico, y solo las zonas noroccidentales del Estado Libre Asociado recibieron suficiente lluvia para aliviar ligeramente la situación en algunas áreas. La sequía ha afectado gravemente a gran parte del Estado Libre Asociado, y cualquier lluvia proporciona, en el mejor de los casos, un alivio localizado y temporal fuera de las secciones noroccidentales. Es posible que pronto sean necesarias interrupciones programadas del servicio de agua para intentar mantener suficiente agua para las actividades esenciales. San Juan registró su julio más seco desde que comenzaron los registros en 1899 (0.54 pulgadas, 9 por ciento de lo normal) y su período junio-julio más seco (2.06 pulgadas, 20 por ciento de lo normal). Mientras tanto, Jajome Alto reportó 3.15 pulgadas (lo normal es 12.37 pulgadas) y Juncos midió 2.20 pulgadas (lo normal es 12.28 pulgadas). Ha sido necesario racionar el agua para la agricultura en algunos distritos de riego del sur, e informes no oficiales indican una disminución del 69 por ciento en la producción de café debido a la sequía, junto con una reducción en los rendimientos de pimientos y frutas. Dos importantes embalses han tenido que realizar ajustes operativos debido a sus bajos niveles de agua, mientras que otros cinco podrían necesitar ajustes similares próximamente. Teniendo en cuenta todos estos factores, esta semana se implementaron algunas mejoras en el noroeste de la isla, pero otras zonas permanecieron sin cambios o empeoraron. Se declaró sequía extrema (D3) en la franja sur del centro y oeste de Puerto Rico, donde los impactos parecen haberse intensificado con mayor rapidez. Además, se extendió la sequía severa (D2) al centro-sur de Puerto Rico, y también desde el centro del Estado Libre Asociado hacia el noreste, conectándose con otra franja de D2 que ya se encuentra en parte del noreste de Puerto Rico.

Esta semana persiste una sequía extrema en todas las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Las estaciones de CoCoRaHS en la isla de St. Croix registraron precipitaciones de entre 0 y 0,09 pulgadas durante la semana. En zonas de la isla de St. John se registraron entre 0,06 y 0,65 pulgadas de lluvia. La estación de Windswept Beach registró 0,51 pulgadas de lluvia. Según los datos de las estaciones de CoCoRaHS, la isla de St. Thomas recibió 0,55 pulgadas de lluvia esta semana. El pozo Adventure 28 registró un nivel de agua de 24,6 pies esta semana; esta cifra es 0,12 pies inferior a la de la semana pasada y 7,57 pies menor que la del año anterior. El pozo Susannaberg DPW 3 registró un nivel de agua de 17,43 pies esta semana, lo que supone un descenso de 0,25 pies respecto a la semana pasada y de 4,57 pies en comparación con el año anterior. El pozo Grade School 3 presenta un nivel de agua de 5,92 pies esta semana; esto es 0,02 pies menos que la semana pasada y 0,42 pies menos que el año anterior. Los valores del Índice de Salud de la Vegetación (VHI) en todas las islas fueron considerablemente más bajos que los del año pasado. Mientras que las islas de St. John y St. Croix registraron valores de VHI en los rangos de 12-24 y 12-48, respectivamente, la isla de St. Thomas presentó valores de VHI entre 36 y 48.

Pacífico

El aumento de las precipitaciones en el noroeste de Alaska eliminó la zona de sequía anormal

que había existido la semana pasada. Sin embargo, más al sureste, se han introducido algunas nuevas zonas de preocupación. Se declaró sequía anormal (D0) en una pequeña parte del centro de Alaska, cerca de Fairbanks, debido a informes de baja humedad superficial. Esto se ejemplificó en el comportamiento del incendio forestal de Tatlanika, que sugiere que la vegetación superficial y la capa de hojarasca están inusualmente secas. Se declaró sequía anormal (D0) en una zona más extensa al sur, en todo el sureste de Alaska, donde las precipitaciones han sido insuficientes en los últimos meses. Tras una reevaluación de las condiciones, se declaró sequía moderada en las islas del suroeste del sureste de Alaska debido a los bajos suministros de agua que han creado una situación de emergencia en Hydaburg, según las operaciones de emergencia de Alaska. También se ha establecido una prohibición de quemas en esta región de Alaska, ya que un incendio forestal que comenzó cerca de Haines ha continuado ardiendo en una zona que, en condiciones normales, es principalmente una selva tropical fría.

En las zonas de sotavento de Hawái, donde las precipitaciones suelen ser escasas en esta época del año, persisten los bajos niveles de lluvia. Aun así, con una pulgada o menos de lluvia registrada en los últimos 30 días, las condiciones D0 se mantienen sin cambios en el noroeste de la Isla Grande, el centro de Maui y el oeste de Molokai. Más al norte y al oeste, se han registrado cantidades de lluvia similares en las zonas de sotavento de Kauai y Oahu, donde se ha introducido la condición D0 (sequedad anormal).

Se registraron lluvias al finalizar julio y comenzar agosto en algunas islas de la República de las Islas Marshall (RMI). Ailingalapalap y Jaluit recibieron un total de 5,23 y 8,26 pulgadas de lluvia, respectivamente, durante esta semana. Algunas localidades experimentaron un final de julio húmedo y un comienzo de agosto seco; Majuro recibió 4,11 pulgadas de lluvia al terminar julio, pero solo 0,99 pulgadas al comenzar agosto. De todas las islas de la RMI, Jaluit fue la que recibió menos precipitaciones esta semana, registrando únicamente 0,9 pulgadas al inicio de agosto. Otras islas, como Mili, Utirik y Wotje, recibieron 3,82, 2,07 y 3,59 pulgadas de lluvia, respectivamente, durante este periodo.

Las precipitaciones fueron irregulares en los Estados Federados de Micronesia (EFM) esta semana. Lugares como la laguna de Chuuk, Kapingamarangi y Pohnpei registraron un total de 4,99, 5,07 y 6,02 pulgadas de lluvia, respectivamente. Sin embargo, otras zonas recibieron mucha menos lluvia durante este periodo; localidades como Kosrae, Nukuoro, Ulithi y Yap registraron únicamente 1,61, 1,64, 1,26 y 0,56 pulgadas, respectivamente. La isla de Lukunor fue la que recibió menos lluvia, con un registro de 0,1 pulgadas de precipitación.

La República de Palaos registró una semana seca. La estación de Koror recibió solo 0,42 pulgadas de lluvia, mientras que la oficina meteorológica (WSO) de Palaos recibió únicamente 0,41 pulgadas durante la semana. Samoa Americana también experimentó una semana más seca; el aeropuerto de Pago Pago recibió solo 0,3 pulgadas de lluvia, y las zonas elevadas de Siufaga y Toa registraron 1,07 y 1,24 pulgadas, respectivamente. Debido a la persistente sequedad observada, Samoa Americana podría sufrir un deterioro de una categoría hacia la condición de «sequedad anómala» la próxima semana si continúa la falta de lluvias.

Las islas Marianas experimentaron el paso de otro tifón a mediados de julio. Además, es posible que la temporada de monzones esté activa. No obstante, Guam ha registrado 1,14

pulgadas de lluvia esta semana. Rota y Tinian han recibido 4,32 y 1,92 pulgadas de lluvia esta semana, respectivamente. El Aeropuerto Internacional de Saipán registró 0,37 pulgadas de lluvia al finalizar julio, mientras que faltaron registros de precipitación para el inicio de agosto. Asimismo, esta semana no se dispuso de registros de precipitaciones para la estación AMME NPS de Saipán.

Mirando hacia el futuro

Durante el 5 al 10 de agosto de 2026, se pronostica una marcada ausencia de lluvias intensas en los Estados Unidos continentales. Se esperan entre 1.5 y 3.0 pulgadas de lluvia en algunas áreas, pero no son extensas e incluyen el centro de Misuri, algunas zonas dispersas a lo largo de los Apalaches desde el oeste de Carolina del Norte hasta el norte del estado de Nueva York, puntos aislados en el suroeste de Wisconsin y el suroeste de Michigan, y partes del centro y centro-oeste de Florida. También son posibles acumulaciones de 1 a 2 pulgadas en el sureste de Arizona, así como en algunas zonas de mayor altitud del estado. Se pronostican cantidades superiores a una pulgada en una amplia franja de Misuri y algunas áreas adyacentes, la región sur de los Grandes Lagos y el valle adyacente del Misisipi, la mayor parte del oeste de Pensilvania, varias áreas en los Apalaches desde el norte de Georgia hasta Virginia Occidental, el centro-este de Pensilvania, partes del norte del estado de Nueva York y el adyacente Vermont, y la mitad sur de la península de Florida. Pequeñas zonas dispersas a lo largo de la costa central y oriental del Golfo de México, el sureste y centro de Arizona, y el norte de Nueva Inglaterra también podrían registrar entre 1 y 1.5 pulgadas. Otras áreas desde el valle del Misisipi hacia el este esperan lluvias ligeras a moderadas, con solo unas décimas de pulgada como máximo en gran parte de los valles del Bajo Misisipi y Tennessee, el sureste de Virginia y la adyacente Carolina del Norte. Más al oeste, se espera que la humedad monzónica provoque lluvias ligeras a moderadas en partes de Arizona y Nuevo México. En el resto de las Grandes Llanuras centrales hacia el oeste, se anticipa poca o ninguna precipitación. La mayor parte del país puede esperar temperaturas cercanas o superiores a lo normal durante este período, especialmente en las Grandes Llanuras hacia el oeste, donde se espera que las localidades fuera del Pacífico Noroeste y la costa oeste inmediata registren temperaturas de 5 a 11 °F por encima de lo normal, con las mayores desviaciones abarcando el sur de Kansas, el Panhandle de Texas y Oklahoma, la mayor parte de Colorado y algunas áreas adyacentes. Se espera que las temperaturas al este del río Misisipi sean más cercanas a lo normal, aunque se espera que algunas áreas registren condiciones algo más cálidas de lo normal. Se espera que las temperaturas promedio sean de 4 a 6 °F por encima de lo normal en Tennessee y el adyacente valle del Bajo Misisipi, en partes de la región del Atlántico Medio y el norte de Nueva Inglaterra.

El pronóstico de 6 a 10 días (del 11 al 15 de agosto de 2026) favorece, al menos marginalmente, precipitaciones superiores a lo normal desde el suroeste, la Gran Cuenca y el oeste intermontañoso hacia el este, hasta las Grandes Llanuras. Las mejores probabilidades de precipitaciones significativamente superiores a lo normal (más del 50%) cubren las áreas que se espera que estén bajo la influencia del monzón del suroeste, desde Arizona hasta la mayor parte de Utah, el este de Nevada y los desiertos del sureste de California. Las probabilidades también se inclinan hacia precipitaciones superiores a lo normal en la mayor

parte de la mitad oriental del país, excepto solo los Grandes Lagos del noroeste y el valle adyacente del Misisipi, las Grandes Llanuras del sureste, la costa del Golfo y las localidades adyacentes, y la costa este inferior al sur de las Carolinas y el centro de Georgia. En los Estados Unidos continentales, las mayores probabilidades de lluvias inferiores a lo normal se limitan a la península de Florida. En Alaska, se esperan precipitaciones cercanas a lo normal en las partes centrales del estado y en la mayor parte del sureste de Alaska, con cantidades inferiores a lo normal nominalmente favorecidas en las áreas del extremo sureste donde surgió una sequía moderada esta semana. Se esperan precipitaciones superiores a lo normal en la mayor parte de Hawái, excepto en Kauai, con las mayores probabilidades (más del 40%) en la mayor parte de la Isla Grande. Mientras tanto, se prevén temperaturas más cálidas de lo habitual para mediados de agosto en la mayor parte de los Estados Unidos continentales, así como en Alaska y Hawái. Las probabilidades favorecen un calor anómalo desde las regiones del Atlántico Medio y Sur hacia el oeste, a través de las Grandes Llanuras centrales y meridionales, y luego desde la totalidad de las Montañas Rocosas hasta la costa del Pacífico. Las probabilidades de temperaturas significativamente superiores a lo normal son más altas (cerca del 80%) en la Isla Grande y el sureste de Maui, en Hawái. La probabilidad de temperaturas superiores a lo normal supera el 60% en una franja que atraviesa el centro de Alaska, en partes del valle inferior del Misisipi y el sur de las Grandes Llanuras, y en la región del Atlántico Sur, desde la mayor parte de Florida hasta el este de Carolina del Sur.

Autor(s)

Richard Tinker, NOAA/NWS/NCEP/CPC

Daniel Whitesel, National Drought Mitigation Center