

Resumen nacional de sequía para 11 agosto, 2026

Resumen

Las precipitaciones fueron muy variables en todo el país la semana pasada. Se registraron acumulaciones superiores a 2 pulgadas en gran parte del norte y este de Indiana, pasando por gran parte de Ohio, hasta Virginia Occidental y el oeste de Pensilvania. En áreas localizadas del centro y este de Indiana, el centro y sureste de Ohio y el oeste de Virginia Occidental se registraron entre 5 y 7 pulgadas. En las zonas interiores del centro y norte de Misuri también se observaron acumulaciones generalizadas superiores a 2 pulgadas, con algunos parches aislados que recibieron entre 4 y 5 pulgadas. Otras áreas con acumulaciones más dispersas superiores a 2 pulgadas incluyen el Alto Medio Oeste, las Grandes Llanuras centro-orientales, la región sur de los Grandes Lagos, los Apalaches centrales y meridionales y las estribaciones adyacentes, las Carolinas, el centro y norte de Georgia y la península de Florida. Cantidades más moderadas, con puntos aislados que registraron entre 2 y 3 pulgadas, se distribuyeron por el resto de la costa este, la costa del Golfo, el valle inferior del Misisipi y el suroeste desértico, donde se mantuvo una circulación monzónica adecuada. Mientras tanto, en la mayoría de las localidades del Extremo Oeste, la Gran Cuenca, el Oeste Intermontano, gran parte de las Montañas Rocosas centrales y septentrionales, la mayor parte de las Grandes Llanuras, el Alto Valle del Misisipi, la región de los Grandes Lagos, la mayor parte de los valles de Tennessee y Bajo Ohio, partes del sur de Nueva Inglaterra, la región costera de Virginia y localidades adyacentes, se registraron escasas o nulas precipitaciones. Más al norte, se observaron unas décimas de pulgada de precipitación en el centro de Alaska y la mitad superior del sureste de Alaska, mientras que más al sur de esa región las precipitaciones fueron escasas o nulas. Las áreas de Hawái que experimentan sequía anormal (D0) registraron cantidades aisladas cercanas a una pulgada la semana pasada, pero la mayoría de estas áreas recibieron, en el mejor de los casos, unas décimas de pulgada.

Las temperaturas promedio fueron al menos ligeramente superiores a lo normal a lo largo de la costa oeste y desde la Gran Cuenca y el suroeste hasta las llanuras del sur y la mayor parte del valle inferior del Misisipi. La mayoría de las áreas desde los Grandes Lagos orientales, el valle del Ohio y las regiones del Atlántico Medio hacia el noreste hasta el océano Atlántico y la frontera con Canadá también experimentaron una semana más cálida de lo normal. Numerosas localidades desde cerca de la Gran Cuenca hasta Oklahoma y el oeste de Texas registraron un promedio de 6 a 10 grados Fahrenheit por encima de lo normal, al igual que gran parte de Nueva Inglaterra. Mientras tanto, las llanuras del norte dominaron las temperaturas por debajo de lo normal. Otros lugares en los 48 estados contiguos registraron temperaturas cercanas a lo normal durante la semana.

Noreste

En resumen, la sequía se extendió y empeoró en algunas zonas de Nuevo Hampshire y Maine, mientras que más al sur se observó una mejoría. Se registraron más de 5 cm de lluvia, con cantidades localizadas cercanas a los 15 cm, en la mayor parte de Virginia Occidental, partes del oeste y sur de Pensilvania, el norte y centro de Maryland, y en zonas dispersas

desde el centro de Nueva York hacia el sur, pasando por Nueva Jersey y Delaware, así como en las áreas restantes de Pensilvania y Maryland. Con temperaturas superiores a lo normal y lluvias inferiores a lo normal en la mayor parte de Nueva Inglaterra, la sequía anormal (D0) se extendió por el centro de Nuevo Hampshire y gran parte del norte de Maine. En el sur de Maine, la sequía moderada (D1) se extendió hacia el norte, hacia el centro del estado, mientras que se introdujo una zona de sequía severa (D2) cerca de la costa atlántica. Desde el sur de Nueva Inglaterra hacia el sur, pasando por Maryland, muchas zonas de sequía mejoraron, impulsadas por el reciente aumento de las precipitaciones, en particular las grandes cantidades registradas en muchas zonas durante las últimas dos semanas. Sin embargo, persisten algunos impactos derivados de la disminución de los déficits de precipitación a largo plazo. Los niveles de agua siguen siendo muy bajos en todo Nueva Jersey, y el 61% de la cosecha de heno en Virginia Occidental se encuentra en mal o muy mal estado, según el Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas (el promedio para esta época del año durante los últimos cinco años fue del 19%). Además, algunos pastizales permanecen en mal o muy mal estado, incluyendo el 55% de los pastizales de Virginia Occidental (promedio de los últimos cinco años: 24%) y el 41% de los pastizales de Pensilvania (promedio de los últimos cinco años: 16%). Casi un tercio del maíz de Maryland también se encuentra en mal o muy mal estado (promedio de los últimos cinco años: 18%).

Sureste

Se registraron lluvias de moderadas a intensas en gran parte de los estados del Atlántico Sur, lo que provocó una mejora generalizada cerca del corredor de la I-95 y en la región de Piedmont. La mejora fue más dispersa hacia el este, cerca de la costa, y en la mayor parte de Florida, donde las lluvias de moderadas a intensas no fueron tan generalizadas y, en el caso de Florida, las cantidades normales son mayores. El deterioro se limitó a las zonas meridionales de Alabama y Misisipi, donde las precipitaciones inferiores a lo normal y los periodos de calor extremo han causado estragos en las últimas semanas, y en una pequeña parte del sureste de Florida. En los últimos 30 días, las precipitaciones inferiores a lo normal se han limitado a zonas del sur de Virginia, el este de las Carolinas, el sur de Georgia, gran parte de Florida lejos de la costa del Golfo, secciones meridionales de Alabama, gran parte de Misisipi y zonas dispersas en el resto de la región sureste. La mayor parte de Misisipi y el sur de Alabama registraron menos de la mitad de las precipitaciones normales desde mediados de julio, junto con zonas relativamente pequeñas en otras áreas con cantidades de lluvia deficientes en 30 días. En los últimos meses, los totales han estado cerca o por encima de lo normal en la mayor parte de la región, pero los déficits a largo plazo de los últimos 12 meses siguen por debajo de lo normal, con muchas localidades aún más de 30 centímetros por debajo de lo normal para ese período. Al igual que en el noreste, algunos efectos persistentes de los déficits de humedad a largo plazo siguen afectando a la región. Casi la mitad del maíz de Carolina del Norte y el 39 por ciento del maíz de Carolina del Sur se encuentran en malas o muy malas condiciones (el promedio de los últimos 5 años es del 23 por ciento en ambos estados). Los pastizales y el heno en malas o muy malas condiciones también están afectando a partes de la región, particularmente en Virginia y las Carolinas.

Sur

La sequía y la aridez se han extendido y agravado en gran parte de la Región Sur durante las últimas semanas. Se ha observado un rápido deterioro de las condiciones en Oklahoma, el Panhandle de Texas y áreas adyacentes de Arkansas, pero casi todos los estados experimentaron un empeoramiento de las condiciones la semana pasada. Tennessee fue una excepción, donde lluvias más intensas y generalizadas propiciaron cierta mejoría en las partes central y oriental del estado, mientras que las condiciones persistentes o en deterioro se limitaron a las partes norte y oeste del estado. Más al oeste, el deterioro se extendió por la mayor parte de Oklahoma (especialmente la mitad oriental del estado), el Valle del Río Rojo, gran parte del Panhandle de Texas y el noreste de Texas, el oeste de Arkansas, el norte y el este de Luisiana, y zonas dispersas en el resto de la Región desde el Bajo Valle del Misisipi hacia el oeste. Oklahoma ha registrado muy poca precipitación en los últimos 30 días, con la mayoría de las localidades reportando menos del 25 por ciento de lo normal. Las temperaturas promedio de 3 a 7 grados Fahrenheit por encima de los valores normales de mediados de verano exacerbaron significativamente las condiciones de sequía en gran parte de Oklahoma y el norte de Texas, incluido el Panhandle. En otras zonas, las temperaturas promedio fueron cercanas o hasta 3 °F superiores a lo normal. Las lluvias mucho más abundantes registradas en los últimos 30 días están impidiendo que los efectos a largo plazo se agraven demasiado rápido, pero algunos cultivos y caudales de arroyos se están viendo afectados negativamente. Casi la mitad de la avena de Texas y más de un tercio de la soja de Oklahoma se encuentran en malas o muy malas condiciones. En todo Oklahoma, el 44 % de los pastizales y praderas están en malas o muy malas condiciones, al igual que el 33 % de los de Arkansas.

Medio Oeste

La semana pasada se observó un patrón de precipitación variable en la región del Medio Oeste, con precipitaciones deficientes que persistieron en gran parte del norte de la región, así como en algunas zonas dispersas desde el centro de Illinois hasta el sur de Indiana. Mientras tanto, una franja de precipitaciones más abundantes trajo una mejora a importantes zonas del centro-sur y norte de Misuri, el centro y este de Iowa y el sur de la región de los Grandes Lagos. En los últimos 30 días, la mayoría de las áreas en una franja que va desde el centro-norte de Minnesota hasta el norte de Wisconsin registraron menos del 25 por ciento de la precipitación normal, y muchas localidades reportaron varias décimas de pulgada como máximo durante ese período. Las cantidades han sido un poco más generosas en la parte central de la Península Inferior de Michigan, el centro y sur de Illinois, el sur de Indiana, el sur y el norte de Misuri, el oeste de Iowa y el centro y suroeste de Minnesota, pero muchos sitios reportaron la mitad de lo normal o menos durante los últimos 30 días. Por el contrario, los totales de 30 días han estado muy por encima de lo normal en parte del norte de Minnesota, el centro-sur de Minnesota hasta el este de Iowa, parte del sur de Iowa, el centro de Missouri, cerca de la costa suroeste del lago Michigan, gran parte del norte y este de Indiana, la mayor parte de Ohio y el centro de Kentucky. Esto ha dado como resultado un mosaico de sequías de diversa intensidad en toda la región, pero la sequía severa (D2) es más común en el norte de Wisconsin, gran parte del centro y norte de Minnesota, y secciones más pequeñas del

suroeste de Minnesota y el interior del centro-oeste de Iowa.

Altas Llanuras

Lluvias moderadas a intensas empaparon partes del este de Kansas y la zona adyacente de Nebraska, lo que proporcionó un alivio limitado, pero los totales fueron considerablemente menores en otros lugares. Se observaron más de 0,5 pulgadas con cantidades intensas aisladas en el sur de Dakota del Norte, el oeste y el sur de Dakota del Sur, numerosas zonas de Nebraska, el centro-sur y el centro-oeste de Kansas, y las zonas más elevadas de Colorado. En otros lugares se registraron unas pocas décimas de pulgada, si es que hubo alguna. Las mejoras se limitaron a pequeñas secciones del centro-norte y sureste de Nebraska, mientras que la sequía persistió o se intensificó en otros lugares. Las áreas desde el centro-sur hasta el noreste de Colorado, el extremo sur y noroeste hasta el centro-norte de Kansas, el noreste de Nebraska y la mitad norte de las Dakotas experimentaron los deterioros más generalizados. En los últimos 30 días, la mayoría de las zonas fuera de las elevaciones más altas de Wyoming y Colorado han registrado precipitaciones muy por debajo de lo normal, con menos del 25 por ciento de las cantidades normales registradas en el centro y suroeste de Kansas y gran parte de Dakota del Norte. En las Grandes Llanuras, existen algunas franjas con totales de 30 días cercanos o superiores a lo normal, pero estas condiciones abarcan áreas mucho más pequeñas que las que experimentan sequía. Actualmente, amplias zonas de Colorado y Wyoming sufren sequía severa a excepcional (D2 a D4), con las peores condiciones afectando partes significativas de Colorado y algunas zonas del oeste de Nebraska. En las Grandes Llanuras, la sequía severa (D2) o extrema (D3) también se extiende por gran parte de Nebraska y algunas localidades adyacentes, el centro y el oeste de Dakota del Norte y Dakota del Sur, y algunas zonas del sureste de Dakota del Sur y el suroeste de Kansas. La sequía está afectando especialmente las reservas de humedad superficial, incluyendo áreas con caudales reducidos y cultivos degradados. No todos los daños a los cultivos son necesariamente consecuencia de la sequía, pero es el factor que más contribuye a ella. En Colorado, el 64 por ciento de los pastos y praderas están en malas o muy malas condiciones (promedio de 5 años del 23 por ciento), junto con el 70 por ciento de los de Nebraska (promedio de 5 años del 30 por ciento), y el 75 por ciento en Wyoming (promedio de 5 años del 38 por ciento). Varios cultivos en Colorado tienen una proporción significativa en malas o muy malas condiciones, incluyendo el 46 por ciento del maíz (promedio de 5 años del 15 por ciento) y el 57 por ciento del sorgo (promedio de 5 años del 8 por ciento). En Dakota del Norte, el 53 por ciento del sorgo y el 40 por ciento del maíz están en condiciones similares (promedios de 5 años del 13 y 15 por ciento, respectivamente). También han prevalecido temperaturas significativamente superiores a lo normal durante los últimos 30 días, con temperaturas promedio generalmente de 6 a 9 grados Fahrenheit por encima de lo normal en el oeste de Dakota del Norte y del Sur, las Grandes Llanuras adyacentes, el centro y oeste de Colorado, y el oeste de Wyoming, con las mayores desviaciones observadas en esta última región.

Oeste

Se registraron precipitaciones moderadas a localmente intensas (de 0,5 a 3 pulgadas) en gran parte de Arizona y Nuevo México, principalmente debido a la convección monzónica. Más al norte, se registraron algunas décimas de pulgada, con cantidades aisladas superiores a una pulgada, en Utah, gran parte de la Gran Cuenca y algunas áreas adyacentes. El resto de la Región Oeste permaneció seca, con solo algunas localidades reportando hasta 0,2 pulgadas. Estas condiciones provocaron pocos cambios en la sequedad y la sequía en la Región Oeste, limitándose los cambios a varias áreas de deterioro en las llanuras de Montana y parte de las Rocosas del norte adyacentes, de forma similar a las condiciones más al este en la franja norte de los 48 estados contiguos centrales. La sequedad y la sequía continúan cubriendo una gran proporción de la Región Oeste, salvo partes del centro y oeste de California, las áreas costeras cerca de la frontera entre Oregón y Washington, y el centro-oeste de Montana. La sequía extrema a excepcional (D3-D4) es común en una amplia franja del interior de Oregón, el sur de Idaho, la Gran Cuenca adyacente y una gran sección de Utah. Las condiciones se han visto exacerbadas por temperaturas promedio de 4 a 8 grados Fahrenheit por encima de lo normal durante 30 días en Utah, el sureste de Idaho, gran parte del sur de Montana y lugares dispersos en el suroeste. En Utah, el 33 por ciento del trigo de invierno está en malas o muy malas condiciones, en comparación con un promedio de 5 años cercano a cero. Además, entre la mitad y las tres cuartas partes de los pastizales en Arizona, Nuevo México y Utah están en malas o muy malas condiciones, lo que está muy por encima del promedio para esta época del año. Además, varios años de precipitaciones persistentemente por debajo de lo normal han dejado algunos grandes embalses en el oeste con reservas de agua extremadamente bajas. El contenido del lago Mead ha caído a un mínimo histórico desde que se tienen informes diarios, desde 1937. Para el 10 de agosto, la cantidad de agua almacenada cayó por debajo de los 7 millones de acres-pie (la capacidad es de más de 28 millones de acres-pie).

Caribe

Se han implementado algunas interrupciones programadas del servicio de agua en partes de la Mancomunidad debido a que las precipitaciones se mantuvieron inusualmente bajas en la mayoría de las áreas. Cayeron más de 5 cm en algunas áreas del oeste y noreste de Puerto Rico, con entre 10 y 15 cm en partes de Mayagüez, en la costa oeste. Sin embargo, la mayoría de las localidades reportaron menos de 2,5 cm, con apenas unas décimas en el mejor de los casos en las áreas del centro-sur y a lo largo de la mitad occidental de la costa sur. La sequía extrema (D3) abarca las localidades que reportaron la menor cantidad de lluvia la semana pasada, junto con algunas secciones del interior del noreste, y la sequía severa (D2) se extendió para abarcar gran parte del sur, centro y este de la Mancomunidad.

Una sequía extrema continúa afectando a las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Esta semana, el gobernador Albert Bryan Jr. solicitó una declaración de desastre federal para las islas de St. Croix, St. Thomas y St. John, dado que la sequía ha afectado la agricultura y el suministro de agua. Las estaciones de CoCoRaHS en la isla de St. Croix registraron precipitaciones de entre 0,08 y 0,46 pulgadas esta semana. El nivel del agua en el pozo Adventure 28 se sitúa actualmente en 25,03 pies, lo que representa una disminución de 0,32 pies respecto a la semana pasada y de 7,65 pies en comparación con el año anterior. En St.

John, las estaciones de CoCoRaHS reportaron lluvias de entre 0,31 y 0,72 pulgadas esta semana. La estación de Windswept Beach registró 0,04 pulgadas de lluvia. El nivel del agua en el pozo Susannaberg DPW 3 se encuentra actualmente en 17,66 pies, una cifra 0,23 pies inferior a la de la semana pasada y 4,35 pies menor que la del año anterior. La estación de CoCoRaHS en la isla de St. Thomas registró 0,15 pulgadas de lluvia esta semana. El nivel del agua en el pozo Grade School 3 está actualmente en 10,58 pies, lo que supone un descenso de 0,96 pies respecto a la semana pasada y de 1,16 pies en comparación con el año anterior. No obstante, los niveles del Índice de Salud de la Vegetación (VHI) han mejorado ligeramente con respecto a la semana pasada.

Pacífico

Las zonas de sequía no recibieron precipitaciones significativas la semana pasada. La mayoría de las áreas registraron, como mucho, unas décimas de pulgada, y en la mitad sur del sureste de Alaska se registraron pocas o ninguna. Las temperaturas muy superiores a lo normal agravaron la sequía, lo que provocó que se declarara sequía moderada (D1) en parte del centro de Alaska, dentro de una zona ampliada de sequía anormal (D0). En el resto del sureste de Alaska, la sequía se mantuvo sin cambios. El riesgo de incendios está aumentando, pero hasta el momento los incendios forestales no han afectado a gran parte del estado. Hasta la fecha, se han consumido poco más de 72 000 acres, según el Centro Nacional Interagencial de Incendios (en comparación, los incendios forestales han consumido entre 6,3 y 6,4 millones de acres en los otros 49 estados).

La sequía anormal (D0) se mantuvo intacta en las zonas de sotavento, principalmente en la franja suroccidental del archipiélago. En algunos lugares de las zonas anormalmente secas, las precipitaciones alcanzaron casi una pulgada durante la semana, pero en la mayoría de los lugares solo cayeron unas décimas de pulgada. La sequía anormal (D0) se extendió hacia el sur, abarcando la región de Kona, en el lado occidental de la Isla Grande, donde se han reportado algunos casos de cultivos de café afectados por el clima cálido y seco.

La mayoría de las islas de la República de las Islas Marshall han recibido lluvias abundantes esta semana. Ailingalapalap, Kwajalein y Mili registraron 3,74, 3,32 y 5,89 pulgadas de lluvia esta semana, respectivamente. Sin embargo, varias islas no recibieron precipitaciones suficientes durante este periodo. Jaluit, Majuro y Wotje recibieron 1,03, 1,32 y 1,4 pulgadas de lluvia, respectivamente. Utirik recibió 0,06 pulgadas, la menor cantidad de precipitación de todo el archipiélago esta semana.

Se esperaba una semana seca para los Estados Federados de Micronesia. Una isla registró más de una pulgada de precipitación; concretamente, Pohnpei recibió 1,05 pulgadas de lluvia esta semana. La laguna de Chuuk, Kapingamarangi, Lukunor y Nukuoro recibieron únicamente 0,32, 0,1, 0,29 y 0,68 pulgadas de lluvia, respectivamente. Ulithi, Woleai y Yap no registraron precipitaciones durante la semana. Asimismo, faltaron registros de precipitación para la isla de Kosrae.

Esta semana, Samoa Americana sufrirá un descenso de una categoría, pasando a la condición de sequedad anómala debido a la falta de precipitaciones adecuadas durante más de tres

semanas. El aeropuerto de Pago Pago registró solo 0,48 pulgadas de lluvia esta semana. Las zonas de Siufaga y Toa Ridges recibieron 1,1 y 0,46 pulgadas de lluvia, respectivamente. La República de Palaos ha experimentado otra semana seca: la estación de Koror registró solo 0,17 pulgadas de lluvia, mientras que la oficina meteorológica (WSO) de Palaos reportó 0,21 pulgadas. La temporada de monzones continúa afectando a las Islas Marianas; Guam, Rota y Tinian registraron 3,51, 4,51 y 6,01 pulgadas de lluvia esta semana, respectivamente. El Aeropuerto Internacional de Saipán recibió 5,88 pulgadas de lluvia, mientras que la estación AMME del NPS en Saipán registró 1,68 pulgadas.

Mirando hacia el futuro

Durante el 13 al 17 de agosto de 2026, se pronostican lluvias de moderadas a fuertes (más de una pulgada) en las Grandes Llanuras centrales y septentrionales, las Montañas Rocosas del norte, las Montañas Rocosas de Colorado, ubicaciones dispersas en la región de las Cuatro Esquinas central y occidental y la Gran Cuenca, gran parte de las Grandes Llanuras del norte y centro, la región de los Grandes Lagos del sur y centro, el valle del norte de Ohio y varias zonas en el sur de Nueva Inglaterra, el noreste inferior, el sur de Georgia y los extremos sur y norte de Florida. Se esperan los mayores totales (3 pulgadas o más) en parte del centro-este de Montana, el cuadrante noreste de Colorado y gran parte de una franja desde el centro de Iowa hasta el oeste de Indiana. Por el contrario, se anticipan precipitaciones ligeras en el mejor de los casos en el norte de Nueva Inglaterra, las secciones interiores de los estados del Atlántico Medio y Sur, las porciones septentrionales de los Grandes Lagos y Minnesota, el valle inferior del Misisipi, las llanuras centrales y meridionales, la mayor parte de los estados de la costa del Pacífico y las elevaciones más bajas en la Gran Cuenca y las Montañas Rocosas centrales y meridionales. Mientras tanto, se espera que las zonas del centro-sur de las Grandes Llanuras y el sureste registren temperaturas máximas diarias que promedian entre 5 y 11 grados Fahrenheit por encima de lo normal, con las mayores anomalías previstas desde Arkansas hasta el centro de Tennessee. Más al norte y al oeste, las temperaturas máximas diarias deberían promediar entre 3 y 6 grados Fahrenheit por debajo de lo normal en gran parte de California y la Gran Cuenca, el norte de la región intermontañosa del oeste y las zonas septentrionales de las Montañas Rocosas y las Grandes Llanuras. En otras zonas, las temperaturas promedio deberían ser más cercanas a lo normal.

El pronóstico de 6 a 10 días (del 18 al 23 de agosto de 2026) favorece, al menos marginalmente, precipitaciones superiores a lo normal en la mitad norte de la costa este, extendiéndose hacia el oeste a través de la región de los Grandes Lagos, las mitades norte del valle del Misisipi y las Grandes Llanuras, y desde las Montañas Rocosas hasta la costa oeste. Las mejores probabilidades de un clima más húmedo de lo normal (más del 50 por ciento) abarcan el interior del noroeste del Pacífico. También se favorecen precipitaciones excedentes en todo Alaska y Hawái, con probabilidades que superan el 40 por ciento en el centro-sur de Alaska y a través de la cadena de islas hawaianas. Se favorecen totales inferiores a lo normal desde el sur de las Grandes Llanuras hasta la región de la costa del Golfo y Florida. Mientras tanto, se espera que las condiciones más cálidas de lo típico a mediados de agosto predominen en los 50 estados, excepto en el suroeste de Alaska y las Aleutianas, la mayor parte de los estados de la costa oeste central y la Gran Cuenca adyacente, y la franja norte de

los 48 estados contiguos desde las Grandes Llanuras del norte hasta la mayor parte de Nueva Inglaterra. La probabilidad de un calor inusual supera el 70 % desde las Grandes Llanuras del sur hacia el este, a través de la costa sureste y sur del Atlántico, así como en el sureste de Maui y la Isla Grande de Hawái, y parte del centro-este de Alaska. Las probabilidades superan el 80 % desde el valle central del Bajo Misisipi hasta los estados del interior de la costa central del Golfo de México. Las probabilidades de temperaturas ligeramente inferiores a lo normal se limitan a las Aleutianas y el norte de Maine.

Autor(s)

Richard Tinker, NOAA/NWS/NCEP/CPC

Daniel Whitesel, National Drought Mitigation Center