

# **Resumen nacional de sequía para 1 septiembre, 2026**

## **Resumen**

Esta semana continuó el tiempo seco en gran parte del centro de Estados Unidos, especialmente desde las Grandes Llanuras del sur hasta el valle del río Misisipi y el Cinturón del Maíz. Se registraron sequías repentinas en una amplia zona que abarca desde Texas hacia el noreste hasta Oklahoma y el sur de Kansas, el sur de Misuri, Arkansas, el norte de Misisipi y partes del extremo oeste de Tennessee. Debido al clima más seco y cálido de lo normal en la mayoría de estas áreas, la sequía y la sequedad anormal se extendieron e intensificaron en muchas zonas, mientras que los impactos adversos generalizados en la agricultura continuaron y el riesgo de incendios siguió aumentando en algunas áreas. Se registraron lluvias y tormentas eléctricas generalizadas, algunas localmente intensas, en partes de las regiones del Noreste y Sureste, lo que provocó mejoras localizadas en la sequía o sequedad anormal. Algunas áreas que no recibieron lluvias vieron empeorar las condiciones. El clima cálido y seco continuó cerca de las fronteras de las Dakotas con Minnesota, lo que provocó un empeoramiento de las condiciones de sequía. Se observaron mejoras generalizadas en algunas zonas desde Wyoming y las Llanuras del este de Colorado hacia el noreste, hasta las dunas de arena de Nebraska y el sur de Dakota del Sur, donde las fuertes lluvias de esta semana mejoraron las condiciones o bien se reevaluaron tras las recientes lluvias más intensas. El clima cálido y seco reciente, junto con la falta de nieve acumulada durante el invierno, provocó la expansión de una sequía moderada en el norte de California. Las fuertes lluvias asociadas con los remanentes de la tormenta tropical Dolly en el este de Puerto Rico produjeron algunas mejoras allí, aunque la sequía severa y extrema generalizada continuó en gran parte de Puerto Rico. Las recientes lluvias provocaron la eliminación de una sequía moderada a corto plazo en el interior central de Alaska.

## **Noreste**

Esta semana el clima fue mayormente seco en el noreste, excepto en partes de Nueva Jersey y el sureste de Pensilvania (en el valle de Lehigh y el área de Filadelfia), donde las fuertes lluvias (localmente más de 5 cm) aumentaron el caudal de los ríos y aliviaron el déficit de precipitaciones a largo plazo. Las lluvias recientes también produjeron algunas mejoras localizadas en el sur de Nueva Inglaterra, aunque la escasez de agua subterránea y el déficit de precipitaciones a largo plazo mantuvieron la sequía y la aridez anormal. En el norte de Nueva Inglaterra, prevaleció el clima seco, lo que provocó el aumento y el empeoramiento de las zonas de sequía en medio de caudales muy bajos. A pesar de las temperaturas de 1 a 2 grados por debajo de lo normal en el centro de Nueva York, la aridez anormal se extendió allí a medida que aumentaron los déficits de precipitaciones a corto plazo y disminuyeron la humedad del suelo y el caudal de los ríos. Las temperaturas en el resto de la región se mantuvieron mayormente dentro de los 1 a 2 grados de lo normal.

## **Sureste**

Se registraron lluvias intensas dispersas, de entre 5 y 125 mm en algunas zonas, desde el sur

de Carolina del Norte hasta la península de Florida. Se observaron mejoras dispersas en la sequía prolongada en la península de Florida, el sureste de Georgia, la costa de Carolina del Sur y el sur de Carolina del Norte, donde los déficits de precipitación a largo plazo se compensaron con ganancias a corto plazo y una mejora en la humedad del suelo y el caudal de los arroyos. La sequía localizada a corto plazo afectó a partes del noreste de Carolina del Norte, lo que provocó un empeoramiento de las condiciones de sequía en zonas donde los déficits de precipitación a largo plazo siguen siendo considerables. La sequía y la sequedad anormal se extendieron por gran parte del sur de Alabama y algunas zonas del centro de Georgia, a medida que disminuía la humedad del suelo y se reducían los caudales de los arroyos debido a los continuos déficits de lluvia a corto plazo. Las temperaturas en Alabama y el noroeste de Georgia fueron generalmente más cálidas de lo normal, con algunas zonas terminando la semana entre 1 y 2 grados por encima de lo normal. En otros lugares, con excepciones locales, las temperaturas se mantuvieron dentro de un par de grados de lo normal.

## **Sur**

Se produjo una expansión generalizada o un empeoramiento de la sequía o aridez anormal en todo el Sur, especialmente en partes de Misisipi, Texas, el este de Oklahoma y algunas zonas de Arkansas. Se registraron lluvias más intensas, localmente superiores a las 5 cm, en el sureste de Luisiana y el suroeste de Misisipi. Por lo demás, las condiciones meteorológicas fueron mayormente secas, con muchas áreas recibiendo menos de 1,25 cm de lluvia y algunas sin ninguna. Las temperaturas fueron más cálidas de lo normal en la mayor parte de la región, especialmente en Oklahoma y la mitad norte de Texas, donde fueron entre 3 y 6 grados más altas de lo normal. Esto continuó un agosto muy caluroso en gran parte de Oklahoma. El deterioro de las condiciones de sequía fue especialmente frecuente en el suroeste y norte de Texas, el extremo sur de Texas, el norte de Misisipi y el este de Oklahoma, ya que el clima cálido y seco persistente empeoró las condiciones en áreas que ya sufrían múltiples impactos de sequía. Se decretaron prohibiciones de quema en gran parte del oeste de Oklahoma, mientras que a los residentes de Oxford, Misisipi, se les pidió que ahorraran agua debido a la alta demanda y al reciente calor extremo. El caudal de los ríos en gran parte del centro y oeste de Oklahoma y el norte de Texas fue bastante bajo, junto con la baja humedad del suelo y un intenso déficit de precipitaciones a corto plazo.

## **Medio Oeste**

Esta semana se registró tiempo seco en gran parte de la mitad sur de la región del Medio Oeste. Esto provocó el desarrollo o la expansión de sequía anormal en Illinois y Kentucky, y un deterioro generalizado de las condiciones en Misuri, especialmente en el centro-sur y suroeste del estado. El riesgo de incendios y los impactos de la sequía en la agricultura y la vegetación continuaron empeorando en el suroeste de Misuri y el vecino Arkansas, lo que provocó un deterioro de las condiciones en gran parte de esta zona. Las condiciones de sequía también empeoraron en el centro-oeste de Minnesota, donde se acumularon déficits de precipitación a corto y largo plazo. Las temperaturas en la mitad oriental de la región se mantuvieron

generalmente entre 2 y 4 grados por encima de lo normal, mientras que en gran parte de Minnesota, Iowa y el oeste de Misuri fueron entre 2 y 6 grados más cálidas de lo normal. Se registraron lluvias dispersas en partes del Alto Medio Oeste, superando localmente las 2 pulgadas, pero depositando en su mayoría media pulgada o menos.

## **Altas Llanuras**

Una franja de lluvia de 0.5 a 2 pulgadas cayó desde partes del oeste de Nebraska y el oeste de Kansas hasta partes de Colorado y Wyoming. También cayeron cantidades de lluvia similares dispersas en partes del centro-este y norte de Dakota del Sur, así como en partes del centro y oeste de Dakota del Norte. Los impactos de las recientes lluvias en el sur de Dakota del Sur y las Sandhills de Nebraska fueron reevaluados esta semana, y se hicieron mejoras generalizadas a medida que la humedad del suelo y el caudal de los arroyos mejoraron localmente, mientras que los déficits de lluvia a corto plazo se aliviaron. Los déficits de precipitación a largo plazo y sus impactos continuaron en gran parte de esta región, y la sequedad anormal y la sequía moderada a largo plazo persistieron. También se produjeron mejoras dispersas en la sequía desde el sur y el este de Wyoming hasta el oeste de las Dakotas y gran parte del este de Colorado. Los déficits de precipitación a corto plazo mejoraron en estas áreas, con cierta mejora en la humedad del suelo y el caudal de los arroyos, lo que llevó a mejoras en las condiciones de sequía. El caudal de los arroyos sigue siendo bajo en partes de la región occidental de las Grandes Llanuras debido a las escasas nevadas en las zonas de mayor altitud y las temperaturas cálidas durante el año hidrológico. Las temperaturas en toda la región fueron más altas de lo normal, especialmente en Kansas, donde oscilaron principalmente entre 6 y 10 grados por encima de lo normal, lo que provocó una gran demanda atmosférica de humedad en el sureste de Kansas.

## **Oeste**

Las fuertes lluvias del monzón norteamericano cayeron en partes de Arizona, Utah y las Montañas Rocosas en Colorado. En algunas zonas de Colorado al oeste de la Cordillera Frontal, las condiciones mejoraron gracias a las recientes lluvias, aunque la sequía generalizada, tanto a corto como a largo plazo, persistió en el centro y oeste del estado. En algunas áreas del centro-sur y suroeste de Colorado que no recibieron lluvias más intensas, el déficit de precipitaciones a largo plazo empeoró aún más. Las temperaturas, entre 4 y 6 grados por encima de lo normal, también mantuvieron la sequedad atmosférica elevada, y la sequía extrema y excepcional se extendió localmente. El déficit de precipitaciones a corto plazo y el bajo caudal de los ríos en algunas zonas provocaron la degradación de la sequía en partes del Panhandle de Idaho, el área de Spokane, Washington, y el noroeste cercano de Montana. La sequedad y el calor a corto plazo en el norte de California llevaron a la expansión de la sequía moderada en esa región. La sequía moderada se extendió localmente en el centro-norte de Montana, donde el déficit de lluvias a corto plazo aumentó y la humedad del suelo disminuyó en algunas zonas. Las recientes precipitaciones en el suroeste de Montana llevaron a mejoras en los déficits de precipitaciones a medio y largo plazo y en las condiciones generales, y la extensión de la sequía moderada disminuyó. Las recientes precipitaciones en

el oeste de Utah contribuyeron a reducir el déficit de lluvias a largo plazo, y la sequía extrema disminuyó ligeramente. Las temperaturas fueron superiores a lo normal en gran parte del oeste, con la excepción de las zonas que abarcan desde el oeste de Nevada y el extremo norte de California hasta Oregón y Washington. En el resto de la región, las temperaturas fueron en su mayoría entre 2 y 4 grados superiores a lo normal, y en muchas zonas entre 4 y 10 grados más cálidas de lo habitual.

## **Caribe**

Esta semana, cayeron más de 15 centímetros de lluvia en algunas zonas del sureste de Puerto Rico, debido al paso de los remanentes de la antigua tormenta tropical Dolly. En gran parte del este de Puerto Rico, cayeron entre 5 y 7,5 centímetros de lluvia. La sequía extrema a corto plazo mejoró a sequía severa a corto plazo en algunas zonas del noreste y sureste de Puerto Rico, mientras que en una pequeña área del sureste de la isla, las condiciones mejoraron de sequía severa a moderada a corto plazo.

Esta semana, el aumento de la humedad tropical proveniente de los remanentes de Dolly creó condiciones propicias para lluvias en algunas zonas de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos (USVI). Sin embargo, factores locales y la variabilidad a escala insular influyeron significativamente en las precipitaciones. Como resultado, si bien el patrón meteorológico general trajo lluvias beneficiosas, estas no fueron uniformes en todas las islas: Santa Cruz recibió mucha más lluvia, mientras que Santo Tomás y partes de San Juan permanecieron relativamente secas. A pesar de estas recientes precipitaciones, los niveles de agua subterránea en las tres islas siguen siendo mucho más bajos que hace un año, lo que indica que las recientes lluvias aún no han propiciado una recuperación significativa de las reservas de agua subterránea.

Esta semana, St. Croix experimentó las precipitaciones más intensas y generalizadas entre las tres islas. East Hill registró 1,45 pulgadas, mientras que las estaciones CoCoRaHS reportaron cantidades variables: 1,61 pulgadas en VI-SC-10 (Christiansted 1,6 E), 1,96 pulgadas en VI-SC-20 (Frederiksted 1,7 ESE), 1,61 pulgadas en VI-SC-23 (Christiansted 6,5 W), 1,30 pulgadas en VI-SC-30 (Christiansted 1,7 SW), 1,92 pulgadas en VI-SC-34 (Frederiksted 1,9 NE) y 1,94 pulgadas en VI-SC-35 (Frederiksted 1,3 ENE). En general, las precipitaciones en St. Croix fueron moderadas y bastante generalizadas, con cantidades que oscilaron entre 1,30 y 1,96 pulgadas entre las estaciones CoCoRaHS. Sin embargo, a pesar de las recientes lluvias, las aguas subterráneas siguen gravemente mermadas. El pozo Adventure 28 registró una profundidad de 24,64 pies bajo la superficie el 1 de septiembre, en comparación con los 18,38 pies de la misma fecha de 2025. Esto indica que los niveles de agua subterránea son considerablemente inferiores a los de hace un año. Como consecuencia, St. Croix continúa sufriendo una sequía extrema.

Esta semana, St. John recibió mucha menos lluvia que St. Croix. Rafe Boulon (VI-SJ-3, Windswept Beach) registró 0.48 pulgadas, mientras que la estación CoCoRaHS VI-SJ-5 (Cruz Bay 1.6 E) registró solo 0.03 pulgadas. Estas observaciones indican lluvias limitadas e irregulares, sin evidencia de precipitaciones sustanciales generalizadas en toda la isla. Las condiciones del agua subterránea siguen siendo muy secas. En el pozo Susannaberg DPW 3,

el nivel del agua se midió en 18.50 pies por debajo de la superficie del terreno el 1 de septiembre. Este nivel ha aumentado en profundidad con respecto a la semana anterior y es significativamente más profundo que los 12.67 pies registrados el 1 de septiembre de 2025. La combinación de lluvias mínimas y niveles decrecientes de agua subterránea indica que St. John está experimentando actualmente condiciones de sequía extrema.

St. Thomas registró la menor cantidad de lluvia de las tres islas esta semana. El aeropuerto Cyril E. King registró solo 0.01 pulgadas. Las estaciones CoCoRaHS reportaron cantidades variables: 0.34 pulgadas en VI-ST-5 (Charlotte Amalie Oeste 4.2 ONO), 0.06 pulgadas en VI-ST-14 (Nadir 0.3 E/Marino Tropical) y 0.29 pulgadas en VI-ST-15 (Charlotte Amalie Oeste 1.3 N). La estación VI-ST-13 (Charlotte Amalie 1.2 NNO) reportó datos faltantes en lugar de una cantidad de lluvia observada. Como resultado, la lluvia registrada varió de 0.01 a 0.34 pulgadas, lo que indica lluvias generalmente ligeras que variaron en St. Thomas. Además, las condiciones del agua subterránea siguen siendo muy malas. El pozo de la escuela primaria número 3 alcanzó una profundidad de 9,88 pies bajo la superficie el 1 de septiembre, en comparación con los 7,38 pies registrados en la misma fecha de 2025. Además, la profundidad del agua subterránea ha ido en aumento desde el 20 de abril de 2026. Estas condiciones sugieren que St. Thomas continúa experimentando una sequía extrema a pesar de las recientes lluvias.

## **Pacífico**

En gran parte del centro y norte de Alaska se registraron precipitaciones superiores a lo normal, junto con temperaturas cercanas a lo normal o entre 3 y 9 grados por debajo de lo habitual en estas zonas. Se eliminó una pequeña área de sequía moderada y de corta duración en el interior central, mientras que la sequedad anormal se extendió localmente en el interior oriental, donde persistieron las condiciones climáticas secas recientes en algunas zonas.

Las precipitaciones en Hawái esta semana fueron en su mayoría inferiores a lo normal, registrándose los mayores niveles (entre 2,5 y 5 cm) en algunas zonas de Kauai, Maui, Oahu y la Isla Grande. Las temperaturas se mantuvieron, en general, dentro de un margen de un par de grados respecto a lo normal. Hawái no sufrió sequía, aunque persistió una sequedad anormal en algunas zonas de Kauai, Oahu, Molokai, el centro de Maui y la zona occidental de la Isla Grande.

Las Islas Marshall se han visto afectadas por la vaguada monzónica del Pacífico occidental, que ha traído chubascos y tormentas dispersas a Majuro. Para el 1 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional indicó que la actividad monzónica se estaba debilitando y se esperaba un patrón más seco alrededor de Majuro. Las precipitaciones de esta semana fueron adecuadas, y todas las estaciones meteorológicas no registraron condiciones de sequía. Los totales semanales incluyeron 3,31 pulgadas en Ailinglapalap, 0,40 pulgadas en Jaluit, 1,83 pulgadas en Kwajalein, 1,90 pulgadas en Majuro, 2,45 pulgadas en Mili, 0,54 pulgadas en Utirik y 1,04 pulgadas en Wotje. Jaluit fue la localidad más seca, pero recibió 1,9 pulgadas el 24 de agosto, lo que proporcionó algo de humedad para mantenerse libre de sequía. En general, las Islas Marshall se encuentran actualmente libres de sequía.

Esta semana, una activa vaguada monzónica y una fuerte corriente afectaron el este y el centro de los Estados Federados de Micronesia (EFM), especialmente Pohnpei, donde se ubicaba una débil perturbación tropical, Invest 95W. El Servicio Meteorológico Nacional informó que, si bien la fuerte corriente intensificó la convección alrededor de Pohnpei, se esperaba que se debilitara a medida que la perturbación se desplazara hacia el nor-noroeste. El oeste de los EFM, incluyendo Yap y Chuuk, también experimentó los efectos de una zona de convergencia monzónica. Las precipitaciones variaron en los EFM, con la mayoría de las estaciones recibiendo al menos 1 pulgada. Los totales semanales notables incluyeron 2,84 pulgadas en la laguna de Chuuk, 0,00 pulgadas en Kapingamarangi, 1,12 pulgadas en Kosrae, 1,46 pulgadas en Lukunor, 0,86 pulgadas en Nukuoro, 1,58 pulgadas en Ulithi, 6,28 pulgadas en Pohnpei, 1,59 pulgadas en Woleai y 1,73 pulgadas en Yap. Pohnpei registró precipitaciones especialmente intensas, alcanzando los 6,28 pulgadas, incluyendo 4,16 pulgadas el 30 de agosto. Por el contrario, Kapingamarangi permaneció sin lluvias y continuó con una clasificación D0-S (sequía anormal). En general, las lluvias recientes han mantenido condiciones libres de sequía en la mayor parte de los Estados Federados de Micronesia, con excepción de Kapingamarangi.

Samoa Americana continúa experimentando una sequía persistente a corto plazo en las regiones de USAPI. Esta semana, Pago Pago registró 0,29 pulgadas de lluvia, mientras que Siufaga Ridge recibió 0,76 pulgadas y Toa Ridge 0,57 pulgadas. A pesar de estas cantidades, las tres localidades permanecen en condiciones de sequía moderada (D1-S), ya que las lluvias localizadas fueron insuficientes para aliviar significativamente la sequedad. La escasez de lluvias se debe a un patrón sinóptico en el que la principal vaguada monzónica del Pacífico occidental y las perturbaciones tropicales asociadas se ubican bastante al norte de Samoa Americana. Esta situación ha dejado al territorio fuera del área central de la convección micronesia intensificada. Como resultado, las lluvias de esta semana han sido intermitentes y localizadas, en lugar de lo suficientemente generalizadas como para mejorar significativamente las condiciones de sequía moderada.

Palaos no registró precipitaciones esta semana, con 0,00 pulgadas en Koror y solo 0,10 pulgadas en WSO Palaos/Airai. Ambas estaciones meteorológicas permanecen en condiciones anormalmente secas (D0-S) debido a la sequía persistente, lo que aumenta el riesgo de que se conviertan en sequía moderada si estas condiciones persisten. Los patrones climáticos han sido menos favorables para las precipitaciones que en el centro y este de Micronesia. Palaos se encuentra bajo o cerca de una cresta tropical relativamente seca, mientras que la principal convergencia monzónica y la actividad convectiva se han desplazado hacia Yap y las Marianas. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) indicó que esta cresta continuaría promoviendo condiciones mayormente secas sobre Palaos. En consecuencia, la falta de precipitaciones significativas esta semana, combinada con los patrones climáticos secos predominantes, respalda la continuación de las condiciones anormalmente secas (D0-S). Las condiciones de sequía podrían empeorar a sequía moderada la próxima semana si continúa el período de sequía.

Esta semana, las Islas Marianas experimentaron lluvias localmente intensas y muy variables. Los totales de lluvia fueron los siguientes: Guam recibió 4,64 pulgadas, Rota 2,32 pulgadas, Saipán 0,82 pulgadas (con dos días de datos faltantes) y Tinian 1,44 pulgadas (con cinco días

de datos faltantes). Como resultado, todas las estaciones se mantuvieron libres de sequía. Este patrón de lluvias estuvo vinculado a una vaguada monzónica activa y a la perturbación tropical cercana, Invest 95W, que aumentó la humedad y la convección en la región. En general, las lluvias fueron suficientes para mantener condiciones libres de sequía en todas las Islas Marianas.

### ***Mirando hacia el futuro***

Hasta la noche del lunes 7 de septiembre, el Centro de Predicción Meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional pronostica tiempo seco que continuará en gran parte del centro y sur de los Estados Unidos, especialmente desde el sureste de Nebraska a través de Oklahoma, Arkansas y el oeste del norte de Texas hasta el suroeste de Texas y el este de Nuevo México y Colorado. Las precipitaciones más intensas hasta la noche del lunes probablemente se limitarán a partes del sureste y norte de los 48 estados contiguos. Se pronostican lluvias intensas, o que ya se estén produciendo el miércoles por la tarde, en el centro y sureste de Texas, mientras los remanentes de la tormenta tropical Edouard pasan por la zona. También se pronostican lluvias intensas en la costa central y oriental del Golfo de México y la península de Florida. Las precipitaciones desde el sur de Luisiana hasta cerca de Panama City podrían alcanzar entre 2,5 y 5 cm, mientras que se pronostican precipitaciones más intensas, localmente de 5 a 7,5 cm o más, en la península de Florida. También se pronostican precipitaciones intensas, principalmente entre 1,9 y 5 cm, en partes del noroeste del Pacífico, el norte de Idaho, el norte de Montana y Dakota del Norte, y desde Minnesota hacia el sureste a través de Wisconsin y la región de los Grandes Lagos hasta Pensilvania y Nueva York.

Las previsiones a 6-10 días del Centro de Predicción Climática del Servicio Meteorológico Nacional, que abarcan del 8 al 12 de septiembre, favorecen temperaturas superiores a lo normal en gran parte del centro y este de Estados Unidos. La mayor probabilidad de temperaturas superiores a lo normal se concentra en Kansas City y el valle medio-bajo del río Misuri, extendiéndose hacia el sur hasta la costa del Golfo central y occidental. Se prevén temperaturas cercanas a lo normal en la mitad occidental del Oeste, con una ligera probabilidad de temperaturas inferiores a lo normal en el oeste de Nevada y las zonas adyacentes de California y Oregón. También se prevén temperaturas cercanas o inferiores a lo normal en el centro y norte de Nueva Inglaterra. Se prevén precipitaciones superiores a lo normal en gran parte de las Grandes Llanuras y el oeste de Estados Unidos, especialmente desde la Divisoria Continental hasta la Gran Cuenca y en el norte de Minnesota y sus alrededores. También se prevén precipitaciones superiores a lo normal en el centro-este de Florida. El pronóstico favorece un clima más seco de lo normal en los valles de los ríos Tennessee y Ohio y desde el lago Erie hasta el sur del noreste.

En Hawái, se prevén precipitaciones y temperaturas superiores a lo normal entre el 8 y el 12 de septiembre. También se esperan precipitaciones superiores a lo normal en gran parte de Alaska, excepto en la zona noroeste del estado y en las islas Aleutianas centrales. Se prevén temperaturas superiores a lo normal en el sureste y centro de Alaska y en las islas Aleutianas centrales, mientras que se esperan temperaturas cercanas a lo normal en el noreste y suroeste de Alaska y en las islas Aleutianas orientales.

**Autor(s)**

Curtis Riganti, National Drought Mitigation Center

Tsegaye Tadesse, National Drought Mitigation Center