

Resumen nacional de sequía para 8 septiembre, 2026

Resumen

La sequía y la aridez anormal continuaron extendiéndose o intensificándose esta semana en partes del centro y sur de los Estados Unidos, mientras que las condiciones de sequía repentina persistieron desde gran parte de Texas hacia el noreste hasta el valle medio e inferior del río Misisipi. Las temperaturas más cálidas de lo normal, que oscilaron entre 10 y 15 grados Fahrenheit por encima de lo normal en gran parte de las Grandes Llanuras centrales, el Cinturón del Maíz y Misuri, combinadas con un clima mayormente seco en estas áreas, contribuyeron al empeoramiento de la sequía. El clima mayormente seco también continuó esta semana en Nueva Inglaterra, en partes de la Península Superior de Michigan, a lo largo de partes de la frontera entre Dakota del Norte y Dakota del Sur, en el sureste de Montana y en el suroeste de Colorado, lo que provocó degradación en partes de estas áreas. Por el contrario, cayeron fuertes lluvias desde el sureste de Dakota del Sur hasta el oeste de Iowa y el sur de Minnesota, en el este de Wisconsin, en el norte de Dakota del Norte, en el oeste de Oregón y en partes de las Montañas Rocosas del norte en Montana e Idaho. También se produjeron lluvias fuertes dispersas, localmente de 2 a 3 pulgadas o más, en partes de Pensilvania, Nueva Jersey y Delaware, el este de Carolina del Norte y Florida. La tormenta tropical Edouard y sus remanentes provocaron lluvias torrenciales, con acumulaciones locales de 10 a 15 pulgadas o más, en un estrecho corredor del sureste de Texas. Lowell, en el Pacífico central, causó fuertes lluvias en Niihau, Kauai y Oahu al pasar al oeste de las islas como huracán a principios de esta semana, aliviando la sequía inusual en algunas zonas. Las condiciones continuaron mejorando en áreas localizadas de Puerto Rico esta semana tras las recientes lluvias torrenciales. Mientras que el centro de Estados Unidos lidiaba con una ola de calor a principios de otoño, se registraron temperaturas cercanas o inferiores a lo normal desde la Gran Cuenca hasta el Pacífico.

Noreste

Esta semana se registraron lluvias intensas dispersas en el noreste, especialmente en zonas del extremo norte y suroeste de Nueva York, Pensilvania, el noreste de Virginia Occidental, Nueva Jersey y Delaware. Las mayores precipitaciones se registraron en algunas zonas del centro de Pensilvania, donde cayeron localmente más de 12,7 cm (5 pulgadas). Las lluvias propiciaron una mejoría en la sequía prolongada y la sequedad anormal que afectaban a Pensilvania, Virginia Occidental, Maryland, Delaware y Nueva Jersey, donde disminuyeron los déficits de precipitación y mejoraron los niveles de caudal y humedad del suelo. Por el contrario, la sequía moderada y severa se agudizó en zonas del sur de Maine, Vermont y Nuevo Hampshire, donde los déficits de precipitación aumentaron rápidamente y disminuyeron la humedad del suelo y el caudal. En general, las temperaturas estuvieron cerca o ligeramente por debajo de lo normal en Nueva Inglaterra, mientras que en el oeste de Pensilvania, Virginia Occidental y Virginia superaron los 30 grados o más de lo normal durante la semana.

Sureste

Con una sequía prolongada arraigada en partes de las Carolinas, Virginia, Georgia y Florida, las lluvias localizadas más intensas, o la falta de ellas, influyeron considerablemente en cómo cambiaron las condiciones en el sureste esta semana. Las condiciones se secaron rápidamente en el sur de Virginia y partes del norte y oeste de Carolina del Norte y el norte de Georgia. Las temperaturas también estuvieron entre 5 y 10 grados por encima de lo normal en estas áreas esta semana. Algunas localidades en el este de Carolina del Norte recibieron suficiente lluvia para disminuir el déficit de precipitaciones y aumentar la humedad del suelo. Por el contrario, el clima más seco en partes del centro-sur de Virginia y el oeste de las Carolinas provocó un empeoramiento del déficit de precipitaciones y una disminución del caudal de los arroyos y la humedad del suelo en algunas localidades. Se produjeron mejoras generalizadas en la península de Florida y el sureste adyacente de Georgia tras fuertes lluvias generalizadas, que localmente alcanzaron entre 4 y 6 pulgadas. La sequía restante en el noreste de Florida es principalmente de carácter prolongado, ya que la mayoría de los impactos de la sequía a corto plazo han cesado.

Sur

Gran parte de la región sur continuó secándose rápidamente esta semana en medio de temperaturas mayormente superiores a lo normal y tiempo seco. Algunas excepciones incluyen el sur de Luisiana, el sureste de Texas (donde la antigua tormenta tropical Edouard dejó precipitaciones que superaron localmente las 10 pulgadas) y partes del oeste del Panhandle de Oklahoma, donde se registraron lluvias dispersas con tormentas eléctricas. Se observaron mejoras aisladas de una categoría en el Panhandle de Oklahoma, mientras que en el sureste de Texas se registraron mejoras de una y dos categorías, donde los déficits de precipitación se redujeron o eliminaron por completo, junto con una mejora en la humedad del suelo y el caudal de los arroyos. En otras zonas, el tiempo mayormente seco y las altas temperaturas (de 5 a 15 grados por encima de lo normal) cubrieron una amplia área desde el oeste y el norte de Texas hasta la mayor parte de Oklahoma, Arkansas, el norte de Misisipi y Tennessee. Los déficits de lluvia a corto plazo continuaron aumentando en gran parte de la región, junto con la disminución de los niveles de humedad del suelo y caudal de los arroyos, lo que provocó impactos generalizados de sequía agrícola. Grandes áreas con condiciones degradadas se extendieron desde gran parte de Texas hasta el este de Oklahoma, Arkansas, el norte de Misisipi y partes de Tennessee. El rápido descenso de las temperaturas en Tennessee se produjo tras un periodo reciente de lluvias mucho más intensas, lo que redujo en cierta medida el impacto del calor y la sequía recientes tanto en Tennessee como en el vecino estado de Kentucky.

Medio Oeste

Las condiciones climáticas y la sequía (o la ausencia de ella) fueron variadas en el Medio Oeste esta semana. Las temperaturas en la región fueron más cálidas de lo normal, con la mayor parte de la región terminando la semana al menos 5-10 grados por encima de lo normal, y grandes partes de Iowa, Missouri e Illinois terminando la semana 10-15 grados por encima de lo normal. Las tormentas eléctricas dejaron fuertes cantidades de lluvia, localmente

superando las 5 pulgadas, en el noroeste de Iowa, el sur de Minnesota y el centro-este de Wisconsin. También cayeron lluvias notables de 1-2 pulgadas o más en partes del extremo noreste de Indiana, el sur de la península inferior de Michigan, el centro-oeste de Wisconsin, el norte (especialmente el noroeste) de Minnesota y partes de Ohio. En otros lugares, con algunas excepciones, el clima seco estuvo acompañado de calor, y la mayor parte de Missouri (excluyendo el noroeste), Illinois, Indiana (excluyendo el extremo noreste) y el oeste de Kentucky recibieron poca o ninguna lluvia. La cobertura de sequía moderada, severa y extrema se extendió por el centro-sur y suroeste de Missouri, donde los importantes déficits de precipitación a corto plazo y los déficits de humedad del suelo continuaron acumulándose en medio de la disminución del caudal de los arroyos en algunas áreas. Debido a estas condiciones y a la ola de calor de principios de otoño, se estaban produciendo impactos generalizados de sequía agrícola en el centro-sur y suroeste de Misuri. La sequía moderada a corto plazo también se extendió al noreste de Misuri, donde aumentaron los déficits de lluvia a corto plazo y disminuyeron la humedad del suelo y el caudal de los arroyos. Aunque aún no alcanzaba niveles de sequía, la sequedad anormal se extendió por gran parte de Misuri, el sur de Illinois y el oeste de Kentucky, donde las condiciones se han secado rápidamente debido al patrón climático cálido y seco de las últimas semanas. En el extremo norte de Illinois, el clima cálido y seco de esta semana provocó el desarrollo de una pequeña área de sequía moderada donde los niveles de humedad del suelo han disminuido. Se desarrolló una sequía moderada a corto plazo en partes de la parte oriental de la Península Superior de Michigan, donde los déficits de lluvia a corto plazo se combinaron con bajos niveles de humedad del suelo y caudal de los arroyos. Las fuertes lluvias llevaron a una mejora de las condiciones en el centro-oeste y noroeste de Iowa (y el suroeste adyacente de Minnesota), el centro-este de Wisconsin y el noroeste de Minnesota. La sequía extrema se extendió ligeramente al área de las Ciudades Gemelas, donde aumentaron los déficits de precipitación a corto y mediano plazo.

Altas Llanuras

Las condiciones en la región de las Grandes Llanuras esta semana fueron mixtas. Se registraron lluvias intensas dispersas en el noreste y suroeste de Nebraska, el sureste de Dakota del Sur, el norte de Dakota del Norte y el extremo suroeste de Kansas, lo que provocó mejoras localizadas o generalizadas en estas y áreas vecinas. Sin embargo, las temperaturas en toda la región fueron más cálidas de lo normal, lo que generó una sequedad atmosférica anormalmente alta y un deterioro generalizado de las condiciones en algunas partes de la región. Las temperaturas estuvieron entre 10 y 15 grados por encima de lo normal en Kansas, el este de Nebraska y el sureste de Dakota del Sur. El este de Kansas y el sureste de Nebraska fueron particularmente calurosos y secos esta semana, lo que provocó una gran expansión de la sequía moderada, severa y extrema en el centro-sur y sureste de Kansas, y la aparición de una sequedad anormal en gran parte del noreste de Kansas. El clima inusualmente húmedo de agosto impidió que las condiciones en el sureste de Nebraska se secaran tanto como en las áreas más al sur y sureste. La sequía severa y extrema también se extendió al sureste de Dakota del Norte, donde el clima cálido y seco de esta semana empeoró los déficits de precipitación y las condiciones de humedad del suelo. Las condiciones de sequía mejoraron en el sureste de Dakota del Sur y el extremo noreste adyacente de

Nebraska, donde cayeron precipitaciones de 2 a 5 pulgadas. En algunas zonas del norte de Dakota del Norte cayeron cantidades similares de lluvia, lo que mejoró la humedad del suelo y el caudal de los arroyos, y alivió la sequía. En partes del suroeste de Nebraska, en la región del Panhandle de Nebraska y en el noreste adyacente de Colorado, cayeron lluvias intensas de entre 2,5 y 7,5 cm, lo que redujo el déficit de precipitaciones y mejoró la sequía.

Oeste

La mayor parte de California, Oregón, Washington e Idaho registraron temperaturas inferiores a lo normal esta semana, con algunas zonas del norte de California y el sur de Oregón terminando la semana entre 10 y 15 grados por debajo de lo normal. Por el contrario, las zonas orientales de Nuevo México y Montana fueron más cálidas de lo normal, con temperaturas en la mayoría de las áreas entre 5 y 10 grados por encima de lo normal. Se registraron precipitaciones generalizadas de moderadas a intensas desde el norte de California a través de partes de Oregón, el centro y norte de Idaho y el oeste y norte de Montana. Las cantidades de precipitación en el oeste de Montana y el norte de Idaho oscilaron entre 2 y 6 pulgadas. Esto provocó un aumento de la humedad del suelo y del caudal de los arroyos, y redujo los déficits de precipitación a corto y largo plazo, y la extensión de la sequía moderada y severa y la sequedad anormal disminuyó en algunas zonas. Las precipitaciones también mejoraron las condiciones en el centro-sur de Oregón, ya que la gravedad de los déficits de precipitación a largo plazo disminuyó. Los déficits de precipitación a largo plazo aumentaron en medio de la escasez de agua subterránea y humedad del suelo en el centro-sur de Nevada, lo que provocó un aumento de la extensión de la sequía severa en esa zona. En el sureste de Montana, el clima cálido y seco provocó una disminución del caudal de los arroyos y de la humedad del suelo en algunas zonas, lo que conllevó una expansión localizada de la sequía severa y extrema.

Caribe

En algunas zonas del centro, centro-norte y oeste de Puerto Rico cayeron precipitaciones de entre 25 y 125 mm. Esto contribuyó a mejorar la sequía severa y moderada, así como la sequedad anormal en las zonas central y centro-norte de la isla. Las recientes lluvias también permitieron una leve mejoría en la sequía extrema del sureste de Puerto Rico.

Esta semana, el patrón atmosférico dominante cambió, pasando de la influencia de los remanentes del huracán Dolly a principios de semana a un régimen de vientos alisios del sureste. Esto trajo chubascos pasajeros y tormentas aisladas, seguidos de un aire ligeramente más seco el 8 de septiembre. Si bien las lluvias de esta semana fueron beneficiosas en algunas zonas, no fueron suficientes para aliviar la sequía extrema persistente, en particular el importante déficit de agua subterránea observado en los pozos de monitoreo.

St. Croix experimentó precipitaciones muy variables esta semana. La estación NWS/NOAA en East Hill registró 0.10 pulgadas. La red CoCoRaHS registró 0.14 pulgadas en Christiansted 1.6 E (VI-SC-10), 0.11 pulgadas en Frederiksted 1.7 ESE (VI-SC-20), 0.44 pulgadas en Christiansted 6.5 W (VI-SC-23), 0.20 pulgadas en Christiansted 1.7 SW (VI-SC-30), 1.14

pulgadas en Frederiksted 1.9 NE (VI-SC-34) y 0.88 pulgadas en Frederiksted 1.3 ENE (VI-SC-35). Por lo tanto, las precipitaciones reportadas variaron de 0.10 a 1.14 pulgadas, con la mayor cantidad ocurriendo en el área de Frederiksted. Estas observaciones indican que las precipitaciones fueron localmente sustanciales, pero distribuidas de manera desigual en toda la isla. A pesar de las lluvias, las condiciones del agua subterránea siguieron siendo muy precarias. En el pozo Adventure 28, el nivel del agua el 8 de septiembre era de 25,66 pies, en comparación con los 18,67 pies del 8 de septiembre de 2025, lo que indica que el nivel del agua era aproximadamente 6,99 pies inferior al del año anterior. Estas condiciones indican una sequía extrema persistente.

Esta semana, St. John experimentó lluvias localmente significativas, aunque las observaciones disponibles son limitadas. La estación Rafe Boulon (VI-SJ-3) en Windswept Beach registró 1.47 pulgadas, mientras que la estación CoCoRaHS VI-SJ-5 en Cruz Bay 1.6 E registró 1.04 pulgadas. Ambas estaciones midieron más de 1 pulgada de lluvia, lo que indica que algunas zonas de St. John recibieron una cantidad beneficiosa de precipitación durante la semana. Sin embargo, la situación del agua subterránea siguió siendo mucho menos favorable. En el pozo Susannaberg DPW 3, el nivel del agua el 8 de septiembre se midió en 18.64 pies por debajo de la superficie del terreno, en comparación con 10.14 pies el 8 de septiembre de 2025. Esta diferencia de 8.50 pies indica que el nivel del agua subterránea es sustancialmente más profundo ahora que hace un año. Las observaciones mostraron que la profundidad continuó aumentando con respecto a la semana anterior, y St. John permanece en condiciones de sequía extrema.

St. Thomas observó una variabilidad significativa en las precipitaciones esta semana. Si bien el Aeropuerto Cyril E. King no registró lluvia, la estación VI-ST-5 de CoCoRaHS en Charlotte Amalie West 4.2 ONO midió 1.19 pulgadas, y la estación VI-ST-15 en Charlotte Amalie West 1.3 N registró 0.51 pulgadas. Esto muestra un rango de precipitaciones de 0.00 a 1.19 pulgadas. El 8 de septiembre, los niveles de agua subterránea estaban en 9.76 pies, ligeramente por encima de los 9.88 pies de la semana anterior. Sin embargo, esto sigue siendo mucho más alto que los 7.77 pies registrados el 8 de septiembre de 2025, lo que significa que está aproximadamente 1.99 pies más profundo que el año pasado. A pesar de la leve mejora en la profundidad del agua subterránea esta semana, St. Thomas continúa experimentando condiciones de sequía extrema.

Pacífico

Las lluvias caídas esta semana en la región central del Interior propiciaron cierta mejoría en las zonas que experimentaban una sequía anormal. El clima más seco de lo normal continuó en el sureste de Alaska, donde persistió una sequía moderada a corto plazo. En algunas zonas del centro y oeste de Alaska se registraron precipitaciones superiores a lo normal, llegando algunas áreas a recibir al menos el 150 % de la precipitación habitual. El centro-sur de Alaska y las Islas Aleutianas registraron precipitaciones más secas de lo normal esta semana, con algunas zonas recibiendo menos de la mitad de su precipitación semanal habitual. Las temperaturas en la mayor parte de Alaska se mantuvieron generalmente dentro de los 5 grados de lo normal (con algunas excepciones). Las temperaturas tendieron a ser

más frías de lo normal en el centro y norte de Alaska y más cálidas de lo normal en el sureste de Alaska y las Islas Aleutianas.

Se registraron fuertes lluvias en algunas zonas de Niihau, Kauai y Oahu tras el paso del centro de Lowell al oeste de las islas. La sequía anormal cesó en Kauai y Oahu tras el paso de Lowell, mientras que también mejoró en el sur del centro de Maui. Asimismo, se registraron precipitaciones superiores a lo normal en algunas zonas de la Isla Grande de Hawái, especialmente en los extremos centro-este y sureste de la isla.

Las condiciones sinópticas en las Islas Marshall se caracterizaron por humedad tropical y convergencia localizada, lo que produjo chubascos intermitentes, pero una considerable variabilidad en las precipitaciones entre las islas. Las precipitaciones fueron generalmente adecuadas entre el 2 y el 8 de septiembre, aunque se mantuvieron variables entre las estaciones. Esta semana, Ailinglapalap recibió 1,60 pulgadas, Jaluit 0,20 pulgadas, Kwajalein 3,51 pulgadas, Majuro 2,28 pulgadas, Mili 1,62 pulgadas, Utirik 0,78 pulgadas y Wotje 2,10 pulgadas. El aumento de las precipitaciones en Kwajalein, Majuro y Mili indica condiciones de humedad generalmente favorables, y todas las estaciones permanecen libres de sequía. Jaluit experimentó una segunda semana seca, y Utirik recibió precipitaciones limitadas pero suficientes para mantenerse libre de sequía. Sin embargo, se debe monitorear la persistencia de la sequía en ambas localidades ante la posible aparición de condiciones anormalmente secas.

Los Estados Federados de Micronesia (EFM) experimentaron precipitaciones generalmente adecuadas esta semana, con la mayoría de las estaciones recibiendo entre aproximadamente 1,8 y 3,1 pulgadas. Esta semana, la laguna de Chuuk recibió 0,19 pulgadas (falta 1 día), Kapingamarangi 1,97 pulgadas, Kosrae 4,18 pulgadas, Lukunor 3,05 pulgadas, Nukuoro 1,88 pulgadas, Ulithi 1,84 pulgadas, Pohnpei 2,29 pulgadas, Woleai 2,43 pulgadas y Yap 0,14 pulgadas. Chuuk también había recibido 2,84 pulgadas durante la semana anterior, mientras que Kapingamarangi permaneció anormalmente seco (D0-S) después de al menos dos semanas de sequía, pero mostró cierta mejoría gracias a las lluvias recientes. Fananu y Pingelap no tenían datos. Las condiciones sinópticas favorecieron la convección periódica y los chubascos en un ambiente tropical húmedo, con precipitaciones generalmente suficientes para mantener condiciones libres de sequía en todo el EFM, aunque Yap y Chuuk recibieron considerablemente menos lluvia esta semana.

Samoa Americana continuó experimentando precipitaciones insuficientes y condiciones de sequía persistentes. Las condiciones sinópticas estuvieron dominadas por los vientos alisios y la convergencia localizada, lo que produjo chubascos dispersos, pero no suficientes precipitaciones generalizadas o persistentes para aliviar el déficit de humedad existente. Esta semana, Pago Pago recibió 0,23 pulgadas, Siufaga Ridge 0,4 pulgadas y Toa Ridge 0,65 pulgadas. Si bien Toa Ridge recibió algo más de lluvia, las precipitaciones se mantuvieron localizadas e insuficientes para aliviar significativamente la sequía. Las tres estaciones permanecen en condiciones de sequía moderada a corto plazo.

Palaos experimentó un déficit de precipitaciones severo y continuo esta semana. Las condiciones sinópticas fueron desfavorables para lluvias significativas, con convección reducida y condiciones relativamente estables que limitaron el desarrollo de chubascos sobre

pulgadas. Esto representó una segunda semana consecutiva sin lluvia, y la condición de sequía se ha deteriorado, pasando de una sequía anormal a una sequía a corto plazo (D1-S) en ambas localidades. Las observaciones semanales de lluvia también indicaron que Koror experimentó condiciones secas durante seis de las últimas siete semanas, mientras que Airai también experimentó sequía persistente en las últimas semanas.

Esta semana, las Islas Marianas recibieron precipitaciones generalmente adecuadas, aunque fueron muy localizadas. Las condiciones sinópticas favorecieron la convección activa y lluvias intensas localizadas, especialmente en Guam, donde la mayor humedad y convergencia produjeron la lluvia de 7,8 cm (3,07 pulgadas) el 6 de septiembre. Las lluvias excepcionalmente intensas en Guam representaron la mayor parte del total semanal de la isla. Esta semana, Guam recibió 10,4 cm (4,09 pulgadas), incluyendo 7,8 cm (3,07 pulgadas) el 6 de septiembre; Rota recibió 6,7 cm (2,67 pulgadas); Saipán recibió 3,2 cm (1,24 pulgadas); y Tinian recibió 0,97 cm (0,38 pulgadas) (faltan 5 días de datos). Las precipitaciones fueron suficientes para mantener condiciones libres de sequía en las cuatro localidades.

Mirando hacia el futuro

Desde la tarde del miércoles 9 de septiembre hasta el lunes 14 de septiembre, el Centro de Predicción Meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional pronostica tiempo mayormente seco en el Oeste y en la mitad occidental de las Grandes Llanuras, excepto en partes del centro-norte de Idaho hacia el este a través de Montana hasta Dakota del Norte, donde se pronostican más de 0.75 pulgadas de precipitación en la mayoría de las áreas. Las partes orientales de Dakota del Sur, Nebraska, Kansas y Oklahoma también podrían recibir 0.75 pulgadas o más de lluvia, con algunas partes del este de Kansas y el oeste de Missouri pronosticando recibir 1.5 pulgadas de lluvia o más. Gran parte del norte de Iowa, Minnesota, el noroeste de Wisconsin y la península superior occidental de Michigan pronostican recibir al menos 1.5 pulgadas de lluvia. También son probables cantidades de lluvia iguales o superiores a 0.75 pulgadas en partes del valle del río Ohio, el sur del Atlántico Medio, el sureste de Luisiana y partes del sur de Misisipi, Alabama, el norte de Georgia y las Carolinas. Partes de la península de Florida podrían recibir entre 1.5 y 4 pulgadas de lluvia. En general, se pronostica un clima más seco, con excepciones locales, en Texas, la península inferior de Michigan, el norte de Illinois, Indiana y Ohio, y el sur de Nueva Inglaterra.

Para el 15-19 de septiembre, el Centro de Predicción Climática del Servicio Meteorológico Nacional pronostica precipitaciones superiores a lo normal para gran parte de los Estados Unidos continentales, especialmente en los estados de las Cuatro Esquinas. Se prevén precipitaciones cercanas a lo normal cerca de la costa del Golfo y en partes del centro y norte de California y Nevada, así como en el este de Oregón y Washington. Se prevén precipitaciones inferiores a lo normal en las partes occidentales de Oregón y Washington. Se prevén temperaturas superiores a lo normal en gran parte del sur y este de los Estados Unidos, especialmente en el sureste. Se prevén temperaturas inferiores a lo normal en Dakota del Norte, el norte de Dakota del Sur, el noroeste de Minnesota y la mayor parte de Montana. Se prevén precipitaciones y temperaturas superiores a lo normal en Hawái. En Alaska, se

prevén temperaturas superiores a lo normal en todo el estado. Se prevén precipitaciones superiores a lo normal en la mayor parte de Alaska, aunque es más probable que se produzcan precipitaciones inferiores a lo normal en el sureste de Alaska, y se prevén precipitaciones cercanas a lo normal en las islas Aleutianas centrales.

Autor(s)

Curtis Riganti, National Drought Mitigation Center

Tsegaye Tadesse, National Drought Mitigation Center