

Resumen nacional de sequía para 15 septiembre, 2026

Resumen

La semana pasada, varias zonas registraron precipitaciones significativas. Una de ellas abarcaba Iowa, el este de Nebraska y Kansas, y el noroeste de Misuri, donde cayeron más de 10 cm en el centro de Iowa y el sureste de Kansas. Otra zona se centraba en Ohio, Virginia Occidental y el oeste de Pensilvania, donde ya existían condiciones de humedad. Gran parte de Florida y la costa del Golfo recibieron entre 5 y 10 cm de precipitación la semana pasada. La mayor parte del suroeste de Estados Unidos recibió poca lluvia, con la excepción de precipitaciones monzónicas dispersas a lo largo de la frontera entre Nuevo México y Arizona. La mayor parte de Texas y Oklahoma continuaron secas, al igual que la mayor parte de las Grandes Llanuras occidentales.

Las temperaturas en las Grandes Llanuras del sur y el valle inferior del Misisipi continuaron siendo muy cálidas, en algunas zonas superando los 5 °C por encima de lo normal. En la mayor parte del resto del territorio continental de Estados Unidos también se registraron temperaturas superiores a lo normal. Las únicas zonas con temperaturas inferiores a lo normal durante la última semana fueron el norte de Nueva Inglaterra y la mayoría de los estados del noroeste.

Noreste

La zona que abarca desde el norte de Nueva Jersey hasta Cape Cod, a lo largo de la costa sur de Nueva Inglaterra, experimentó una franja de lluvias importantes la semana pasada. Desafortunadamente, estas lluvias no llegaron donde más se necesitaban. Gran parte de Maine sufrió un empeoramiento de las condiciones de sequía, con sequía persistente. Se declaró una zona de sequía extrema a lo largo de la costa de Maine, con bajos caudales en los ríos y niveles bajos en los pozos. Otra zona donde llovió en lugares que no presentan sequía anormal fue Virginia Occidental y el oeste de Pensilvania.

Sureste

La semana pasada, el centro de Virginia registró lluvias moderadas, lo que contribuyó a una ligera mejoría de la sequía. Sin embargo, la mayor parte de las Carolinas y Georgia experimentaron un clima cálido y seco, lo que provocó un empeoramiento regional de las condiciones de sequía. En Florida, el clima fue generalmente húmedo y se observó una mejoría de la sequía en pequeñas áreas del norte, centro y sur del estado. Mientras tanto, Alabama continuó experimentando temperaturas superiores a lo normal y escasas precipitaciones en el centro y norte, lo que provocó un empeoramiento de la sequía en amplias zonas. Persisten algunas áreas de sequía extrema en el norte de Carolina del Norte, en las zonas costeras de Carolina del Sur y del Norte, y en pequeñas áreas de Florida.

Sur

Las temperaturas extremadamente superiores a lo normal persistieron en esta región durante la última semana. Casi todas las zonas experimentaron un empeoramiento de la sequía, con la excepción del norte de Arkansas, el noreste de Oklahoma y la costa de Misisipi. Gran parte de Texas y la región de Ark-La-Tex sufrieron sequías repentinas. Además del calor, estas zonas recibieron escasas precipitaciones durante la semana. Se registraron condiciones de sequía extrema a excepcional en el extremo sur de Texas, la mayor parte del norte de Texas, el oeste y el sur de Oklahoma, el noroeste y el noreste de Arkansas, y a lo largo de la frontera entre Arkansas y Misisipi.

Medio Oeste

Se registraron precipitaciones significativas en el oeste de Kentucky y en el centro y norte de Misuri, lo que contribuyó a la desaparición de la sequía. También se produjeron fuertes lluvias en el noroeste de Iowa, el norte de Minnesota y una franja en el centro de Wisconsin, lo que resultó en una mejoría de la sequía en estas zonas. Por otro lado, una semana prácticamente sin lluvias en el norte de Illinois e Indiana provocó la aparición de una zona de sequía anormal. Se observan condiciones de sequía extrema en el sur de Misuri, el norte de Wisconsin y a lo largo de la frontera de Minnesota con Wisconsin y Dakota del Norte.

Altas Llanuras

El este de Kansas registró precipitaciones superiores a lo normal la semana pasada, lo que contribuyó a una mejoría en las condiciones de sequía en la zona. El este de Nebraska y el este de Dakota del Sur también recibieron lluvias decentes, lo que resultó en una mejoría de la sequía. Otras zonas de Dakota del Sur que no recibieron lluvias experimentaron un empeoramiento de la sequía. Colorado presentó un empeoramiento de la sequía en la parte central del estado, con mejoras en las zonas suroeste y sureste. La sequía extrema persiste en gran parte de Colorado y Wyoming, el oeste de Nebraska y las Dakotas, y en el este de Dakota del Norte. Se observa una sequía excepcional en gran parte del centro de Colorado, así como en dos zonas localizadas del extremo oeste de Nebraska.

Oeste

Una zona que abarca desde el suroeste de Oregón hasta el centro de Washington, incluyendo el norte de Idaho y Montana, recibió algunas lluvias bienvenidas durante la semana. Estas lluvias propiciaron una mejoría regional en las condiciones de sequía. Una de las zonas que no se benefició fue el noroeste de Washington, en la frontera con Canadá, donde se observó un empeoramiento de la sequía y continuos bajos caudales en los ríos. También hubo zonas en la frontera entre California y Nevada, y en el centro de Arizona, con deterioro de la sequía y escasas o nulas precipitaciones. Se observa una sequía extrema en gran parte del centro de Oregón, el centro de Utah, el sur de Idaho y el norte de Nevada, así como en pequeñas áreas del norte de Washington y el sur de Arizona. La sequía excepcional persiste en el sur de Idaho, el norte de Nevada y el noreste de Oregón.

Caribe

En Puerto Rico, algunas zonas experimentaron fuertes lluvias la semana pasada, lo que alivió la sequía. Se necesitarán más precipitaciones para paliar la sequía extrema en el noreste y en la costa central y sur.

St. Croix experimentó lluvias muy variables y ligeras esta semana. La estación NWS/NOAA en East Hill registró 0.13 pulgadas. La red CoCoRaHS registró 0.48 pulgadas en Christiansted 1.6 E (VI-SC-10), 0.07 pulgadas en Frederiksted 1.7 ESE (VI-SC-20) y Christiansted 6.5 W (VI-SC-23), 0.18 pulgadas en Christiansted 1.7 SW (VI-SC-30), 0.70 pulgadas en Frederiksted 1.9 NE (VI-SC-34) y 0.12 pulgadas en Frederiksted 1.3 ENE (VI-SC-35). Por lo tanto, la lluvia reportada varió de 0.07 a 0.80 pulgadas, con la mayor cantidad ocurriendo en el área de Christiansted. Las condiciones del agua subterránea continuaron siendo muy malas. En el pozo Adventure 28, el nivel del agua el 15 de septiembre era de 25,85 pies, en comparación con los 18,62 pies del 15 de septiembre de 2025, lo que indica que el nivel del agua era aproximadamente 7,2 pies más bajo que el año anterior. Estas condiciones indican una sequía extrema a corto plazo continua (D3-S).

Esta semana, St. John experimentó escasas lluvias, aunque las observaciones disponibles son limitadas. La estación Rafe Boulon (VI-SJ-3) en Windswept Beach registró 0.3 pulgadas, mientras que la estación CoCoRaHS VI-SJ-5 en Cruz Bay 1.6 E registró 0.38 pulgadas y la estación VI-SJ-10 en Cruz Bay 3.1 NNW registró 0.5 pulgadas. Ninguna de las estaciones midió más de media pulgada de lluvia. En el pozo Susannaberg DPW 3, el nivel del agua el 15 de septiembre se midió en 18.73 pies por debajo de la superficie del terreno, en comparación con 12.68 pies el 15 de septiembre de 2025. Esta diferencia de 6.10 pies indica que el nivel del agua subterránea es sustancialmente más profundo ahora que hace un año. Las observaciones mostraron que la profundidad continuó aumentando con respecto a la semana anterior, y St. John permanece en condiciones de sequía extrema a corto plazo (D3-S).

St. Thomas observó una variabilidad significativa en las precipitaciones esta semana. Si bien el Aeropuerto Cyril E. King no registró precipitaciones, la estación VI-ST-5 de CoCoRaHS en Charlotte Amalie West 4.2 ONO midió 1.01 pulgadas y la estación VI-ST-15 en Charlotte Amalie West 1.3 N registró 0.43 pulgadas. Esto muestra un rango de precipitaciones de 0.00 a 1.01 pulgadas. El 15 de septiembre, los niveles de agua subterránea estaban en 8.41 pies, un aumento con respecto a los 9.76 pies de la semana anterior y casi igual a los 8.22 pies en esta misma fecha del año pasado el 15 de septiembre de 2025. A pesar de la mejora de esta semana en la profundidad del agua subterránea, los indicadores de precipitación de 3 a 12 meses muestran que persisten grandes déficits de precipitación y St. Thomas continúa experimentando condiciones de sequía extrema a corto plazo (D3-S).

Pacífico

En Alaska, también se excluyeron las zonas con condiciones anormalmente secas, basándose en las recientes lluvias registradas en la parte sureste del territorio continental.

En Hawái, las precipitaciones procedentes de los restos y las bandas exteriores de los sistemas tropicales provocaron la desaparición de las condiciones de sequía anormales en las

islas de Maui y M o l o k a » i

Las condiciones en las Islas Marshall trajeron chubascos intermitentes y fuertes lluvias a la mayoría de las islas esta semana (del 9 al 15 de septiembre). Esta semana, todas excepto Utirik (1,74 pulgadas) recibieron más de 3 pulgadas de lluvia, con Ailinglapalap registrando 6,41 pulgadas, Jaluit 4,13 pulgadas, Kwajalein 5,84 pulgadas, Majuro 3,87 pulgadas, Mili 4,23 pulgadas y Wotje 3,54 pulgadas. Si bien Utirik recibió 1,74 pulgadas esta semana, esto se produce después de varias semanas de demanda de precipitación insuficiente, lo que provocó la introducción de una sequía anormal a corto plazo (D0-S).

Los Estados Federados de Micronesia experimentaron lluvias generalmente buenas esta semana, con la mayoría de las estaciones recibiendo de 2 a 6 pulgadas. Esta semana, la laguna de Chuuk recibió 2,39 pulgadas (1 día faltante), Kapingamarangi 0,98 pulgadas, Kosrae 2,16 pulgadas (2 días faltantes), Lukunor 5,91 pulgadas (2 días faltantes), Nukuoro 1,88 pulgadas, Ulithi 3,34 pulgadas (2 días faltantes), Pohnpei 5,81 pulgadas, Woleai 4,19 pulgadas (1 día faltante) y Yap 2,23 pulgadas (1 día faltante). Kapingamarangi permaneció en sequía anormal a corto plazo (D0-S) después de al menos tres semanas de sequía, pero mostró cierta mejoría gracias a las lluvias recientes. Fananu y Pingelap no tenían datos.

Samoa Americana recibió esta semana lluvias muy necesarias y beneficiosas tras varias semanas de sequía. Pago Pago registró 2,68 pulgadas (faltó un día para el registro), Siufaga Ridge 6,56 pulgadas y Toa Ridge 5,43 pulgadas. A pesar de las abundantes lluvias de esta semana, persisten condiciones de sequía moderada a corto plazo, aunque se esperan más precipitaciones en las próximas semanas.

Palaos experimentó otra semana de precipitaciones insuficientes y permanece en sequía moderada a corto plazo (D1-S). Esta semana, tanto Koror como WSO Palaos/Airai registraron 1,87 pulgadas de lluvia. Si bien esta semana se registraron más precipitaciones, esto ocurrió después de dos semanas consecutivas de sequía.

Esta semana, las Islas Marianas recibieron precipitaciones generalmente adecuadas. Las condiciones sinópticas favorecieron la convección activa y lluvias localmente intensas, particularmente sobre Guam, que recibió un promedio de 2.7 pulgadas esta semana, con el Aeropuerto Internacional Antonio B. Won Pat registrando 4.49 pulgadas, Agat registrando 3.19 pulgadas y Dededo registrando 3.13 pulgadas (faltan 2 días). Saipán promedió más de 3.18 pulgadas esta semana, con el Aeropuerto Internacional de Saipán registrando 3.41 pulgadas y Capital Hill registrando 2.95 pulgadas esta semana. Rota recibió 2.54 pulgadas esta semana, con el total mensual de septiembre ya superando las 4 pulgadas necesarias (4.52 pulgadas). Tinian solo registró precipitaciones mínimas (0.06 pulgadas), aunque no hubo datos para 6 de los 7 días de esta semana. Todas las islas permanecen libres de sequía.

Mirando hacia el futuro

Durante los próximos cinco días, hasta el martes siguiente, se pronostican lluvias superiores a lo normal en el sur de Florida, así como en una amplia zona del sur de Wisconsin y Minnesota, extendiéndose hasta el este de Iowa y el norte de Illinois. Esta última zona de lluvias pronosticadas se extiende hacia el este a través del centro de Michigan, la región sur de los

Grandes Lagos, Pensilvania, Nueva York y gran parte del centro y sur de Nueva Inglaterra. Otras zonas con pronóstico de lluvias para esta semana son los Montes Apalaches, las Grandes Llanuras occidentales y los estados de las Cuatro Esquinas. Desafortunadamente, se pronostica que la mayor parte de Texas, Oklahoma, Arkansas, Luisiana, Misisipi y Alabama recibirán pocas lluvias. También se pronostican condiciones secas en California, Nevada y Washington. Se pronostica que las temperaturas muy superiores a lo normal continuarán esta semana en el centro y sur de Estados Unidos.

El pronóstico para los próximos 6 a 10 días (del 22 al 26 de septiembre de 2026) indica que las temperaturas se mantendrán por encima de lo normal en casi todo el territorio continental de Estados Unidos. Las zonas con mayor probabilidad de temperaturas superiores a lo normal son, nuevamente, el sur y el sureste, así como el extremo norte. Es probable que Hawái también registre precipitaciones superiores a lo normal. En cuanto a las precipitaciones, es probable que la costa este y el suroeste registren lluvias superiores a lo normal. El centro de Estados Unidos y el medio oeste superior probablemente registren precipitaciones inferiores a lo normal. Es probable que Hawái y Alaska registren lluvias superiores a lo normal durante este período.

Autor(s)

David Mocko, SSAI/NASA/GSFC

Lindsay Johnson, National Drought Mitigation Center