

Resumen nacional de sequía para 22 septiembre, 2026

Resumen

El patrón de calor y sequedad en el sur con fuertes lluvias al norte del sistema de alta presión continuó durante la semana pasada. Las mayores cantidades de precipitación se registraron desde el este de Iowa y el sureste de Minnesota hacia el este, pasando por el sur de Wisconsin, el norte de Illinois, hasta Ohio y Virginia Occidental. Áreas localizadas en esta región recibieron de 6 a 8 pulgadas de lluvia. El noreste de Kansas y el norte de Misuri recibieron de 3 a 5 pulgadas, mientras que el oeste de Nebraska hasta el sureste de Montana recibieron de 2 a 3 pulgadas. También cayeron lluvias monzónicas en el este de Arizona hasta el centro de Nuevo México. El sur de Florida también recibió varias pulgadas de lluvia durante la semana. Sin embargo, la precipitación fue muy dispersa y generalmente ligera en Texas, Oklahoma, Luisiana, Arkansas, el sur de Misuri y el oeste de Tennessee y Kentucky. La mayoría de los estados de la costa oeste tuvieron poca lluvia.

La mayor parte del sur registró nuevamente temperaturas entre 5 y 10 grados Fahrenheit por encima de lo normal la semana pasada, alcanzando picos de más de 15 grados Fahrenheit en algunas zonas del sur de Misuri. Varios estados están batiendo récords de calor persistente durante este período de finales de verano a principios de otoño. El resto de los Estados Unidos continentales tuvo temperaturas generalmente cercanas a lo normal.

Noreste

Las lluvias más intensas en esta región se registraron en Pensilvania y Virginia Occidental. Durante la última semana, se observaron precipitaciones dispersas de menor intensidad en el noreste, lo que contribuyó a mejorar las condiciones de sequía y sequedad extrema en algunas zonas. A lo largo de la costa de Maine se encuentra una zona de sequía extrema.

Sureste

Persistieron las altas temperaturas y la sequía en la mayor parte del sureste. Se registraron descensos en las condiciones climáticas desde el sureste de Virginia hasta el este y centro de las Carolinas, llegando incluso a Georgia y Alabama. Mientras tanto, la mayor parte de Florida experimentó lluvias, lo que conllevó mejoras, especialmente en el sureste del estado. También se observaron leves mejoras en el noroeste de Florida y en el norte de Carolina del Sur gracias a lluvias moderadas localizadas. Persiste una sequía excepcional en el norte de Carolina del Norte, con zonas de sequía extrema desde el sur de Virginia hasta el centro de Florida.

Sur

El calor y la sequedad persistentes provocaron una degradación generalizada del suelo la semana pasada. Se registra una sequía extrema en todos los estados de esta región, con una sequía excepcional en gran parte del norte de Texas, el oeste y el sur de Oklahoma, y algunas

zonas de Arkansas. Tanto la sequía a corto como a largo plazo contribuyen a las condiciones de esta región. Durante el último año, el centro-oeste de Oklahoma ha sido la zona más seca registrada, mientras que el suroeste de Oklahoma ha sido la segunda más seca.

Medio Oeste

El sur de Misuri experimentó un clima generalmente cálido y seco la semana pasada, con un empeoramiento de las condiciones de sequía en gran parte de la región. Sin embargo, el norte de Misuri registró lluvias, lo que contribuyó a una mejoría en las condiciones de sequía. El sur de Minnesota, el este de Iowa, el sur de Wisconsin y el norte de Minnesota recibieron precipitaciones significativas, con más de 20 centímetros (8 pulgadas) en el noreste del condado de Grant, Wisconsin. Por lo tanto, las condiciones de sequía mejoraron en estas áreas. El norte de Wisconsin, por otro lado, estuvo seco, con un empeoramiento localizado y la aparición de una pequeña zona de sequía excepcional.

Altas Llanuras

La mayor parte de las Grandes Llanuras recibió lluvias beneficiosas, lo que mejoró la situación de sequía en algunas zonas de todos los estados de la región. Sin embargo, se necesitarán más precipitaciones para paliar la sequía extrema que persiste en gran parte de Colorado y Wyoming, así como en partes de Montana, Dakota del Norte y del Sur, y el oeste de Nebraska. Aún se registran zonas de sequía excepcional en gran parte del centro de Colorado y el oeste de Nebraska.

Oeste

El este de Arizona y el centro de Nuevo México sufrieron tormentas monzónicas que causaron inundaciones localizadas y cierta mejoría en la sequía. El sur de California y el sur de Nevada continuaron secos, lo que provocó un empeoramiento de su categoría. El centro de Utah, el centro de Oregón, el sur de Idaho y el norte de Nuevo México siguen siendo las zonas más extensas con sequía extrema a excepcional en esta región, con áreas más pequeñas de sequía extrema en algunos otros estados.

Caribe

Una fuerte onda tropical azotó Puerto Rico la semana pasada, trayendo consigo las tan necesarias lluvias. La mayor parte de la región experimentó una mejoría en las condiciones de sequía, con una mayor vegetación y humedad del suelo. Sin embargo, en algunas zonas, el caudal de los ríos sigue siendo inferior al normal.

St. Croix experimentó precipitaciones muy variables esta semana. La estación NWS/NOAA en East Hill registró 0.61 pulgadas. La red CoCoRaHS registró 0.87 pulgadas en Christiansted 1.6 E (VI-SC-10), 0.68 pulgadas en Frederiksted 1.7 ESE (VI-SC-20), 0.67 pulgadas en Christiansted 6.5 W (VI-SC-23), 0.82 pulgadas en Christiansted 1.7 SW (VI-SC-30), 1.27 pulgadas en Frederiksted 1.9 NE (VI-SC-34) y 1.07 pulgadas en Frederiksted 1.3 ENE (VI-SC-

35). La mayor cantidad se registró en el área de Frederiksted. Las condiciones del agua subterránea se mantuvieron muy deficientes. En el pozo Adventure 28, el nivel del agua el 12 de septiembre era de 26,1 pies, en comparación con los 18,31 pies del 22 de septiembre de 2025, lo que indica que el nivel del agua era aproximadamente 7,8 pies más bajo que el año anterior. Estas condiciones indican una sequía extrema a corto plazo continua (D3-S).

Esta semana, St. John experimentó escasas lluvias aunque las observaciones disponibles son limitadas. La estación Rafe Boulon (VI-SJ-3) en Windswept Beach registró 0.21 pulgadas, mientras que la estación CoCoRaHS VI-SJ-5 en Cruz Bay 1.6 E registró 0.32 pulgadas y la estación VI-SJ-10 en Cruz Bay 3.1 NNW registró 0.03 pulgadas. Ninguna de las estaciones midió más de 0.3 pulgadas de lluvia. En el pozo Susannaberg DPW 3, el nivel del agua el 22 de septiembre se midió en 18.93 pies por debajo de la superficie del terreno, en comparación con 11.2 pies el 22 de septiembre de 2025. Esta diferencia de 7.7 pies indica que el nivel del agua subterránea es sustancialmente más bajo ahora que hace un año. Las observaciones mostraron que la profundidad continuó bajando desde la semana anterior, así como los indicadores de precipitación de 1 a 12 meses que muestran déficits de precipitación crecientes. Un episodio de fuertes lluvias que dejó entre 3,8 y 5 cm de lluvia en la isla a principios de septiembre mantiene a St. John en condiciones de sequía extrema a corto plazo (D3-S), aunque las condiciones se están encaminando hacia una sequía excepcional (D4-S) si no se producen lluvias beneficiosas en las próximas una o dos semanas.

St. Thomas recibió poca lluvia significativa esta semana. Si bien el Aeropuerto Cyril E. King no registró lluvia, la estación VI-ST-5 de CoCoRaHS en Charlotte Amalie West 4.2 WNW midió 0.31 pulgadas y la estación VI-ST-15 en Charlotte Amalie West 1.3 N registró 0.09 pulgadas. Esto continúa con semanas de condiciones secas. El 22 de septiembre, los niveles del pozo de la Escuela Primaria 3 estaban en 8.97 pies, ligeramente por debajo de los 8.4 pies de la semana anterior y 3.2 pies más bajo que en esta misma fecha del año pasado el 22 de septiembre de 2025 (5.75 pies). La combinación de bajos niveles en los pozos, varias semanas con poca o ninguna lluvia e indicadores de precipitación de 1 a 9 meses que muestran grandes déficits de precipitación y St. Thomas, las condiciones se degradaron a sequía excepcional a corto plazo (D4-S).

Pacífico

Las precipitaciones moderadas registradas en algunas zonas de Alaska provocaron una reducción de las regiones anormalmente secas del estado.

Hawái se está recuperando lentamente de los sistemas tropicales que pasaron cerca, y existe la posibilidad de que otro sistema se acerque a las islas durante la próxima semana.

Las condiciones en las islas Marshall trajeron chubascos intermitentes y fuertes lluvias en las islas del norte, manteniendo las condiciones sin cambios. Esta semana, Utirik y Wotje registraron 1,75 y 2,58 pulgadas respectivamente, aunque Ulirik todavía tiene un déficit de precipitación y solo ha registrado un poco más de la mitad (4,27 pulgadas) de las 8 pulgadas necesarias por mes. Por otra parte, después de las fuertes lluvias de la semana pasada, Ailinglapalap y Jaluit no registraron ninguna lluvia (falta 1 día) mientras que Kwajalein, Mili y

Majuro recibieron 0,54, 0,52 y 0,86 pulgadas respectivamente. Si bien Utirik recibió 1,74 pulgadas esta semana, esto sucede después de varias semanas de demanda de precipitación insuficiente que lleva a la introducción de sequía anormal a corto plazo (D0-S).

Los Estados Federados de Micronesia experimentaron precipitaciones variables, con islas que recibieron más de 2 pulgadas o menos de 0,15 pulgadas. Esta semana cayeron lluvias más intensas en la laguna de Chuuk (2,30 pulgadas, 1 día sin datos), Nukuoro (4,37 pulgadas, 1 día sin datos) y Pohnpei (13,81 pulgadas, 1 día sin datos). Kosrae (0,25 pulgadas, 5 días sin datos), Lukunor (0,14 pulgadas, 2 días sin datos) y Kapingamarangi (0,02 pulgadas, 1 día sin datos). Kapingamarangi ha estado por debajo de las 2 pulgadas semanales necesarias durante seis semanas y tiene un total de precipitaciones mensuales de 3,08 pulgadas, lo que ha provocado la degradación a sequía moderada a corto plazo (D1-S). Más al oeste, se ha producido un cambio temporal en el clima hacia el final de la semana, con lluvias monzónicas que brindaron un alivio momentáneo a Woleai (3,91 pulgadas, 3 días sin datos), Ulithi (2,91 pulgadas, 3 días sin datos) y Yap (4,73 pulgadas, 1 día sin datos) antes de que regrese pronto el patrón seco. No se dispone de datos para Fananu y Pingelap.

Samoa Americana registró precipitaciones generalmente aceptables. Esta semana, Pago Pago recibió 5,6 pulgadas (falta un día de datos), Siufaga Ridge 1,51 pulgadas y Toa Ridge 1,74 pulgadas (falta un día de datos). Las lluvias de esta semana, sumadas a las intensas precipitaciones de la semana pasada, provocaron una mejora en las condiciones, pasando a una sequía anormal a corto plazo (D0-S).

Palaos experimentó otra semana de precipitaciones insuficientes y permanece en sequía moderada a corto plazo (D1-S). Esta semana, Koror registró 1,87 pulgadas de lluvia, mientras que no se disponía de datos para WSO Palaos/Airai. Las condiciones esta semana se mantienen sin cambios, con sequía moderada a corto plazo (D1-S).

Esta semana, las Islas Marianas recibieron fuertes lluvias. Las condiciones sinópticas favorecieron la convección activa y chubascos localmente fuertes. Guam recibió un promedio de 4.09 pulgadas esta semana con el Aeropuerto Internacional Antonio B. Won Pat registrando 5.64 pulgadas, Agat registrando 4.47 pulgadas y Dededo registrando 2.18 pulgadas (faltan 2 días). Saipán promedió más de 3.8 pulgadas esta semana con el Aeropuerto Internacional de Saipán registrando 3.92 pulgadas y Capital Hill registrando 4.33 pulgadas esta semana. Rota recibió 3.14 pulgadas esta semana con el total mensual de septiembre ya superando las 4 pulgadas necesarias (7.67 pulgadas). Tinian no tenía datos.

Mirando hacia el futuro

Se pronostican lluvias para los próximos cinco días en la costa noreste debido a una tormenta del noreste. También se prevé que el noroeste reciba las precipitaciones necesarias. Los remanentes de un sistema tropical aportarán humedad significativa a los estados de las Cuatro Esquinas y las Grandes Llanuras occidentales, con fuertes lluvias pronosticadas. Se prevé que algunas zonas de las Grandes Llanuras del norte también reciban precipitaciones bienvenidas. Las áreas con pocas lluvias pronosticadas para los próximos cinco días son gran parte de Texas y Luisiana, la región de los Grandes Lagos, California y Nevada. El sur y el suroeste continuarán con temperaturas superiores a lo normal, mientras que el noreste y el noroeste

experimentarán temperaturas más frescas.

El pronóstico para los próximos 6 a 10 días (del 29 de septiembre al 3 de octubre) prevé temperaturas superiores a lo normal en la mitad sur de los Estados Unidos continentales, así como en el noreste. Es probable que Hawái también registre temperaturas superiores a lo normal. La región de la Gran Cuenca podría tener precipitaciones inferiores a lo normal, mientras que es posible que registre precipitaciones superiores a lo normal en gran parte del centro de los Estados Unidos. Tanto Hawái como el este de Alaska también tienen probabilidades de registrar precipitaciones superiores a lo normal durante este período.

Autor(s)

David Mocko, SSAI/NASA/GSFC

Lindsay Johnson, National Drought Mitigation Center