

Resumen nacional de sequía para 6 octubre, 2026

Resumen

Las fuertes lluvias afectaron gran parte de los Estados Unidos continentales la semana pasada. Se registraron precipitaciones de entre 10 y más de 20 centímetros en el centro-sur y sureste de Georgia, el noreste de Florida, el noroeste de Florida, zonas de la costa del Golfo y una franja que se extiende desde el centro de Texas hasta el valle medio del río Rojo (sur). Esto puso fin abruptamente a un periodo prolongado de calor y sequía en las Grandes Llanuras del sur, que se extendió durante la mayor parte del verano. Dallas, TX registró 4 pulgadas de lluvia desde el 30 de septiembre hasta la primera semana de octubre, incluyendo un total diario de 3.47 pulgadas el 1 de octubre. Antes de eso, Dallas registró solo 0.01 pulgadas de lluvia del 16 de julio al 29 de septiembre (76 días), y un total de 2.27 pulgadas desde el 8 de junio. En otros lugares, algunas áreas extensas registraron al menos 2 pulgadas durante la semana, incluyendo la mayor parte de la Costa del Golfo, el sur de Alabama, el centro y sur de Georgia, la mitad norte de Florida, una gran franja a través del centro y el este adyacente de Texas, el centro hasta el sureste de Oklahoma, y en numerosos parches desde el sureste de Colorado y gran parte de Kansas hasta el sureste de Nebraska, partes de Iowa, el norte de Missouri, el norte de Illinois y la región central y sur de los Grandes Lagos. En algunos de los lugares más húmedos a través de las Grandes Llanuras centrales y la Cordillera Frontal adyacente, los impactos mejoraron sustancialmente lo suficiente como para justificar mejoras de 2 categorías en el Monitor de Sequía. Mientras tanto, varias zonas del norte de Arkansas, el sureste de Misuri y el adyacente valle inferior del Ohio también recibieron 2 pulgadas o más de lluvia. Se registraron precipitaciones moderadas que superaron las 0,5 pulgadas, con totales localizados que alcanzaron las 2 pulgadas, afectando áreas desde las Grandes Llanuras centrales y la mitad sur de las Grandes Llanuras hacia el este y noreste, a través de gran parte de los valles del Misisipi y del bajo Ohio, los Grandes Lagos centrales y meridionales, el sureste, la región del Atlántico Medio y el valle del San Lorenzo. Por otro lado, se observaron precipitaciones ligeras en la mayor parte del noreste, el valle superior del Ohio, el extremo valle superior del Misisipi, el norte de las Grandes Llanuras y la mayoría de las áreas desde las Grandes Llanuras hasta la costa del Pacífico, excepto Kansas, Colorado y el norte de Nuevo México. Muchas áreas que ya sufrían sequía y que se vieron afectadas por las fuertes precipitaciones experimentaron un alivio notable, pero a pesar de que extensas áreas recibieron poca o ninguna precipitación medible, la intensificación de la sequía fue limitada, debido principalmente a las temperaturas más bajas y a la típica disminución otoñal de la demanda de agua para el consumo humano y el medio ambiente.

Noreste

Se introdujo una sequía severa (D2) en la mitad norte de Maine tras unas décimas de pulgada de precipitación la semana pasada y un deterioro gradual de las condiciones de humedad superficial. De manera similar, la disminución de los caudales de los arroyos provocó la expansión de la sequía moderada (D1) en las zonas norte de Nuevo Hampshire y el estado adyacente de Vermont. Más al sur, la tendencia observada periódicamente durante los últimos meses continúa, con una cobertura de sequedad anormal y sequía moderada (D0-D1) que

continúa erosionándose lentamente. La sequía moderada desapareció del sureste de Nuevo Hampshire, mientras que la D0 se eliminó del centro-sur de Nuevo Hampshire, partes de Delaware y el sureste de Maryland, y el sur de Maryland. A pesar de algunos episodios de fuertes precipitaciones en las últimas semanas, la D1 se mantiene en las zonas noreste y sureste de Massachusetts debido a que varios pozos muestran niveles de agua subterránea casi mínimos históricos y a la rápida disminución de los caudales de los arroyos observada tras los eventos de fuertes precipitaciones, lo que sugiere que el balance hídrico sigue siendo deficiente más allá de la humedad superficial hasta la zona radicular.

Sureste

Las fuertes lluvias generalizadas que superaron las 2 pulgadas, con amplias franjas que recibieron de 5 a 10 pulgadas, propiciaron mejoras generalizadas de categoría 1 en el sur de Alabama, el Panhandle de Florida, el sur de Georgia, la costa de Carolina del Sur y la franja oriental de la península de Florida. Más al norte, las fuertes precipitaciones fueron más dispersas, por lo que solo se observaron mejoras relativamente pequeñas. Algunas áreas no recibieron precipitaciones moderadas a fuertes, lo que resultó en algunos déficits de precipitación ligeramente aumentados y un empeoramiento de los indicadores de impacto de la sequía, como el caudal de los ríos. Esto provocó cierto deterioro en la representación en algunas áreas relativamente pequeñas del sureste de Virginia, el noreste de Carolina del Norte, el centro de Carolina del Sur y la mitad norte de Georgia. Más al sur, en el centro y oeste de la península de Florida, se observaron lluvias generalmente moderadas, lo que mantuvo sin cambios las intensidades de sequía en la mayoría de las localidades.

Sur

La semana pasada se observó un patrón de precipitación variable en Tennessee y el valle inferior del Misisipi, lo que resultó en algunas áreas de mejora nominal (dispersas por el este de Tennessee, el sureste de Luisiana, el sur de Misisipi y el norte y noroeste de Arkansas) y otras áreas con déficits de humedad algo mayores y deterioro (dispersas por el centro y oeste de Tennessee, el sur y este de Arkansas, el norte de Misisipi y el centro y suroeste de Luisiana). Más al oeste, en Texas y Oklahoma, amplias áreas registraron precipitaciones fuertes a excesivas, lo que resultó en varias áreas considerables de mejora generalizada. Varias pulgadas de lluvia —por segunda semana consecutiva en algunas áreas— indujeron mejoras en la mayor parte del sureste y el sur profundo de Texas, y en una franja desde el centro de Texas a través de gran parte del valle del río Rojo (sur) hasta el centro de Oklahoma. Más al oeste, en Big Bend y los Panhandles de Texas y Oklahoma, las precipitaciones ligeras a moderadas después de las cantidades excesivas registradas la semana pasada dieron lugar a mejoras generalizadas de una categoría. Se observó suficiente precipitación para respaldar mejoras de dos categorías en algunas localidades del sur profundo de Texas, el centro sur de Oklahoma y el oeste del Panhandle de Oklahoma. En algunas zonas del suroeste de Texas y del interior norte no se registraron las fuertes precipitaciones que afectaron a la mayoría de las localidades durante las últimas dos semanas, lo que provocó un deterioro disperso. Sin embargo, la mejoría fue mucho más generalizada en Texas y Oklahoma, a diferencia de la

diversidad de cambios observados más al este.

Medio Oeste

La sequía y la aridez continuaron afectando las zonas sur y norte de la región la semana pasada, mientras que el clima persistentemente húmedo de los últimos meses ha dejado un vacío de sequía y aridez que se extiende desde Iowa y el norte de Missouri hacia el este, al norte del río Ohio y al sur de los estados de los Grandes Lagos. Se registraron precipitaciones moderadas a localmente intensas (de 1 a 2,5 pulgadas localmente) en las zonas secas de la parte central de la Península Inferior de Michigan, eliminando la mayor parte de la sequía moderada en la zona y reduciendo ligeramente la cobertura de D0. Más al norte, solo se observaron precipitaciones ligeras en el norte de Wisconsin, la Península Superior de Michigan y las zonas adyacentes, lo que provocó un deterioro generalizado de categoría 1. La sequía excepcional (D4) se extendió por el norte de Wisconsin, y las condiciones D2 se extendieron a gran parte de la Península Superior de Michigan. Hacia el oeste, la sequía se mantuvo prácticamente sin cambios en la mayor parte de Minnesota, con solo cambios aislados observados. En la franja sur de la región del Medio Oeste, las continuas precipitaciones por debajo de lo normal permitieron que se produjera un deterioro en algunas zonas del centro y este de Kentucky y en partes del sur de Missouri, mientras que cantidades localmente más elevadas propiciaron una mejora limitada en algunas localidades cercanas a la confluencia de los ríos Mississippi y Ohio y en el centro-oeste de Missouri.

Altas Llanuras

Las fuertes precipitaciones generalizadas propiciaron una notable mejoría en el este de Colorado, el centro y el oeste de Kansas, y partes del sur de Nebraska. Numerosos lugares registraron entre 7,5 y más de 15 cm de lluvia, lo que fue suficiente para alcanzar una mejoría de dos categorías en algunas zonas del sureste de Colorado y la mitad occidental de Kansas. Las precipitaciones disminuyeron drásticamente al norte de una línea que va desde el centro de Colorado hasta el noreste de Nebraska, y más allá de esta línea solo se observaron unas décimas de pulgada como máximo. Aun así, se registraron mejoras en partes del centro y norte de Dakota del Norte y del Sur, donde las precipitaciones anteriores podrían haber sido más beneficiosas de lo que se había previsto inicialmente. Las únicas zonas de deterioro observadas fueron el noreste de Colorado y parte del centro-norte de Wyoming, que se han ubicado consistentemente al norte y/o al oeste de las zonas con mayor precipitación. En otras zonas, la intensidad de la sequía no varió significativamente con respecto a la semana anterior.

Oeste

Se registraron precipitaciones de moderadas a intensas (de 0,5 a casi 2,0 pulgadas en algunas zonas) a principios del periodo en el centro-norte y noreste de Nuevo México, pero las condiciones fueron tranquilas en el resto de la Región Oeste. Hubo pequeñas áreas dispersas que reportaron algunas décimas de pulgada de precipitación la semana pasada,

principalmente en Montana y los estados de la región de las Cuatro Esquinas, mientras que la mayoría de los sitios no observaron cantidades medibles. Pero a pesar de la semana predominantemente seca, se observaron áreas de mejora bastante sustanciales a medida que continuaba la respuesta ambiental a las precipitaciones superiores a lo normal a intensas anteriores. La mejora fue más común esta semana en Nuevo México, Arizona y Montana, con algunas áreas también observadas en el sureste de Idaho y Utah. En casi todo Nevada, Idaho y los tres estados de la Costa Oeste, la sequedad y la sequía se mantuvieron prácticamente sin cambios con respecto a la semana anterior.

Caribe

La semana pasada, lluvias moderadas y dispersas afectaron a la Mancomunidad, perpetuando la tendencia de las últimas semanas de que la mejoría supere el deterioro. La sequía disminuyó en algunas zonas del centro-norte, este y suroeste de Puerto Rico, mientras que en otras localidades no se observaron cambios significativos con respecto a la semana anterior.

Al comienzo de la semana de sequía (miércoles 30 de septiembre - martes 6 de octubre de 2026), los factores sinópticos que influyeron en las condiciones meteorológicas observadas en las islas incluyeron un sistema de baja presión en niveles altos ubicado al noreste de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, con convergencia en niveles altos sobre el área de pronóstico, lo que inhibió el desarrollo de actividad de tormentas eléctricas intensas. A mediados del período, se observaron chubascos sobre las islas, con la vaguada principal ahora al oeste del área sobre La Española. Las condiciones en altura sobre las Islas Vírgenes de los Estados Unidos se volvieron gradualmente menos favorables para la convección intensa a medida que las temperaturas aumentaban y los gradientes térmicos verticales en niveles medios se debilitaban. La amenaza de calor fue más prominente hacia el final de la semana de sequía, junto con un mayor riesgo de tormentas eléctricas vespertinas.

Las cantidades semanales estimadas de lluvia a partir de datos satelitales del sistema SPoRT (GPM IMERG) de la NASA, que finalizaron el 6 de octubre a las 12:00 UTC, oscilaron entre casi cero y aproximadamente 0,8 pulgadas, con cantidades algo mayores indicadas en Puerto Rico (varias pulgadas), especialmente en la parte occidental del Estado Libre Asociado.

En St. Croix, las cantidades de precipitación en orden descendente incluyeron: VI-SC-35 (Frederiksted 1.3 ENE, 1.66 pulgadas, 6 días de datos), VI-SC-20 (Frederiksted 1.7 ESE, 0.66 pulgadas), VI-SC-10 (Christiansted 1.6 E, 0.39 pulgadas), VI-SC-23 (Christiansted 6.5 W, 0.38 pulgadas, 5 días), VI-SC-29 (Frederiksted 2.5 NNE, 0.37 pulgadas), VI-SC-37 (Frederiksted 5.6 E, 0.30 pulgadas, 5 días), VI-SC-32 (Frederiksted 1.9 NNW, 0.30 pulgadas, 3 días), VI-SC-30 (Christiansted 1.7 SW, 0.25 pulgadas), VI-SC-25 (Christiansted 4.4 O, 0.14 pulgadas) y VI-SC-24 (Christiansted 2.1 ENE, 0.04 pulgadas, 1 día). El nivel del agua del pozo Adventure 28 varió entre 26.30 pies y 26.64 pies por debajo de la superficie del terreno durante este período. En East Hill (#672560) el Índice de Precipitación Estandarizado (SPI) a 1, 3, 6, 9 y 12 meses fueron, respectivamente: -1.67, -2.22, -2.35, -1.3 y -1.7. Esto es consistente con condiciones D3/D4 y si la próxima semana continúa siendo anormalmente seca, la descripción de sequía de St. Croix podría degradarse aún más a D4. En St. Croix, las cantidades de precipitación en orden descendente incluyeron: VI-SC-35 (Frederiksted 1.3 ENE, 1.66 pulgadas, 6 días de

datos), VI-SC-20 (Frederiksted 1.7 ESE, 0.66 pulgadas), VI-SC-10 (Christiansted 1.6 E, 0.39 pulgadas), VI-SC-23 (Christiansted 6.5 W, 0.38 pulgadas, 5 días), VI-SC-29 (Frederiksted 2.5 NNE, 0.37 pulgadas), VI-SC-37 (Frederiksted 5.6 E, 0.30 pulgadas, 5 días), VI-SC-32 (Frederiksted 1.9 NNW, 0.30 pulgadas, 3 días), VI-SC-30 (Christiansted 1.7 SW, 0.25 pulgadas), VI-SC-25 (Christiansted 4.4 O, 0.14 pulgadas) y VI-SC-24 (Christiansted 2.1 ENE, 0.04 pulgadas, 1 día). El nivel del agua del pozo Adventure 28 varió entre 26.30 pies y 26.64 pies por debajo de la superficie del terreno durante este período. En East Hill (#672560) el Índice de Precipitación Estandarizado (SPI) a 1, 3, 6, 9 y 12 meses fueron, respectivamente: -1.67, -2.22, -2.35, -1.3 y -1.7. Esto es consistente con condiciones D3/D4 y si la próxima semana continúa siendo anormalmente seca, la descripción de sequía de St. Croix podría degradarse aún más a D4.

Las precipitaciones en St. John variaron desde 0,62 pulgadas en VI-SJ-5 (Cruz Bay 1,6 E) hasta 0,02 pulgadas en VI-SJ-10 (Cruz Bay 3,1 NNW). Las cantidades intermedias incluyeron 0,05 pulgadas en VI-SJ-11 (Coral Bay 0,7 NW, 4 días de datos), 0,10 pulgadas en VI-SJ-8 (Cruz Bay 7,4 E, 2 días de datos) y 0,15 pulgadas de lluvia en VI-SJ-3 (Windswept Beach). Además, Windswept Beach reportó un total de solo 2,63 pulgadas de precipitación durante todo el mes de septiembre. La sequía se ha extendido a 5 meses, desde mayo hasta septiembre de 2026. Cada uno de esos 5 meses ha presentado un déficit de lluvia (en comparación con el valor medio de 1984-2025) mayor a 2 pulgadas, lo que suma un total de 13,22 pulgadas. El nivel del agua del pozo Susannaberg Dpw 3 mostró un descenso constante durante todo el período, desde 19,11 pies por debajo de la superficie del terreno al inicio hasta 19,35 pies al final del período. Los valores del SPI en Windswept Beach (VI-SJ-3) a los (1, 3, 6, 9 y 12 meses) son, respectivamente: -2,26, -1,72, -2,17, -1,22 y -1,76. Estos valores son comparables a los de los períodos más cortos de 1 y 3 meses para St. Croix, y si el deterioro continúa la próxima semana, la clasificación de sequía de St. John's también se degradará de D3-S a D4-S.

En St. Thomas, se reportó media pulgada de lluvia en VI-ST-5 (Charlotte Amalie Oeste 4.2 ONO) y 0.41 pulgadas en VI-ST-15 (Charlotte Amalie Oeste 1.3 N). El nivel freático en el pozo de la Escuela Primaria 3 comenzó el período en 9.26 pies por debajo de la superficie del terreno y terminó en 8.98 pies casi al final del período. Parece que llovió el 3 de octubre (suponiendo que no hubo manejo humano del agua), elevando el nivel del pozo a 9.06 pies a media tarde. El nivel del agua disminuyó gradualmente después hasta la noche del 6 de octubre, cuando otra lluvia elevó el nivel del pozo a 8.98 pies. Esta semana, St. Thomas mantiene su designación D4-S.

Pacífico

Se registraron precipitaciones de moderadas a intensas en el sureste de Alaska, pero esta es una época lluviosa del año en la región, y la escasez de humedad ha disminuido lentamente. Por consiguiente, las condiciones D0 se mantienen sin cambios con respecto a la semana pasada. Más al norte, no se observaron cambios en las zonas D0 y D1 del centro-este de Alaska continental, a pesar de las precipitaciones dispersas.

Episodes of heavy to excessive precipitation over the past several months have removed

from the island chain, but a stubborn area of abnormal dryness (D0) has been hanging on across leeward locations on the Big Island. This week, a variety of indicators improved sufficiently to remove the southern reaches of the D0 area, but lingering precipitation deficits remain intact along most of the western tier of the Big Island.

Al comienzo de la semana de sequía (miércoles 30 de septiembre - martes 6 de octubre de 2026), Invest 93 trajo lluvias y tormentas eléctricas a las Marianas. Las zonas occidentales de Micronesia estuvieron dominadas por lluvias monzónicas y tormentas eléctricas, mientras que las zonas orientales experimentaron cielos mayormente despejados a parcialmente nublados. Para la noche del viernes 2 de octubre, vientos fuertes a muy fuertes del suroeste prevalecieron en las Marianas, influenciados en gran medida por la tormenta tropical saliente Choi-wan (26W) y el aumento de la corriente monzónica desde el suroeste. Hacia el final del período, Choi-wan (26W) se había intensificado hasta convertirse en un supertifón mientras continuaba saliendo de la región de las Islas Marianas del Norte (CNMI) hacia el norte. La corriente monzónica del suroeste se había debilitado, acompañada de una lenta mejora de las condiciones marítimas. Para la noche del lunes 5 de octubre, el supertifón Choi-wan (26W) se encontraba al este-noreste de Iwo Jima. El JTWC informó de vientos máximos sostenidos de 250 km/h más temprano ese día. El tifón Nolo (15E) cruzó recientemente la Línea Internacional de Cambio de Fecha desde el Pacífico Central y continuaba moviéndose hacia el oeste a una velocidad moderada (27 km/h), con vientos máximos sostenidos de 185 km/h. La depresión tropical Koguma (27W), anteriormente conocida como Invest 94 del JTWC, se encontraba centrada sobre el norte de la República de las Islas Marshall (RMI). Koguma se fortaleció hasta convertirse en tormenta tropical poco después y, a primera hora de la tarde del martes, se encontraba centrada a 507 km al noroeste del atolón de Kwajalein, cerca de 13N/167E. Finalmente, en el oeste de Micronesia, la corriente monzónica siguió siendo el fenómeno dominante en la región y se ubicaba sobre Palaos y Yap a primera hora de la tarde del lunes 5 de octubre, produciendo tormentas eléctricas, chubascos y vientos fuertes. En el Pacífico Sur, los chubascos integrados en el flujo de viento del este continuaron moviéndose a través de las islas de vez en cuando. La alta presión en superficie al sur de Samoa Americana seguirá favoreciendo este patrón de flujo hacia el este, al tiempo que mantendrá a raya una vaguada al norte de la región.

Las estimaciones de precipitaciones totales basadas en datos del satélite NASA SPoRT (GPM IMERG) para los últimos 7 días que terminaron a las 12 UTC del 6 de octubre indican que generalmente ha caído alrededor de 1 pulgada en Palaos (aunque se midieron cantidades muy localizadas de 5 a 6 pulgadas con pluviómetros terrestres) y los Estados Federados de Micronesia (EFM) occidentales, con zonas aisladas de 1 a 2 pulgadas. Se observó un amplio arco de precipitaciones de 1 a 8 pulgadas desde las Islas Marianas del Norte (CNMI) hacia el este y sureste hasta las Islas Marshall (RMI), con la mayor parte de las precipitaciones más intensas de 4 a 8 pulgadas concentradas en las cercanías de las CNMI. Una gran parte del centro de los EFM reportó una pulgada o menos de precipitación durante la semana. Al sur del ecuador, las precipitaciones fueron generalmente inferiores a 0,75 pulgadas en Samoa Americana.

Los ciclones tropicales y las lluvias monzónicas aseguraron que Guam y las Islas Marianas del Norte (CNMI) tuvieran suficiente lluvia la semana pasada no solo para cumplir con los

requisitos mínimos semanales de agua (1 pulgada o más), sino también con los umbrales mensuales (4 pulgadas o más). Según los datos de xmACIS2, Dededo recibió la mayor cantidad esta semana con 7.41 pulgadas de lluvia (7 días de datos). Un dato interesante es que la lluvia total de Dededo en septiembre fue de 14.92 pulgadas, lo cual es significativo estando a solo 10 días del Día de Colón. Otros totales para la semana en orden descendente son: Guam (6.23 pulgadas), Aeropuerto Internacional de Saipán (5.87 pulgadas, 5 días de datos), Aeropuerto de Rota (5.47 pulgadas) y Tinian (4.50 pulgadas, 5 días de datos). Guam y las CNMI permanecen libres de sequía.

La República de Palaos registró 5,92 pulgadas de lluvia en la estación meteorológica WSO de Palaos (Airai) y 5,01 pulgadas (datos de 6 días) en Koror. Debido a estas cantidades, la clasificación de sequía de Palaos mejoró esta semana, pasando de D1-S a D0-S.

Las mediciones de precipitación tomadas en los Estados Federados de Micronesia (EFM) que alcanzaron o superaron los requisitos mínimos semanales de agua (2 pulgadas) incluyeron (en orden descendente): Gilman (3,24 pulgadas), Kapingamarangi (2,75 pulgadas, 6 días, permanece D1-S), North Fanif (2,13 pulgadas), Ulithi (2,12 pulgadas, 5 días) y Nukuoro (2,02 pulgadas, 6 días). Las ubicaciones que no alcanzaron el requisito mínimo de 2 pulgadas incluyeron: Rumung (1,82 pulgadas, 6 días), Isla Yap (1,62 pulgadas, 6 días), Kosrae (1,29 pulgadas, aunque solo se dispuso de datos de 2 días), Woleai (1,27 pulgadas), Chuuk (0,14 pulgadas), Lukunoch (0,04 pulgadas, 6 días) y Pohnpei (Trazas, 6 días). No se dispuso de datos esta semana para Fananu ni para Pingelap. Esta semana no se realizaron cambios en ninguna de las designaciones de estaciones dentro de los Estados Federados de Micronesia.

La República de las Islas Marshall (RMI) informó que varias estaciones alcanzaron o superaron el requisito mínimo semanal de lluvia esta semana. Estas incluyen: Majuro (4,66 pulgadas), Mili (2,97 pulgadas, 3 días) y Kwajalein (2,21 pulgadas). Las estaciones que no recibieron suficiente lluvia esta semana fueron Jaluit (1,45 pulgadas, 6 días), Utiirik (1,25 pulgadas), Wotje (1,13 pulgadas, 5 días) y Ailinglaplap (1,02 pulgadas, 6 días). Todas las zonas designadas como de sequía permanecen secas y libres de sequía.

En Samoa Americana, las precipitaciones de la semana oscilaron entre 0,40 pulgadas en Toa Ridge y 0,50 pulgadas en Siufaga Ridge, con un valor intermedio de 0,44 pulgadas (6 días) en el aeropuerto de Pago Pago. Tutuila mantiene su designación D0-S esta semana.

Mirando hacia el futuro

Entre el 7 y el 12 de octubre, se espera que la tormenta tropical Isaias, ubicada en el suroeste del Golfo de México, se intensifique hasta convertirse en un huracán de categoría 2 y se dirija hacia el noreste y luego hacia el norte, rumbo a Estados Unidos. Tras alcanzar su máxima intensidad y comenzar a debilitarse, se prevé que toque tierra en algún punto de la costa centro-norte o noreste del Golfo de México a finales del 9 de octubre. Una vez tierra adentro, Isaias debería debilitarse más rápidamente a medida que la circulación remanente se desplace hacia el norte, hacia el sureste o el valle adyacente del Bajo Misisipi. Se espera que los vientos sostenidos alcancen una velocidad máxima de alrededor de 105 mph en el norte del Golfo, pero se prevé que comiencen a debilitarse antes de tocar tierra, hasta a varios cientos de millas tierra adentro. Se espera que una oleada de humedad tropical acompañe a

Isaias hacia el sureste, provocando lluvias de moderadas a intensas en la región, llegando hasta el valle de Ohio y la región del Atlántico Medio. Para finales de este período, se esperan más de 7 pulgadas de lluvia en algunas zonas del Panhandle de Florida, y se pronostican cantidades superiores a 3 pulgadas hasta el norte de Alabama y áreas adyacentes en Misisipi y Georgia. Se espera que la mayoría de las áreas a lo largo de la costa de las Carolinas reciban más de 3 pulgadas de lluvia. Más al oeste, otra intrusión de humedad tropical en el interior del oeste podría traer de 3 a 6 pulgadas de precipitación a puntos aislados en las elevaciones más altas del noreste de Utah y el centro-oeste de Wyoming. Se anticipan al menos 1.5 pulgadas de lluvia desde el centro de Mississippi hacia el este, llegando tan al norte como el Valle de Tennessee, los Apalaches del sur y la región del Atlántico Medio. También se pronostica que lugares dispersos en las elevaciones más altas del interior del oeste y las Cordilleras Costeras del sur de California registrarán más de 1.5 pulgadas de precipitación para el 12 de octubre. Cantidades moderadas que superen las 0.5 pulgadas deberían cubrir el extremo sur de Florida junto con el gran Valle de Ohio, la mayor parte de los Apalaches, el centro y sur de Nueva York y el sur de Nueva Inglaterra. Muchas elevaciones más bajas en el interior del oeste también recibirán al menos 0.5 pulgadas. Por el contrario, se esperan pocas o ninguna precipitación en muchas zonas afectadas por la aridez y la sequía, incluyendo el Extremo Oeste al norte y oeste de Sierra Nevada, la mayor parte de las Grandes Llanuras y la región de los Grandes Lagos, y las zonas occidentales del valle inferior del Misisipi. Se prevén temperaturas superiores a lo normal en una amplia franja de la región central del país, desde las llanuras del sur y centro hasta el valle del Misisipi y la región de los Grandes Lagos. Se espera que las temperaturas máximas diarias promedien al menos 4 °F por encima de lo normal en esa zona, con anomalías que superan los +10 °F desde el centro norte de Texas hasta la mayor parte de Oklahoma y las zonas adyacentes de Kansas, Misuri y Arkansas. Más al oeste, la mayoría de las localidades desde las Montañas Rocosas del norte y oeste hasta la costa del Pacífico esperan temperaturas inferiores a lo normal, al igual que la mayor parte de Montana. Se prevé que las temperaturas máximas diarias promedien al menos 3 °F por debajo de lo normal desde las Cascadas hacia el sur y el este, con anomalías de -8 a -12 °F pronosticadas en la Gran Cuenca del norte, las Montañas Rocosas del norte y las Grandes Llanuras de Montana.

Se esperan condiciones más húmedas de lo normal durante los próximos 5 días (del 13 al 17 de octubre) en gran parte de los Estados Unidos continentales, desde las Montañas Rocosas y las Grandes Llanuras del norte hacia el este, pasando por Nueva Inglaterra, la región del Atlántico Medio, los Apalaches del sur y el Panhandle de Florida. Las mayores probabilidades de precipitaciones inusualmente intensas se extienden desde la región central y sur de las Cuatro Esquinas hacia el este, pasando por Texas, el valle del río Rojo (sur) y el valle occidental del bajo Misisipi. También existen probabilidades, al menos marginalmente mayores, de precipitaciones excedentes en todo Alaska y Hawái. Solo el centro-oeste y el norte de California y el suroeste de Oregón tienen probabilidades nominalmente mayores de precipitaciones subnormales. Mientras tanto, se favorecen temperaturas superiores a lo normal en gran parte del noroeste del Pacífico y en una amplia zona que incluye el sureste, los Apalaches centrales y del sur, la región sur de los Grandes Lagos, el valle medio e inferior del Misisipi, las Grandes Llanuras centrales y del sur, y las Grandes Llanuras del sur. También se

favorecen condiciones más cálidas de lo normal en Hawái y en las secciones central y oriental de Alaska. La mayor probabilidad de temperaturas por debajo de lo normal se limita al noreste y a Nueva Inglaterra.

Autor(s)

Richard Tinker, NOAA/NWS/NCEP/CPC

Anthony Artusa, NOAA/NWS/NCEP/CPC