Resumen nacional de sequía para 20 octubre, 2026

Resumen

Esta semana, las condiciones de sequía mejoraron en amplias zonas de Estados Unidos, mientras que el deterioro se extendió desde el valle inferior del Misisipi hasta el valle occidental del río Ohio. Las temperaturas promedio fueron de 2 a 6 grados superiores a lo normal en gran parte de las Grandes Llanuras del norte, el Medio Oeste, el Noreste y el Oeste, con desviaciones localizadas de 6 a 9 grados. En algunas zonas de las Grandes Llanuras del sur, el Suroeste y el Sureste, prevalecieron temperaturas cercanas o inferiores a lo normal. Las precipitaciones variaron considerablemente: gran parte de la costa del Pacífico, las Grandes Llanuras del norte y el Sureste recibieron menos del 25 % de las precipitaciones normales, mientras que algunas zonas de las Grandes Llanuras centrales y del sur, las Montañas Rocosas y el Alto Medio Oeste recibieron más del 200 % de lo normal, llegando incluso a superar el 400 % en algunas zonas.

Un potente sistema de tormentas provocó lluvias intensas a excesivas en algunas zonas de Texas y Oklahoma entre el 13 y el 15 de octubre, con acumulaciones de 75 a 130 mm en el sureste del Panhandle de Texas y cantidades localizadas de 150 a 200 mm en el oeste y centro de Oklahoma. La tormenta causó inundaciones localizadas y un nivel récord en el curso medio del río Wichita, en el noroeste de Texas. Las precipitaciones superaron localmente los 150 mm por encima de lo normal, lo que proporcionó un alivio considerable a la prolongada sequía y contribuyó a una mejora generalizada de la sequía en Texas y Oklahoma. También se observaron mejoras en algunas zonas de Kansas, Nebraska, Colorado, Wyoming, Utah, Arizona y Nuevo México, donde las recientes lluvias y nevadas en las montañas ayudaron a reponer la humedad del suelo y a paliar los déficits a corto plazo. Asimismo, se registraron mejoras localizadas en Washington.

Por el contrario, la sequía se intensificó desde el valle inferior del Misisipi hasta el valle occidental del río Ohio, especialmente en Arkansas, Luisiana, Misisipi, Tennessee y el sur de Misuri, con degradaciones localizadas que se extendieron hasta Alabama, el norte de Georgia y el sur del Medio Oeste. Los déficits persistentes de precipitación de 30 a 90 días, la disminución de la humedad del suelo y los caudales excepcionalmente bajos contribuyeron a estos cambios. Los valores del Índice de Sequía de Keetch-Byram (KBDI), que miden la sequedad en las capas superiores del suelo y la vegetación, alcanzaron entre 700 y 800 en algunas zonas de Arkansas, Luisiana y Misisipi, lo que indica una sequedad severa y un elevado riesgo de incendios forestales.

En otras zonas, las lluvias de la semana anterior propiciaron una mejoría de la sequía en partes de Virginia, las Carolinas y Georgia. También se observaron mejoras localizadas en el noreste, aunque la sequía empeoró ligeramente en el norte de Maine. Fuera de los 48 estados contiguos, la sequía mejoró en el oeste y el este de Puerto Rico, mientras que la sequía a largo plazo persistió a lo largo de la costa sur. Las abundantes lluvias eliminaron la sequía anormal restante (D0) en el sureste de Alaska, mientras que la sequía persistió en el valle superior de Tanana. Las condiciones se mantuvieron sin cambios en Hawái.

Noreste

Esta semana, las condiciones de sequía mejoraron en general en algunas zonas del noreste, especialmente en Nueva Inglaterra, Nueva York y Nueva Jersey. Las precipitaciones se distribuyeron de forma irregular, lo que proporcionó un alivio localizado a la sequía a corto plazo. Las temperaturas promedio fueron cercanas o inferiores a lo normal en Maine y la costa de Nueva Inglaterra, mientras que en gran parte de Nueva York, Pensilvania y la región del Atlántico Medio se registraron temperaturas entre 1 y 6 grados por encima de lo normal. A pesar de las recientes lluvias, persistieron importantes déficits de precipitación y niveles de agua subterránea y caudal de ríos inferiores a lo normal en algunas zonas del norte de Maine y la región del Atlántico Medio.

Se observaron mejoras de una sola categoría en algunas zonas de Nueva York, Vermont, Nuevo Hampshire, el oeste de Massachusetts y el noreste de Connecticut, donde las recientes lluvias contribuyeron a mejorar las condiciones a corto plazo. También se registraron mejoras en Nueva Jersey, aunque los bajos niveles de agua subterránea siguieron limitando la recuperación en algunas áreas. Maine fue el único estado de la región que experimentó un deterioro, con una leve expansión de la sequía severa (D2) en el norte, en medio de una persistente escasez de humedad. Las condiciones se mantuvieron sin cambios en Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia Occidental y Rhode Island.

Sureste

Las condiciones de sequía mejoraron en gran parte del sureste esta semana, reflejando principalmente los beneficios persistentes de las fuertes lluvias de la semana anterior. Aunque la precipitación durante la semana actual fue más limitada y se distribuyó de manera desigual, la lluvia acumulada durante los 14 a 21 días anteriores continuó aliviando los déficits de humedad a corto plazo en partes de Virginia, las Carolinas y Georgia. Las temperaturas promedio fueron de 3 a 6 grados por encima de lo normal en gran parte de Virginia y Carolina del Norte, con desviaciones localizadas de 6 a 9 grados. Más al sur, las temperaturas fueron generalmente cercanas a lo normal o 3 grados por encima de lo normal en Carolina del Sur y Georgia, mientras que partes de Alabama y Florida experimentaron temperaturas cercanas o ligeramente por debajo de lo normal. A pesar de las lluvias recientes, persistió una sequía significativa en las partes occidentales de la región. Los valores del Índice de Sequía Keetch-Byram (KBDI) se mantuvieron alrededor de 600 a 800 en gran parte de Alabama y el norte de Georgia, en comparación con valores generalmente inferiores a 400 en el este de Virginia, el este de las Carolinas y el norte de Florida.

Se observaron mejoras de una sola categoría en algunas zonas de Virginia, el centro y el oeste de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia, gracias a la mejora de los indicadores de precipitación a corto plazo y las condiciones de humedad del suelo. Sin embargo, se registraron degradaciones localizadas de la sequía en algunas zonas de Alabama, el norte de Georgia y las zonas costeras de Virginia y Carolina del Norte, donde los déficits persistentes de lluvia y la disminución de la humedad del suelo contribuyeron a agravar la severidad de la sequía. Los elevados valores del KBDI en Alabama y el norte de Georgia proporcionaron evidencia adicional de la persistencia de la sequía. En Florida, la sequía moderada (D1) se

redujo localmente en las zonas suroeste y sureste del estado. No obstante, la sequía moderada se extendió al sureste de Florida, donde los déficits de precipitación a largo plazo y los bajos niveles de agua subterránea continuaron manteniendo las condiciones de sequía.

Sur

Las condiciones de sequía variaron considerablemente en el sur esta semana, con mejoras sustanciales en partes de Texas y Oklahoma que contrastan con el continuo deterioro en el valle inferior del Misisipi y Tennessee. Un poderoso sistema de tormentas trajo lluvias intensas a excesivas a las llanuras del sur del 13 al 15 de octubre, proporcionando un alivio significativo después de las prolongadas condiciones de calor y sequía de agosto y septiembre. Se reportaron totales de lluvia de 3 a 5 pulgadas en partes del sureste del Panhandle de Texas y las llanuras onduladas del norte, mientras que totales localizados alcanzaron de 6 a 8 pulgadas al oeste de Oklahoma City (NWS Lubbock; Centro de Predicción Meteorológica del NWS). Oklahoma City registró 4.99 pulgadas al final de la tarde del 14 de octubre (NWS Norman), mientras que Lubbock, Texas, recibió 2.04 pulgadas durante el período de la tormenta (NWS Lubbock). Las fuertes lluvias causaron inundaciones localizadas y crecidas sustanciales en arroyos y ríos, incluyendo una cresta récord de 18.91 pies en el río Middle Wichita cerca de Guthrie, Texas (NWS Lubbock). La mejora de los indicadores de precipitación, la humedad del suelo y el caudal de los ríos propició mejoras generalizadas de una categoría en el oeste y el norte de Texas, el Panhandle de Texas y gran parte de Oklahoma, incluyendo reducciones en la sequía excepcional (D4). Sin embargo, la acumulación de déficits de humedad limitó una eliminación más generalizada de la sequía.

Por el contrario, la sequía se intensificó en otras partes de Texas, Arkansas, Luisiana, Misisipi y Tennessee, donde las precipitaciones siguieron siendo insuficientes para compensar los déficits prolongados. Los valores del Índice de Sequía de Keetch-Byram (KBDI) alcanzaron aproximadamente entre 700 y 800 en partes de Arkansas, Luisiana y Misisipi, lo que indica una sequía severa. La sequía extrema (D3) se extendió por el norte de Arkansas, mientras que la sequía excepcional (D4) se desarrolló o se extendió por el sur de Arkansas y el norte de Luisiana. El empeoramiento de los indicadores de precipitación a 30, 60 y 90 días, la grave disminución de la humedad del suelo y los caudales excepcionalmente bajos respaldaron estos cambios. Los informes de impacto agrícola también documentaron el empeoramiento de las condiciones en Arkansas. Se produjo una mayor expansión e intensificación de la sequía en Misisipi y Tennessee, donde la persistente escasez de humedad continuó afectando las condiciones agrícolas e hidrológicas.

Medio Oeste

Esta semana, las condiciones de sequía fueron variables en el Medio Oeste, con mejoras localizadas y empeoramientos concentrados en la parte sur de la región. Las precipitaciones fueron generalizadas pero distribuidas de manera desigual: gran parte de Minnesota, Iowa, Wisconsin y Michigan recibieron entre 0,25 y 1,5 pulgadas de lluvia, con cantidades localmente mayores de entre 1,5 y 2 pulgadas. Más al sur, las precipitaciones oscilaron

generalmente entre 0,5 y 2 pulgadas en partes de Missouri, Illinois, Indiana y Kentucky. Si bien las lluvias brindaron un alivio localizado, el déficit acumulado de precipitaciones y la persistente escasez de humedad continuaron afectando a partes de la región, en particular al norte de Minnesota, Wisconsin y la Península Superior de Michigan.

Se observaron mejoras en una sola categoría en algunas zonas de Misuri, Illinois y Kentucky, donde las recientes lluvias ayudaron a aliviar los déficits de humedad a corto plazo y a mejorar las condiciones de humedad del suelo. Sin embargo, también se produjeron degradaciones localizadas en Misuri, Illinois, Indiana y Kentucky, especialmente en áreas que no recibieron las lluvias más intensas o que continuaron experimentando déficits de precipitación sustanciales. El deterioro más significativo se produjo en el sur de Misuri, donde la sequía extrema (D3) se extendió a lo largo de la frontera con Arkansas. En Minnesota, Iowa, Wisconsin y Michigan, las condiciones de sequía se mantuvieron prácticamente sin cambios, ya que las recientes precipitaciones ayudaron a estabilizar las condiciones a corto plazo, pero fueron insuficientes para superar los déficits de humedad a largo plazo.

Altas Llanuras

Las condiciones de sequía mejoraron en general en partes de las Grandes Llanuras centrales y meridionales esta semana, mientras que no se registraron cambios en las Grandes Llanuras del norte. Las temperaturas promedio fueron de 2 a 6 grados por encima de lo normal en gran parte de las Dakotas y el este de Wyoming, con desviaciones localmente más altas. Más al sur, las temperaturas variaron desde cerca de lo normal hasta ligeramente por encima de lo normal en partes de Nebraska, el este de Colorado y el norte de Kansas, hasta de 2 a 4 grados por debajo de lo normal en el sur de Kansas. La precipitación varió considerablemente, con gran parte de Dakota del Norte y el norte de Dakota del Sur recibiendo menos del 25% de la lluvia normal. Por el contrario, partes del este de Colorado, Nebraska y Kansas recibieron más del 200% de la precipitación normal, superando localmente el 400%[EC1.1]. Los totales de lluvia de 1 a 2 pulgadas fueron comunes en partes de las Grandes Llanuras centrales, incluyendo de 1 a 1.5 pulgadas en el centro de Nebraska y más de una pulgada en partes del norte de Nebraska Panhandle. Partes del este de Wyoming recibieron aproximadamente de 0.75 a 1.25 pulgadas.

Se observaron mejoras de una sola categoría en algunas zonas del este de Wyoming, el este de Colorado, Nebraska y Kansas, donde las recientes precipitaciones contribuyeron a reducir los déficits de humedad a corto plazo y a mejorar las condiciones de humedad del suelo. En Nebraska, las mejoras se concentraron en las zonas central, centro-sur y noreste del estado, mientras que se registraron mejoras adicionales en el sur de Kansas. El único deterioro en la región se produjo en el noreste de Colorado, donde los déficits de humedad persistentes propiciaron un aumento localizado de la severidad de la sequía. Los déficits a largo plazo también siguieron limitando la recuperación en algunas zonas del este de Wyoming, el oeste de Nebraska y el oeste de Dakota del Sur. No se observaron cambios en Dakota del Norte y Dakota del Sur, donde las precipitaciones durante la semana actual fueron limitadas. Sin embargo, la humedad recibida durante las semanas anteriores contribuyó a mantener las condiciones de sequía existentes a pesar de los continuos déficits de precipitación y las

temperaturas superiores a lo normal.

Oeste

Las condiciones de sequía mejoraron en algunas zonas del oeste esta semana, sin que se reportara un empeoramiento. Las temperaturas promedio fueron de 2 a 6 grados por encima de lo normal en gran parte del noroeste del Pacífico, California, la Gran Cuenca y las Montañas Rocosas del norte, con áreas aisladas que alcanzaron de 6 a 8 grados por encima de lo normal. Más al sur, las temperaturas fueron generalmente cercanas o ligeramente inferiores a lo normal en partes de Arizona y Nuevo México. Las precipitaciones fueron limitadas en gran parte de Washington, Oregón, California, Nevada, Idaho y Montana, donde muchas áreas recibieron menos del 25% de las precipitaciones normales, incluyendo algunas áreas que recibieron menos del 5% de lo normal. Por el contrario, partes de Utah, el oeste de Colorado y Wyoming recibieron más del 200% de las precipitaciones normales, con cantidades localizadas que superaron el 400% de lo normal. Un sistema de tormentas trajo lluvia y nieve en las zonas altas de las Montañas Rocosas entre el 14 y el 15 de octubre, con totales de nieve reportados de 4.3 pulgadas en Silver Lake Brighton, Utah, y 3 pulgadas cerca de Evanston, Wyoming, el 14 de octubre (nevadas de la NOAA).

Se observaron mejoras localizadas de una categoría en Washington, mientras que no hubo cambios en Oregón, California, Nevada, Idaho y Montana. La persistente escasez de caudales siguió afectando a algunas zonas de Idaho, mientras que los bajos niveles de agua superficial y los déficits hídricos a largo plazo limitaron la recuperación en el sureste de Montana. Más al sur, se observaron mejoras de una categoría en algunas zonas del oeste y centro de Wyoming, las Montañas Rocosas de Colorado, Utah, Arizona y Nuevo México. En Wyoming y Colorado, las recientes lluvias y nevadas en las montañas ayudaron a aliviar los déficits hídricos a corto plazo. En Utah, las mejoras se extendieron por algunas zonas del Wasatch Front, las montañas centrales y el sureste de Utah, gracias a las recientes precipitaciones y a la mejora de los indicadores de sequía a corto plazo. En Arizona, las mejoras se concentraron en algunas zonas de las montañas centrales y el este de Arizona, mientras que las lluvias repetidas en las últimas semanas propiciaron mejoras adicionales en el centro y sur de Nuevo México. A pesar de estos cambios, la sequía hidrológica a largo plazo persistió en algunas zonas de las cuencas de los ríos Colorado y Grande. El 20 de octubre, el lago Powell contenía aproximadamente 5,3 millones de acres-pie de agua, o alrededor del 22% de su capacidad, mientras que el almacenamiento en los embalses a lo largo del Río Grande se mantuvo excepcionalmente bajo (Oficina de Recuperación).

Caribe

Esta semana, las condiciones de sequía continuaron mejorando en algunas zonas de Puerto Rico tras las lluvias adicionales y los beneficios persistentes de las precipitaciones de las últimas semanas. Las lluvias se distribuyeron de forma desigual, afectando con mayor eficacia a zonas del oeste y este de Puerto Rico y a las islas cercanas. La mejora de los indicadores de precipitación a 30 y 60 días, la humedad del suelo y el caudal de los ríos contribuyeron a aliviar aún más la sequía. Sin embargo, persistieron déficits de precipitación a largo plazo en

algunas zonas de las llanuras costeras del sur y el interior, donde la escasez de agua subterránea y los bajos niveles de los embalses continuaron evidenciando una sequía hidrológica persistente.

Se observaron mejoras de una categoría en algunas zonas del oeste y este de Puerto Rico, incluyendo áreas localizadas de Vieques y Culebra, donde las lluvias recientes ayudaron a reducir los déficits de humedad a corto plazo. A pesar de estas mejoras, la sequía persistió en algunas zonas del sur de Puerto Rico, donde los déficits de precipitación a largo plazo y la escasez de agua subterránea continuaron limitando la recuperación. El bajo nivel de almacenamiento en los embalses de la Cuenca del Río de la Plata también siguió siendo motivo de preocupación, lo que justifica el mantenimiento de las clasificaciones de sequía existentes en las zonas afectadas.

Con la cuenca tropical del Atlántico en calma, las lluvias en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos fueron en su mayoría dispersas, ligeras y desorganizadas. Los impactos de una sequía de 5 meses continuaron aumentando en todo el territorio, con graves efectos en la agricultura (estrés de los cultivos, mortalidad animal), la salud de la vegetación, la humedad del suelo y las reservas de agua subterránea. Algunas áreas, principalmente en Santa Cruz, recibieron más de una pulgada de lluvia durante el período de monitoreo de la sequía que finalizó el 20 de octubre, aunque varias localidades en todo el territorio registraron un cuarto de pulgada o menos. Esta suele ser la época más lluviosa del año en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, con muchas localidades recibiendo normalmente más del 40 por ciento de su precipitación anual normal durante el otoño (septiembre-noviembre). Santo Tomás ha estado en sequía excepcional desde el 22 de septiembre y ha pasado 5 semanas en estado D4. San Juan y Santa Cruz han pasado 15 semanas consecutivas en sequía extrema (D3), con la lluvia justa para evitar un mayor deterioro. La profundidad del nivel freático en el pozo Susannaberg DPW 3 del Servicio Geológico de los Estados Unidos en St. John aumentó recientemente a más de 19,4 pies, en comparación con los aproximadamente 7,7 pies que tenía en la misma época hace un año.

Pacífico

Esta semana, las condiciones de sequía mejoraron en el sureste de Alaska, donde las abundantes lluvias de las últimas semanas aliviaron la persistente escasez de humedad. Las temperaturas promedio fueron de aproximadamente 2 a 6 grados superiores a lo normal en algunas zonas del interior y del centro-sur de Alaska. Las precipitaciones se distribuyeron de forma desigual, con cantidades generalmente escasas en gran parte del interior y lluvias más intensas en algunas zonas del centro-sur y sureste de Alaska, donde se registraron acumulaciones locales superiores a las 2 pulgadas.

La sequía anormal restante (D0) desapareció del sureste de Alaska tras las abundantes lluvias y la mejora de las condiciones de humedad. Sin embargo, la sequía moderada (D1) persistió en el valle superior de Tanana, en el este de Alaska, donde los déficits de humedad a largo plazo continuaron manteniendo las condiciones de sequía existentes.

Las condiciones se mantuvieron sin cambios en todo Hawái esta semana. Las temperaturas

promedio estuvieron dentro de 0.5 grados de lo normal en la mayor parte del estado, con temperaturas ligeramente por debajo de lo normal en Oahu, Molokai y Maui, y ligeramente por encima de lo normal en Kauai, Lanai y la Isla Grande. Predominaron vientos alisios moderados a fuertes durante la semana, con ondas del este que trajeron períodos de lluvias intensas a las zonas de barlovento y montañosas, particularmente del 16 al 19 de octubre (NWS Honolulu). La precipitación fue generalmente de 0.5 a 1 pulgada por debajo de lo normal en las partes de sotavento de las islas, mientras que las áreas de barlovento recibieron lluvias ligeramente por encima de lo normal. Partes de la Isla Grande de barlovento recibieron de 1 Las condiciones se mantuvieron sin cambios en todo Hawái esta semana. Las temperaturas promedio estuvieron dentro de 0.5 grados de lo normal en la mayor parte del estado, con temperaturas ligeramente por debajo de lo normal en Oahu, Molokai y Maui, y ligeramente por encima de lo normal en Kauai, Lanai y la Isla Grande. Predominaron vientos alisios moderados a fuertes durante la semana, con ondas del este que trajeron períodos de lluvias intensas a las zonas de barlovento y montañosas, particularmente del 16 al 19 de octubre (NWS Honolulu). La precipitación fue generalmente de 0.5 a 1 pulgada por debajo de lo normal en las partes de sotavento de las islas, mientras que las áreas de barlovento recibieron lluvias ligeramente por encima de lo normal. Partes de la Isla Grande de barlovento recibieron de 1 a 2 pulgadas más de lo normal. No hubo cambios en la sequía anormal (D0) que persistió en las partes de sotavento de la Isla Grande. El resto del estado se mantuvo libre de sequía y sequía anormal. 2 pulgadas más de lo normal. No hubo cambios en la sequía anormal (D0) que persistió en las partes de sotavento de la Isla Grande. El resto del estado se mantuvo libre de sequía y sequía anormal.

El ciclón tropical Champi pasó justo al sur de las Marianas, y Guam evitó por poco un impacto directo del supertifón. El Aeropuerto Internacional de Guam registró una ráfaga máxima de viento del este de 83 mph el 18 de octubre, mientras que a unas 130 millas al norte, el Aeropuerto Internacional de Saipán registró una ráfaga del sureste de 56 mph. Cayeron casi 5 pulgadas de lluvia en el Aeropuerto Internacional de Guam antes, durante y después del casi impacto de Champi. Mientras tanto, se registraron lluvias variables en la República de las Islas Marshall (RMI) y los Estados Federados de Micronesia (FSM). La RMI se mantuvo libre de sequía y sequedad anormal, con mayores cantidades de lluvia semanales (más de 3 pulgadas) en Majuro y Wotje. El almacenamiento del embalse de Majuro superó los 39 millones de galones el 12 de octubre, en comparación con los 36 millones de galones de principios de mes. En los FSM, Kapingamarangi se mantuvo en sequía moderada (D1), habiendo recibido poca lluvia en 7 de las últimas 9 semanas. Los impactos relacionados con la sequía en Kapingamarangi incluyeron estrés en los cultivos, disponibilidad limitada de humedad en el suelo y reducción del almacenamiento en los tanques de agua. El resto de los Estados Federados de Micronesia, excepto Lukunor, no experimentó ni sequía ni sequedad anormal. Sin embargo, se introdujo la sequedad anormal (D0) para Lukunor, ya que ha caído poca lluvia durante 5 semanas consecutivas. Finalmente, la sequedad anormal (D0) persistió en toda la República de Palaos y en Samoa Americana. Palaos ha estado anormalmente seco (D0) o en sequía moderada (D1) cada semana desde el 18 de agosto de 2026. De manera similar, D0 o D1 ha estado presente cada semana en Samoa Americana desde el 25 de agosto hasta la fecha, con precipitaciones en lo que va del mes en el Aeropuerto Internacional de Pago Pago que suman menos de 2 pulgadas. Algunas otras localidades en Samoa Americana

han tenido un desempeño ligeramente mejor, aunque las lluvias recientes en dos sitios del Servicio de Parques Nacionales (Toa Ridge y Siufaga Ridge) no han eliminado por completo las preocupaciones relacionadas con la sequedad.

Mirando hacia el futuro

Durante los próximos cinco días (del 22 al 27 de octubre), el pronóstico cuantitativo de precipitaciones del Centro de Predicción Meteorológica muestra precipitaciones generalizadas en partes de las Montañas Rocosas centrales y meridionales, particularmente en Colorado y el norte de Nuevo México, donde se pronostican totales generalizados de 1 a 3 pulgadas, con cantidades localizadas de 5 pulgadas o más. Más al oeste, se pronostican precipitaciones generalizadas en el oeste intermontañoso y la costa del Pacífico, incluyendo Washington, Oregón y California, con totales que generalmente oscilan entre 0.5 y 2 pulgadas y cantidades localmente mayores en áreas montañosas. En el suroeste, se esperan precipitaciones en partes de Arizona, Utah y Nuevo México, mientras que el sur de California y los desiertos bajos permanecerán relativamente secos. Al este de las Montañas Rocosas, se esperan de 0.5 a 2 pulgadas en partes de las llanuras centrales y septentrionales, con fuertes precipitaciones de hasta 3 a 5 pulgadas esperadas en el oeste de Texas y el Panhandle, el este de Nuevo México, el Panhandle de Oklahoma y el suroeste de Kansas. Se espera que gran parte del valle del Misisipi, el medio oeste, el sureste y el noreste permanezcan secos. Se esperan lluvias adicionales en las costas sur y atlántica de Florida, mientras que se prevé que las precipitaciones más intensas asociadas a un sistema meteorológico marino permanezcan sobre el Océano Atlántico.

El pronóstico de temperaturas a 6-10 días del Centro de Predicción Climática (del 26 al 30 de octubre) prevé temperaturas superiores a lo normal en gran parte de los dos tercios meridionales de los 48 estados contiguos de EE. UU., incluyendo California, el suroeste, las llanuras centrales y meridionales, el valle del Misisipi y el sureste. Las mayores probabilidades de temperaturas superiores a lo normal se concentran en algunas zonas del suroeste, las llanuras meridionales y el valle inferior del Misisipi, donde el calor persistente podría aumentar la demanda de evaporación y agravar los déficits de humedad existentes en las áreas que no reciben precipitaciones significativas. Por el contrario, se prevén temperaturas inferiores a lo normal a lo largo de la frontera con Canadá, desde las Montañas Rocosas del norte hasta las llanuras del norte, y en algunas zonas del norte de Nueva Inglaterra. Se prevén temperaturas cercanas a lo normal en Alaska y la mayor parte de Hawái.

El pronóstico de precipitaciones del Centro de Predicción Climática para los próximos 6 a 10 días (del 26 al 30 de octubre) prevé precipitaciones superiores a lo normal en una amplia zona que se extiende desde California y el suroeste, pasando por partes de Arizona, Nuevo México y el oeste de Texas. También se prevén precipitaciones superiores a lo normal en la península de Florida y en zonas costeras de Georgia y Carolina del Sur. Por el contrario, se prevén precipitaciones inferiores a lo normal desde el bajo valle del Misisipi hacia el noreste, pasando por el valle del Ohio, los Apalaches y el noreste. Asimismo, se prevén precipitaciones inferiores a lo normal en zonas del noroeste del Pacífico y el sureste de Alaska, mientras que se prevén precipitaciones superiores a lo normal en gran parte de Alaska continental y Hawái.

Autor(s)

Lindsay Johnson, High Plains Regional Climate Center

Brad Rippey, U.S. Department of Agriculture