Resumen nacional de sequía para 27 octubre, 2026

Resumen

La mayor parte de la mitad oriental de los 48 estados contiguos recibió poca o ninguna lluvia la semana pasada. Las únicas excepciones fueron la franja oriental de la península de Florida (más de 5 cm en algunas áreas), el valle superior del Misisipi y la región norte de los Grandes Lagos (desde unas décimas hasta casi 2,5 cm), y partes de la costa sureste de Texas (desde unas décimas hasta poco más de 2,5 cm). El clima fresco propio de la estación acompañó al buen tiempo en la mitad norte de la región, lo que limitó la intensificación de la sequía allí. El clima más cálido más al sur provocó un deterioro más extenso de las condiciones climáticas desde la mitad sur del valle del Misisipi hacia el este, a través del Atlántico Medio inferior. Más al oeste, cayeron precipitaciones de moderadas a intensas desde las Grandes Llanuras del norte hasta las Grandes Llanuras del sur y hacia el oeste hasta la costa del Pacífico. Algunas zonas de menor altitud, partes del valle inferior del Colorado y partes de las Montañas Rocosas del norte registraron solo cantidades ligeras de unas décimas de pulgada, pero se observaron cantidades de al menos 1,25 cm en otros lugares. Las mayores cantidades (más de 5 cm) cayeron en las secciones central y sureste de la región de las Cuatro Esquinas, las zonas más elevadas del sur de California, el noroeste del Pacífico desde las Cascadas hacia el oeste hasta la costa, y en lugares dispersos a lo largo de las zonas elevadas desde el oeste de Montana hacia el sur, pasando por partes de Idaho, el norte de Utah y el extremo oeste de Wyoming. Se observaron entre 10 y 20 cm en algunas áreas cercanas a la frontera entre Colorado y Nuevo México. Esto continuó con un patrón de fuertes precipitaciones en gran parte de la región de las Cuatro Esquinas, y se registraron mejoras significativas en gran parte de esta área, con algunas mejoras de categoría 2 en las zonas más húmedas del sur de Colorado.

Noreste

La semana pasada se registraron muy pocas precipitaciones en la región noreste. Esto provocó un deterioro en algunas zonas, aunque las fuertes lluvias de las últimas una o dos semanas evitaron la sequedad generalizada y la intensificación de la sequía. La condición D0 se extendió por partes del noreste de Pensilvania y el centro del estado de Nueva York, además de una franja que abarca parte del noroeste de Nueva Jersey. La mayoría de las demás zonas permanecieron sin cambios, salvo por una ligera expansión de las condiciones D2 en el centro de Maine. Actualmente, las condiciones D2 a D3 se limitan al estado de Maine, y fuera de este, la condición D1 se restringe a algunas zonas pequeñas en las partes norte y sur de la región noreste.

Sureste

La mitad oriental de la península de Florida recibió precipitaciones al menos moderadas la semana pasada (desde varias décimas de pulgada hasta más de 2 pulgadas en algunas zonas), pero la mayoría de las demás localidades de la región sureste registraron escasas o nulas precipitaciones. En las últimas una o dos semanas, se habían registrado fuertes

precipitaciones en gran parte de la región sureste, lo que limitó el deterioro de las condiciones climáticas esta semana. La mayoría de las áreas se mantuvieron sin cambios, pero se observaron zonas afectadas en partes del norte y sur de Georgia, el centro de Carolina del Sur, el este de Carolina del Norte y el sur de Virginia, zonas que no recibieron tanta precipitación como otras localidades del sureste.

Sur

En las últimas 2 a 4 semanas, diferentes partes de la Región Sur han experimentado tendencias marcadamente distintas. Se han observado fuertes precipitaciones en ocasiones en las zonas occidentales de la Región Sur, más específicamente en las secciones central y occidental de Texas y Oklahoma. Las lluvias adicionales de la semana pasada propiciaron una mejora en las condiciones, y algunas zonas cercanas a la Región Oeste quedaron libres de sequía. Por el contrario, las precipitaciones han sido mucho más escasas más al este, y otra semana de clima anormalmente seco y cálido provocó un deterioro generalizado en el Bajo Valle del Misisipi, Tennessee y algunas zonas del este de Oklahoma y Texas. Las condiciones D3 a D4 predominan ahora en gran parte de esta región, en el centro y oeste de Tennessee, Arkansas, Luisiana y algunas zonas adyacentes, incluyendo el norte y el centro-oeste de Misisipi. En los últimos 4 meses, la mayoría de las localidades de Arkansas, Luisiana, Misisipi y el suroeste de Tennessee han registrado entre 8 y 16 pulgadas menos de precipitación de lo normal, o generalmente menos de la mitad de lo normal.

Medio Oeste

Se registraron precipitaciones de ligeras a moderadas (de varias décimas de pulgada a un poco más) en la región noroccidental de los Grandes Lagos, la mayor parte de Minnesota y el noroeste de Iowa, mientras que la gran mayoría de la región del Medio Oeste registró poca o ninguna precipitación. La tendencia a la sequía de las últimas semanas ha provocado un aumento en la extensión e intensidad de la sequía en gran parte de las zonas sur y norte de la región del Medio Oeste, mientras que varios meses consecutivos con precipitaciones iguales o superiores a lo normal han dejado una franja en la parte central de la región, desde Iowa y el norte de Misuri hasta el valle norte del Ohio, prácticamente libre de sequías significativas. La semana seca y relativamente cálida provocó una cierta expansión de las condiciones D1 a D4 en parte de la región norte de los Grandes Lagos que no registró cantidades moderadas, y amplias zonas de sequía se intensificaron más al sur, desde el sur y el este de Misuri hasta partes del centro-este de Illinois y el centro de Indiana. También se observó un deterioro más limitado a lo largo de la franja más meridional de Kentucky y cerca de la confluencia de los ríos Misisipi y Ohio, con condiciones D3 a D4 que ahora cubren una gran franja en el centro y sur de Misuri.

Altas Llanuras

La semana pasada se registraron precipitaciones excesivas e inundaciones en gran parte del centro y sur de Colorado, con cantidades al menos moderadas (más de 1,25 cm) desde la

mitad occidental de Kansas hacia el norte, abarcando la mayor parte de Nebraska y Dakota del Sur. También se registraron cantidades moderadas en el oeste de Wyoming, asociadas a un pulso de humedad tropical que afectó a gran parte del oeste. Se observaron mejoras de una categoría en la mitad sur y el noreste de Colorado, así como en el centro y noreste de Nebraska y el sureste de Dakota del Sur. En algunas zonas del centro-sur y suroeste de Colorado, donde se registraron varias pulgadas de precipitación, se observaron mejoras de dos categorías en algunas áreas bastante extensas. En otras zonas, la sequía no experimentó cambios lo suficientemente significativos como para justificar mejoras.

Oeste

La semana pasada se registraron precipitaciones de ligeras a moderadas en casi toda la Región Oeste, con cantidades localmente excesivas (de 5 a 12,5 cm) en gran parte del norte y este de Nuevo México, el centro de Arizona, el sureste de California, el noroeste del Pacífico desde las Cascadas hasta la costa y el suroeste de California. En ocasiones, la humedad se desplazó hacia el norte desde la Región de las Cuatro Esquinas, provocando precipitaciones generalizadas de moderadas a intensas en gran parte de Utah, Idaho y el oeste de Montana. Las zonas más secas la semana pasada fueron Washington y Oregón al este de las Cascadas, el sureste de Montana y el suroeste desértico, donde cayeron hasta unas décimas de pulgada (2,5 mm). El patrón continuo de precipitaciones abundantes en la mayor parte de la Región Oeste contribuyó a una mejora constante de la sequedad y la sequía. La mejora más generalizada se observó en Nuevo México (donde se registraron inundaciones localizadas), el centro y norte de Arizona y gran parte de Nevada, debido al patrón húmedo observado en las últimas semanas. También se observaron mejoras en partes del valle inferior del Colorado, el sur de Utah, el sur de Idaho y porciones del centro y oeste de Montana. A pesar del reciente aumento de las precipitaciones, la escasez de humedad a largo plazo sigue afectando a gran parte de la región, por lo que no se ha logrado eliminar por completo la sequía.

Caribe

Se registraron fuertes lluvias en gran parte del sur de Puerto Rico, principalmente a finales del período. Las cantidades variaron entre 2 y 5 pulgadas en las zonas suroeste y sureste. Esto produjo algunas mejoras en el sureste de Puerto Rico, pero la otra zona afectada por las fuertes lluvias incluyó áreas con condiciones D2 y D3. Estas áreas no mejoraron en este momento debido a la preocupación por déficits a largo plazo, pero la situación continuará siendo monitoreada. Más al norte, solo se observaron lluvias ligeras (de hasta unas décimas de pulgada).

Las intensas condiciones de sequía persistieron en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos tras otra semana inusualmente cálida y seca. La sequía se ha prolongado lo suficiente y ha tenido un impacto suficientemente grave en los niveles de agua subterránea como para requerir la declaración de sequía a corto y largo plazo. En St. John, la situación se agravó hasta convertirse en sequía excepcional, con déficits de precipitación a 3 y 6 meses altamente

anómalos. La sequía excepcional continuó en St. Thomas, donde las precipitaciones fueron escasas esta semana. La sequía extrema persistió en St. Croix, donde las escasas lluvias de esta semana agravaron los déficits de precipitación a corto y largo plazo.

Pacífico

El aumento de las precipitaciones (cercanas a una pulgada) la semana pasada provocó la eliminación de la categoría D1 de parte del sureste del territorio continental, pero la zona circundante, clasificada como D0, no se modificó debido a la continua preocupación por la persistencia de la escasez de humedad.

En general, las precipitaciones han sido superiores a lo normal durante los últimos meses en todo Hawái, lo que ha evitado la sequía a pesar de una semana relativamente seca en muchas zonas. Algunas áreas de sotavento en la Isla Grande siguen sin experimentar este patrón de lluvias intensas, y las condiciones D0 allí se mantuvieron sin cambios.

Esta semana, en Samoa Americana, persistió la sequía anormal a corto plazo, junto con el oscurecimiento de la vegetación. En Pago Pago se registraron cerca de 0,24 pulgadas de lluvia, en Siufaga Ridge cerca de 0,6 pulgadas y en Toa Ridge 0,49 pulgadas.

En Palaos, esta semana se registró una sequía moderada a corto plazo, debido a que el clima seco continuó provocando escasez de agua. En Koror, las precipitaciones alcanzaron un total de 0,41 pulgadas esta semana.

Las Islas Marianas no sufrieron sequía ni periodos de sequía anormales esta semana. Se registraron precipitaciones de 1,3 pulgadas en Saipán, 1,15 pulgadas en Rota, 0,88 pulgadas en Guam y 1,5 pulgadas en Tinian.

Los Estados Federados de Micronesia se mantuvieron en su mayoría libres de sequía o sequedad anormal, con algunas excepciones locales. Las últimas dos semanas en Yap han sido más secas, con 1,61 pulgadas de lluvia la semana pasada y 1,4 pulgadas esta semana, aunque las condiciones húmedas de las semanas anteriores mantienen a raya cualquier sequedad anormal. Ulithi terminó la semana con solo 0,21 pulgadas de lluvia, lo que hace que sean tres semanas seguidas con menos de 2 pulgadas también allí. Sin embargo, no se ha desarrollado ninguna sequedad anormal todavía debido al clima húmedo de septiembre. En Woleai, el clima más seco también se ha establecido recientemente, con 0,66 pulgadas de lluvia allí esta semana marcando la cuarta semana consecutiva con menos de 2 pulgadas de lluvia. Dado un septiembre consistentemente (y récord) húmedo, la sequedad anormal no se ha desarrollado del todo, aunque las condiciones continuarán siendo monitoreadas. En Chuuk y Nukuoro, las últimas semanas han presentado una mezcla de clima seco y húmedo, y ambas localidades se mantuvieron libres de sequía o sequedad anormal. Las precipitaciones en Chuuk totalizaron 1,79 pulgadas, mientras que Nukuoro recibió 0,84 pulgadas. La sequía anormal a corto plazo y la sequía moderada continuaron en Lukunor y Kapingamarangi, respectivamente. En Lukunor, cayeron 2,78 pulgadas de lluvia esta semana, lo que probablemente mejoró un poco las condiciones, pero no lo suficiente como para superar las cinco semanas anteriores de sequía extrema. Kapingamarangi recibió 0,5 pulgadas de lluvia, marcando la tercera semana consecutiva con media pulgada de lluvia o menos (las dos

anteriores fueron casi completamente secas). En Pohnpei, se reportaron 3,46 pulgadas de lluvia y las condiciones húmedas continuaron allí después de un agosto y septiembre muy lluviosos. En Kosrae, se reportaron 0,74 pulgadas de lluvia. Aún no se ha desarrollado una sequía anormal, pero dado el clima mayormente seco de las últimas semanas, las condiciones se monitorearán de cerca en adelante. No se dispuso de datos esta semana para Fananu o Pingelap, por lo que no se hicieron representaciones USDM para ninguna de las dos ubicaciones.

En Ailinglapalap, las últimas dos semanas han sido más secas, con 0,65 pulgadas de lluvia esta semana. Sin embargo, dado el clima húmedo previo, aún no se ha desarrollado una sequía anormal. En Kwajalein, los datos recientes han sido algo limitados, y se reportaron 0,94 pulgadas de lluvia esta semana (con tres días faltantes en el análisis). Dado el clima húmedo durante la mayor parte de septiembre, aún no se ha desarrollado una sequía anormal, aunque las condiciones serán monitoreadas en adelante. Se desarrolló una sequía anormal a corto plazo en Jaluit esta semana, donde cayeron 0,7 pulgadas de lluvia, lo que marca cuatro semanas consecutivas con menos de 2 pulgadas de lluvia. Las condiciones normales continuaron en Majuro, donde el total de lluvia de esta semana de 0,81 pulgadas rompió una racha de tres semanas de clima más húmedo. No se hicieron representaciones USDM para Utirik, Wotje y Mili, ya que no había datos disponibles para estas ubicaciones.

Mirando hacia el futuro

Durante los próximos 5 días (hasta el 2 de noviembre), se esperan áreas de fuertes precipitaciones (de 1.5 a cerca de 4.0 pulgadas localmente) en el centro de Arizona, las elevaciones más altas de las Montañas Rocosas centrales (incluidas partes de Colorado que se inundaron la semana pasada), gran parte de las Grandes Llanuras de Texas y parte de la costa central del Golfo. Se pronostican cantidades moderadas (de 0.5 a cerca de 2.0 pulgadas localmente) para la mayor parte de las elevaciones más altas de las Montañas Rocosas, una franja desde el sur de las Grandes Llanuras hasta el norte de las Grandes Llanuras y la mayor parte de los estados de la costa central y oriental del Golfo. Se esperan algunas décimas de pulgada con cantidades aisladas más altas en el resto de los EE. UU., con poca precipitación prevista a lo largo de la costa central del oeste, el sureste de Texas, el Atlántico Medio, el Noreste y la región adyacente de los Grandes Lagos. Se pronostica que las temperaturas máximas diarias promediarán de 4 a 8 grados Fahrenheit por debajo de lo normal en el centro y oeste de las Cuatro Esquinas, la Gran Cuenca y gran parte del suroeste desértico. Mientras tanto, en la mayoría de las zonas, desde las Grandes Llanuras del norte y del este hasta la región de los Grandes Lagos y los valles del Misisipi, Ohio y Tennessee, se esperan temperaturas superiores a lo normal, con máximas diarias que promedian entre 5 y 13 grados Fahrenheit por encima de lo habitual. Se prevén las mayores anomalías en la región sur de los Grandes Lagos.

Del 3 al 7 de noviembre, se prevén precipitaciones superiores a lo normal en la mayor parte de los Estados Unidos continentales, Alaska y la Isla Grande de Hawái. Las únicas excepciones son las zonas septentrionales de Alaska y el oeste de Estados Unidos, donde se esperan condiciones más secas de lo normal en gran parte de Montana, Washington y el vecino

. Asimismo, se prevén temperaturas superiores a lo normal en todo el país, y solo en algunas zonas de las islas occidentales de Hawái y la región de las Cuatro Esquinas se esperan temperaturas promedio más cercanas a lo normal.

Autor(s)

Richard Tinker, NOAA/NWS/NCEP/CPC

Curtis Riganti, National Drought Mitigation Center