Resumen nacional de sequía para 3 noviembre, 2026

Resumen

El otoño muy lluvioso continuó en el cuadrante suroeste de los Estados Unidos continentales hasta finales de octubre. Con base en las fuertes precipitaciones adicionales (más de 2.5 cm) del 27 de octubre al 2 de noviembre y un cambio positivo en los indicadores a largo plazo desde septiembre, se produjo una mejora general de 1 categoría en el suroeste y la Gran Cuenca. Aunque la sequía a corto plazo ha terminado, la sequía a largo plazo persiste en partes de estas áreas. Los remanentes del huracán Vance del Pacífico oriental trajeron precipitaciones que aliviaron la sequía en el oeste y centro de Texas. A principios de noviembre, las fuertes precipitaciones impulsaron mejoras en las Grandes Llanuras y el Alto Valle del Misisipi. La cobertura de sequía continuó su disminución a finales del verano y otoño en Florida. La sequía se expandió e intensificó en partes del Bajo y Medio Valle del Misisipi, el Valle del Ohio, el Atlántico Medio y Nueva Inglaterra. Alaska y Hawái permanecen libres de sequía, mientras que la sequía continúa mejorando en Puerto Rico.

Noreste

Según el índice SPI de 30 a 60 días, la humedad del suelo del programa SPoRT de la NASA y el caudal de los arroyos de 28 días del USGS, se produjo una degradación de categoría 1 en partes del noroeste de Nueva Jersey, el norte de Pensilvania, la región de Finger Lakes en Nueva York y Nueva Inglaterra. Debido en parte a la falta de recuperación de la sequía de 2025, los caudales de los arroyos de 28 días se encuentran en el percentil 5 más bajo, lo que justifica la adición de la categoría D3 en los bosques del norte de Maine. La cobertura Dx se mantuvo prácticamente estable en Delaware, Maryland, el sur de Nueva Jersey y Virginia Occidental.

Sureste

Lluvias intensas a excesivas (de 2 a 6 pulgadas o más) empaparon gran parte del centro y sur de la península de Florida, con los mayores totales (más de 10 pulgadas) a lo largo de la costa atlántica. Debido a las recientes lluvias intensas y al uso de las combinaciones a corto y largo plazo del NDMC, fue necesaria una mejora de 1 a 2 categorías para la península de Florida. Sin embargo, la categoría D1 sigue justificada cerca de Bradenton y Fort Myers, donde los caudales de los arroyos de 28 días están por debajo del percentil 20. Además, las menores cantidades de lluvia semanales llevaron a que continuara la categoría D2 para partes de los Everglades. Tenga en cuenta que la sequía a corto plazo ha terminado para Florida, persistiendo solo la sequía a largo plazo. El aumento de los déficits de precipitación de 30 a 60 días y el empeoramiento de la humedad del suelo dieron como resultado degradaciones de categoría 1 en partes de Georgia, las Carolinas y Virginia. Las fuertes precipitaciones (más de 2 pulgadas) llevaron a una categoría 1 en la esquina noroeste de Alabama.

Sur

Los remanentes del huracán Vance en el Pacífico oriental provocaron fuertes lluvias en el oeste y centro de Texas. Se realizó una mejora de una categoría en las áreas que recibieron más de 1 a 1,5 pulgadas de lluvia. También se consideraron los SPI en varias escalas de tiempo. El otoño inusualmente lluvioso continuó en Nuevo México, donde fue necesaria una mejora general de una categoría. Es posible que se necesiten mejoras adicionales en las semanas siguientes para ser más consistentes con las métricas a largo plazo. Tenga en cuenta que la sequía a corto plazo ha terminado en Nuevo México. Cerca o más de una pulgada de precipitación respaldaron mejoras en el tercio occidental de Oklahoma. Dado que esta precipitación ocurrió el 2 de noviembre, es posible que se realicen mejoras adicionales en una mayor cobertura de Oklahoma la próxima semana una vez que se complete una evaluación completa de las últimas métricas. La cobertura D2, D3 y D4 en Arkansas, Luisiana, Misisipi y Tennessee es generalmente consistente con los SPEI en varias escalas de tiempo e indicadores de humedad del suelo. Los informes de impacto de Misisipi incluyen pastos pobres a muy pobres junto con estanques agrícolas secos. La falta de precipitaciones en los últimos dos meses (déficits de más de 10 cm en 60 días), sumada a temperaturas superiores a lo normal (entre 25 y 6 grados Celsius desde principios de septiembre), ha provocado una rápida intensificación de la sequía en todo el valle inferior del Misisipi. Las fuertes precipitaciones (entre 3,8 y 5 cm, con algunas variaciones locales) resultaron en una mejora de una categoría para el suroeste de Tennessee y el norte de Misisipi, mientras que en el noreste de Tennessee se justificó un deterioro de una categoría.

Medio Oeste

La sequía generalizada de categoría D2 a D3 continúa en el sur de Missouri, y el índice SPEI de 60 a 90 días, junto con la humedad del suelo, favoreció la expansión de estas categorías de sequía en el tercio sur del estado. El aumento de los déficits de precipitación de 30 a 60 días, la disminución de la humedad del suelo y la combinación a corto plazo del NDMC resultaron en una degradación de categoría 1 en Kentucky, Indiana, Illinois y Missouri. Por el contrario, las precipitaciones inusualmente intensas (cantidades generalizadas de 1,5 pulgadas o más) para esta época del año propiciaron una mejora generalizada de categoría 1 en gran parte de Minnesota y el oeste de Wisconsin. Cabe destacar que la sequía a corto plazo ha terminado en casi todo Minnesota y el oeste de Wisconsin.

Altas Llanuras

Las precipitaciones generalizadas (de 0,5 a 2 pulgadas, con cantidades localmente mayores) resultaron en una mejora de una categoría en el tercio occidental de Colorado, así como en partes de las Grandes Llanuras del Norte y Centro. Las precipitaciones recientes y la "convergencia de evidencias" respaldaron la suspensión de la categoría D3 en la mayor parte del Panhandle de Nebraska.

Oeste

Un sistema de baja presión en una latitud inusualmente baja para esta época del año provocó

condiciones anormalmente húmedas en el sur de California y el suroeste desértico durante el fin de semana de Halloween. Durante los últimos 60 días, la precipitación ha promediado muy por encima de lo normal (entre un 200 % y un 400 %, o más) en el sur de California, el sur de Nevada y la mayor parte de Arizona y Utah. Esta humedad otoñal está relacionada en parte con la temporada activa de ciclones tropicales impulsada por El Niño en el Pacífico oriental. Las precipitaciones superiores a una pulgada provocaron una mejora de una categoría desde Arizona hacia el norte hasta Nevada, Utah y el sureste de Idaho. Cabe señalar que la sequía a corto plazo ha terminado en el suroeste y la Gran Cuenca. A pesar de que varios indicadores a corto plazo muestran un aumento de la humedad, persiste una sequía a largo plazo de intensidad variable en algunas partes de estas áreas. Las precipitaciones (de 0,5 a 1 pulgada, localmente más) de la semana pasada provocaron pequeñas mejoras en algunas partes de Montana. La extensión e intensidad de la sequía se mantuvieron estables en el noroeste del Pacífico y gran parte de California.

Caribe

Debido a las recientes precipitaciones intensas (de 2,5 a 7,5 cm), se elevó la categoría de alerta meteorológica del sur de Puerto Rico a 1,5 cm. Sin embargo, no se justificaron cambios en la zona noreste del país.

La representación del Monitor de Sequía esta semana en las Islas Vírgenes de los EE. UU. se mantuvo igual, con sequía excepcional a corto y largo plazo en St. Thomas y St. John, y sequía extrema a corto y largo plazo en St. Croix. El clima seco persistente se alivió ligeramente en el extremo occidental de St. Thomas, donde se reportaron cantidades de lluvia de 1.49 y 1.75 pulgadas, con cantidades menores más al este (por ejemplo, 0.78 pulgadas de lluvia en la parte central de la isla). La profundidad del nivel freático en el pozo de la Escuela Primaria 3 se recuperó un poco, pero dadas las temperaturas persistentemente más cálidas de lo normal, se necesitarán más lluvias en las próximas semanas para que haya mejoras. En St. John y sus alrededores, los totales de lluvia esta semana oscilaron entre 0.17 y 0.61 pulgadas según las observaciones de CoCoRaHS. En Windswept Beach, la lluvia entre mayo y octubre totalizó 10,22 pulgadas, un mínimo histórico para el lugar (y más de 3 pulgadas menos que el mínimo histórico anterior de 13,93 pulgadas en 1994). La precipitación promedio para Windswept Beach (de 1984 a 2025) es de 27,8 pulgadas, lo que demuestra lo secos que han sido los últimos meses allí. En St. Croix, según las observaciones de CoCoRaHS, las cantidades de lluvia fueron generalmente escasas, oscilando entre 0,1 y 0,31 pulgadas.

Pacífico

Alaska quedó libre de sequía el 27 de octubre y no se realizaron cambios la semana pasada.

Hawái permanece libre de sequía, con periodos de precipitaciones intensas a excesivas durante los últimos meses. La zona de sotavento de la Isla Grande está designada como D0.

Esta semana, en el aeropuerto de Pago Pago, se registraron 0,44 pulgadas de lluvia, mientras que en las crestas de Siufaga y Toa se registraron 0,4 y 0,32 pulgadas, respectivamente. Debido a la persistencia de la sequía desde finales de septiembre y al segundo octubre más

seco registrado en Pago Pago, esta semana se declaró una sequía moderada a corto plazo.

En Koror, cayeron 2,58 pulgadas de lluvia esta semana, poniendo fin a tres semanas consecutivas de sequía. Sin embargo, debido a la sequía récord de agosto y al clima inusualmente seco de septiembre y octubre, la sequía moderada a corto plazo persistió esta semana en Palaos.

Las Islas Marianas no sufrieron sequía ni periodos de sequedad anormal esta semana. En Guam, solo cayeron 0,29 pulgadas de lluvia, lo que supone dos semanas consecutivas con menos de 1 pulgada. Las condiciones previas a estas dos últimas semanas fueron húmedas, aunque se seguirá monitoreando la reciente sequía. En Rota, cayeron apenas 0,13 pulgadas de lluvia, si bien esto se produjo tras tres meses de lluvias suficientes. En Tinian, se registraron 1,4 pulgadas de lluvia esta semana. En Saipán, se registraron 2,41 pulgadas de lluvia.

Esta semana se registró una sequía anormal en Yap, donde cayeron 0,18 pulgadas de lluvia, lo que marca tres semanas consecutivas con menos de 2 pulgadas de lluvia. También se registró una sequía anormal en Ulithi, donde la semana fue completamente seca. Woleai también entró en sequía anormal después de que solo cayeron 0,2 pulgadas de lluvia esta semana. Se registró una sequía anormal en Chuuk, donde solo se reportaron 0,06 pulgadas de lluvia (aunque faltan tres días en el análisis). La sequía anormal continuó en Lukunor, donde se reportaron 1,23 pulgadas de lluvia (con dos días faltantes). Se registró una sequía anormal en Nukuoro, donde cayeron 0,66 pulgadas de lluvia esta semana. Cuatro de las últimas seis semanas en Nukuoro han visto menos de una pulgada de lluvia. La sequía moderada a corto plazo continuó en Kapingamarangi, donde cayeron 1,19 pulgadas de lluvia el lunes, mientras que el resto de la semana fue seco. Las condiciones normales continuaron en Pohnpei, donde cayeron 1,73 pulgadas de lluvia esta semana. En Kosrae se registró una sequía anormal, con solo 0,81 pulgadas de lluvia esta semana (con un día sin precipitaciones). No se generaron representaciones del Monitor de Sequía para Fananu ni para Pingelap, ya que no se disponía de datos para ninguna de las dos localidades.

Abnormal dryness developed in Kwajalein this week, where only 0.13 inches of rain fell this week. Abnormal dryness also developed in Ailinglaplap, where 0.35 inches of rain fell this week (with one day missing), marking three weeks in a row with less than 1 inch of rain. Abnormal dryness continued this week in Jaluit, where no rain was reported (though with one day missing). Normal conditions were analysed on Utirik and Wotje, where 2.92 and 0.5 inches of rain were reported at each, respectively, with one day missing at both sites. Normal conditions continued at Majuro, though no rain was reported this week, marking the second consecutive week with less than 1 inch of rain. Abnormal dryness was analysed on Mili, where 1.01 inches of rain were reported (with one day missing).

Mirando hacia el futuro

Se pronostica un período de varios días mucho más seco (del 5 al 9 de noviembre), más típico del otoño, para la mayoría de los 48 estados continentales. Un frente frío provocará un período de lluvias a lo largo de la costa este, con las mayores acumulaciones (más de 2,5 cm) desde la costa del Atlántico Medio hacia el norte hasta el sureste de Nueva Inglaterra. En la parte final de este frente, podrían producirse fuertes precipitaciones en el valle inferior del Río Grande. La

única otra zona donde se prevén precipitaciones significativas es la costa del Pacífico Noroeste.

A mediados de noviembre, aumenta la probabilidad de que un río atmosférico afecte la costa oeste. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de 6 a 10 días (válido del 10 al 14 de noviembre) indica una probabilidad superior al 60 % de precipitaciones por encima de lo normal en gran parte de California y el noroeste del Pacífico. Las mayores probabilidades (> 70 %) se pronostican en el norte de California y el suroeste de Oregón. También se prevén precipitaciones superiores a lo normal en la Gran Cuenca, el suroeste, el valle del Río Grande y Florida. Las precipitaciones inferiores a lo normal son más probables en las Grandes Llanuras del norte y centro, el medio oeste y el noreste. El flujo intensificado del Pacífico favorece en gran medida las temperaturas superiores a lo normal en casi todo el territorio continental de EE. UU., lo cual es típico de un fuerte fenómeno de El Niño durante el otoño.

Autor(s)

Brad Pugh, NOAA/CPC

Curtis Riganti, National Drought Mitigation Center