Resumen nacional de sequía para 17 noviembre, 2026

Resumen

El resumen de la sequía de la semana pasada mostró un empeoramiento general de las condiciones desde el valle del río Misisipi hasta los estados del sureste y del Atlántico Medio. Mientras tanto, se observaron mejoras en la sequía desde el sur de California, pasando por la región de las Cuatro Esquinas, hasta gran parte de Texas y Oklahoma. Se registraron mejoras adicionales en la península Olímpica del estado de Washington y en partes del sur de Florida y el interior del noreste. La sequía también se extendió a partes de las Montañas Rocosas del norte. Las temperaturas de la semana pasada fueron generalmente superiores al promedio en las Grandes Llanuras del Norte y las Montañas Rocosas del Norte, con temperaturas inferiores al promedio y condiciones secas en el sureste de Estados Unidos.

Noreste

Un importante sistema de tormentas costeras afectó al noreste con abundantes lluvias y nevadas en zonas de gran altitud en la región interior, especialmente en el noreste de Pensilvania y el centro y este de Nueva York. Esto provocó mejoras puntuales en partes del noroeste de Nueva Jersey y el noreste de Pensilvania. Se observaron algunas mejoras menores en el este de Maine, mientras que el noroeste de Maine y el norte de Nuevo Hampshire sufrieron un empeoramiento de la sequía debido a las continuas precipitaciones por debajo de lo normal. La sequía moderada también se extendió al noroeste de Nueva York, donde las precipitaciones por debajo de lo normal persistieron en las últimas semanas. Las precipitaciones por debajo de lo normal también contribuyeron a la expansión de la sequía moderada en gran parte del este de Maryland.

Sureste

Tras una semana prácticamente sin precipitaciones, el sureste experimentó un empeoramiento de la sequía o una intensificación de la misma, desde Alabama hasta Virginia. En particular, la región de Piedmont y las zonas orientales de Carolina del Sur y Carolina del Norte, hasta el sur de Virginia, sufrieron una intensificación de la sequía extrema debido a las persistentes bajas precipitaciones. Las únicas leves mejoras se observaron en los alrededores del lago Okeechobee, en el sur de Florida, donde la sequía anormal desapareció por completo.

Sur

Texas experimentó otra ronda de lluvias torrenciales que afectaron las zonas central y sureste del estado. Se registraron precipitaciones de hasta tres o cuatro pulgadas o más a lo largo de la costa del Golfo, entre Corpus Christi y el área metropolitana de Houston. Como resultado, se observaron mejoras más significativas en la sequía, lo que contribuyó a aliviar las condiciones de sequía severa a extrema en el sureste de Texas. También cayeron entre una y dos pulgadas de lluvia en el centro de Oklahoma, lo que ayudó a aliviar la sequía en esa región.

Lamentablemente, no se puede decir lo mismo de Arkansas, Luisiana y Misisipi, donde la sequía extrema continúa extendiéndose. Misisipi experimentó una gran expansión de la sequía extrema en la parte central del estado, debido a la falta de lluvias que ha acumulado importantes déficits de precipitación durante más de un año. Muchas zonas de estos tres estados requieren al menos entre 50 y 75 centímetros de lluvia en un período de tres meses para superar la sequía actual.

Medio Oeste

La sequía y la aridez anormales continuaron su expansión por el sur y el centro de Misuri, llegando hasta Illinois la semana pasada, debido a la escasa cantidad de lluvias. La sequía anormal se extendió al sureste de Wisconsin debido a las condiciones inusualmente secas del último mes. La zona norte de la región del Medio Oeste experimentó condiciones de sequía persistentes, dadas las temperaturas más frías de lo habitual para la época del año, sumadas a la falta de precipitaciones.

Altas Llanuras

La semana pasada solo se realizaron cambios puntuales en la clasificación de sequía en los estados de las Grandes Llanuras. Se produjo una ligera degradación en las Montañas Rocosas del norte de Colorado, junto con un par de degradaciones menores en el este de Kansas. Las degradaciones más notables se produjeron en el norte y noreste de Wyoming, donde las temperaturas muy superiores a la media, sumadas a la falta de precipitaciones, provocaron una expansión de la sequía extrema y la introducción de una sequía excepcional en el noreste de Wyoming. Los indicadores de sequía a largo plazo, muy desfavorables, junto con los informes de validación sobre el terreno, justificaron la inclusión de esta zona de sequía excepcional.

Oeste

Una serie de sistemas de tormentas afectaron las zonas costeras de Washington, Oregón y el noroeste de California con fuertes precipitaciones. La península Olímpica, en el noroeste de Washington, registró más de 38 centímetros de lluvia en una zona típicamente húmeda, lo que fue suficiente para reducir las categorías de sequía. Con muchos arroyos registrando caudales casi máximos para esta época del año, se observaron mejoras más generalizadas en la sequía en el sureste de California, el sureste de Nevada, el norte de Arizona, el sur y el este de Utah y Nuevo México. Los embalses del suroeste continuaron recargándose esta semana, pero a un ritmo más lento que en semanas anteriores. Sin embargo, no todas las noticias fueron buenas en el oeste, ya que algunas zonas del noroeste de Montana y el norte de Idaho experimentaron la entrada en sequía moderada debido a la combinación de temperaturas 10 grados o más por encima del promedio con precipitaciones muy por debajo de lo normal.

Caribe

La semana pasada, la situación de sequía en Puerto Rico se mantuvo sin cambios. Sin embargo, las condiciones inusualmente calurosas, secas y ventosas generan cierta preocupación si persisten.

Partes de las Islas Vírgenes recibieron varias décimas de pulgada de lluvia a principios de la semana pasada, pero las condiciones posteriores fueron más secas, más cálidas y menos húmedas, lo que hace imposible la introducción de cualquier mejora. Por lo tanto, la clasificación más intensa, sequía excepcional (D4), se mantiene en St. John y St. Thomas, mientras que la sequía extrema (D3) se mantuvo vigente en St. Croix. En los últimos seis días del período cayeron alrededor de 0.2 pulgadas en los alrededores de Frederiksted en St. Croix, con 0.1 pulgadas o menos observadas en otros lugares. Desde el 1 de septiembre, generalmente cayeron entre 5.5 y 7.0 pulgadas de lluvia en Charlotte Amalie en St. Thomas, en comparación con un promedio de poco más de un pie. Se han observado condiciones similares alrededor de Cruz Bay en St. John, con alrededor de 6 pulgadas de lluvia muy por debajo de las aproximadamente 14 pulgadas que normalmente caen del 1 de septiembre al 17 de noviembre. Los déficits de lluvia no fueron tan agudos en gran parte de St. Croix, pero están muy por debajo de lo normal. La mayoría de las localidades de St. Croix registraron entre 6,1 y 9,3 pulgadas de lluvia durante este período, en comparación con los valores normales de 14 a 14,5 pulgadas.

Pacífico

En Alaska, el valle superior de Tanana continuó registrando nevadas por debajo de lo normal, por lo que la clasificación de sequía anormal se mantiene en el centro-este de Alaska.

En Hawái se observaron condiciones similares a las del día anterior, con una sequía anormal en la costa oeste de la Isla Grande.

Koror, en Palaos, registró un aumento de las precipitaciones la semana pasada (9,7 cm). En lo que va de noviembre, Koror ha registrado 17,5 cm, aproximadamente 1,2 cm por encima del promedio, lo cual es suficiente para cubrir la demanda de agua. Como resultado, las condiciones mejoraron y pasaron a ser anormalmente secas (D0).

Las Marianas registraron un excedente general de lluvias este año hasta principios de otoño, con períodos de lluvias excesivas e impactos de algunos ciclones tropicales. Sin embargo, en las últimas semanas las condiciones se han vuelto más secas. La semana pasada fue ligeramente más húmeda que la anterior, pero las cantidades se mantuvieron por debajo de lo normal y ligeramente inferiores a lo necesario para satisfacer la demanda humana y ambiental. Guam registró 0.37 pulgadas, lo que elevó los totales del 1 al 17 de noviembre a 0.81 pulgadas, más de 4 pulgadas por debajo de lo normal. Desde el 20 de octubre, solo cayeron 1.86 pulgadas, menos del 25 por ciento de lo normal. El Índice de Sequía Keetch-Byram en Guam alcanzó 541, 2.6 desviaciones estándar por encima de lo normal, lo que indica una pérdida significativa de humedad superficial. Rota registró 1.38 pulgadas la semana pasada, solo un poco por debajo de lo normal y gracias a las lluvias al final del período. Aun así, las lluvias del 1 al 17 de noviembre fueron solo la mitad de lo normal, tras un final de octubre más seco de lo normal. Las condiciones son precarias, pero la persistencia de precipitaciones

inferiores a lo normal justifica la declaración de sequía (D0) en Rota. Las precipitaciones también han sido algo inferiores a lo normal recientemente en Tinian y Saipán, aunque no tanto como más al sur. Por el momento, no se justifica la declaración de sequía en estas localidades.

En la Micronesia occidental, se mantuvo la sequía anormal (D0) en Yap, Ulithi y Woleai. La semana pasada, solo se registraron entre 0,3 y 0,7 pulgadas de lluvia en las islas, en comparación con las cantidades habituales de 2 pulgadas o un poco más. Las precipitaciones por debajo de lo normal se remontan al menos a octubre, cuando Ulithi y Woleai registraron menos de la mitad de las cantidades habituales.

Las precipitaciones subnormales continuaron afectando la zona central de Micronesia, manteniendo a Kapingamaringi en sequía moderada (D1) y a Chuuk, Lukunor y Nukuoro en sequía anormal (D0). Kapingamaringi reportó 3.91 pulgadas de lluvia durante los primeros 17 días de noviembre, incluyendo 1.75 pulgadas la semana pasada. Desde principios de septiembre, solo se acumularon 11.35 pulgadas de lluvia en Kapingamaringi, un poco menos de la mitad de lo normal. Chuuk y Nukuoro registraron 2.44 y 1.18 pulgadas de lluvia, respectivamente, la semana pasada. Esto fue una mejora con respecto a las semanas anteriores, pero aún estaba cerca o por debajo de lo normal. Las lluvias fueron menos abundantes en Lukunor, solo alrededor de 0.3 pulgadas aunque faltó un día. Del 1 de septiembre al 17 de noviembre, Lukunor trajo 12.70 pulgadas de lluvia, que es menos de la mitad (13.3 pulgadas por debajo de) lo normal. Lukunor es probablemente la localidad más cercana a alcanzar la sequía moderada (D1) en el centro-norte de Micronesia, dado que las precipitaciones inferiores a lo normal se remontan a un período más prolongado. Se seguirá vigilando de cerca la situación.

En el este de Micronesia, la sequía anormal (D0) continuó afectando a Kosrae, mientras que Pohnpei se mantuvo libre de cualquier designación de sequía. Kosrae reportó 1,70 pulgadas de lluvia la semana pasada, mientras que en Pohnpei se registraron 3,44 pulgadas, impulsadas por un aumento de las precipitaciones a finales del período. Kosrae reportó 11,43 pulgadas de lluvia desde el 1 de octubre, lo que está aproximadamente 9 pulgadas por debajo de lo normal, pero solo un poco menos de lo necesario para mantener el ritmo de la demanda. En Pohnpei, del 1 al 17 de noviembre trajeron 4,07 pulgadas de lluvia, después de más de 14 pulgadas en octubre, lo que es aproximadamente suficiente para mantener el ritmo de la demanda.

Persistió la sequía anormal (D0) en la franja occidental de las Islas Marshall (Kwajalein, Ailinglapalap y Jaluit). Las fuertes lluvias de finales de la semana pasada aumentaron los totales del 1 al 17 de noviembre a 4,71, lo cual está por debajo de lo normal, pero es suficiente para evitar el deterioro y mejorar ligeramente las condiciones de humedad superficial, aunque no mejoró notablemente las condiciones generales ni redujo el déficit de precipitaciones. Más al sur, solo cayeron 0,81 pulgadas de lluvia en Ailinglapalap la semana pasada, mientras que apenas 0,14 pulgadas humedecieron ligeramente Jaluit. Desde octubre, cayeron 8,39 pulgadas de lluvia en Ailinglapalap, casi 9 pulgadas por debajo de lo normal. Los déficits son un poco mayores en Jaluit, con solo 4,84 pulgadas observadas desde octubre, lo que representa un poco más de un pie menos (entre un tercio y la mitad de) lo normal. Los mayores déficits en Jaluit tienen condiciones al borde de la sequía moderada (D1), pero no se

introdujo ningún aumento en la designación esta semana. Las condiciones continuarán siendo monitoreadas de cerca.

Wojte y Utirik, en el noreste de las Islas Marshall, no registraron sequía. La semana pasada, las precipitaciones alcanzaron los 3,52 y 1,63 pulgadas, respectivamente, gracias al aumento de las lluvias a finales de mes. En lo que va del mes, las precipitaciones han sido ligeramente inferiores a lo normal en Utirik y un poco superiores en Wojte, lo cual fue suficiente para evitar un empeoramiento de la situación.

En el sureste de las Islas Marshall, Majuro reportó solo 0.09 pulgadas de lluvia la semana pasada, lo que eleva las cantidades del 1 al 17 de noviembre a aproximadamente 3 pulgadas (4.5 pulgadas menos de lo normal). Sin embargo, cayeron más de 14 pulgadas de lluvia durante octubre, lo que ha mantenido a raya la sequía notable y la escasez de humedad superficial hasta el momento. Mili recibió apenas lluvia la semana pasada, y solo han caído 1.39 pulgadas del 1 al 17 de noviembre (lo normal es 5.45 pulgadas). Como resultado, D0 se mantuvo allí.

Tras otra semana de escasas precipitaciones, la sequía moderada persistió en Samoa Americana. En Pago Pago se registraron 2 cm de lluvia, lo que eleva el total acumulado entre el 1 y el 17 de noviembre a tan solo 8,7 cm (frente a un promedio de más de 40,6 cm). A pesar de la marcada sequía, estas cantidades no se alejan demasiado de lo necesario para satisfacer la demanda, por lo que el deterioro ha sido más lento de lo esperado, considerando la magnitud de los déficits a corto plazo.

Mirando hacia el futuro

Un potente sistema de tormentas afectará gran parte del oeste de Estados Unidos a finales de esta semana, especialmente California. Se esperan varias pulgadas de precipitación, junto con fuertes nevadas de entre 50 y 100 pulgadas en las Sierras de California durante los próximos días. También podrían caer nevadas menores, pero aún significativas, en el oeste de Colorado, el noreste de Utah y las zonas occidentales de Montana y Wyoming. Se prevé que otro sistema de tormentas intenso se forme a lo largo de la costa este de Florida, produciendo varias pulgadas de lluvia en la ya saturada zona oriental del estado. Las lluvias de este sistema podrían extenderse a las Carolinas y la región del Atlántico Medio, proporcionando potencialmente precipitaciones beneficiosas para esos estados afectados por la sequía.

El Centro de Predicción Climática pronostica temperaturas superiores a lo normal en gran parte del país durante los próximos 6 a 10 días, con la excepción de Texas, que podría experimentar temperaturas inferiores a lo normal la próxima semana. Se esperan precipitaciones superiores al promedio en los próximos 6 a 10 días en gran parte del oeste, así como en el sur y el este de Estados Unidos.

Autor(s)

Jonathan Case, NASA/MSFC/UAH

Richard Tinker, NOAA/NWS/NCEP/CPC